

गणित

MATHEMATICS

कक्षा 8

सत्र 2026-27




DIKSHA एप कैसे डाउनलोड करें?

- विकल्प 1 : अपने मोबाइल ब्राउज़र पर diksha.gov.in/app टाइप करें।
विकल्प 2 : Google Play Store में DIKSHA NCTE ढूँढें एवं डाउनलोड बटन पर tap करें।



मोबाइल पर QR कोड का उपयोग कर डिजिटल विषय वस्तु कैसे प्राप्त करें ?

DIKSHA App को लॉच करें → App की समस्त अनुमति को स्वीकार करें → उपयोगकर्ता Profile का चयन करें।



1

पाठ्यपुस्तक में QR Code को Scan करने के लिए मोबाइल में QR Code tap करें।



2

मोबाइल को QR Code सफल Scan के पश्चात् QR Code से पर केन्द्रित करें।




3

सफल Scan के पश्चात् QR Code से लिंक की गई सूची उपलब्ध होगी।


डेस्कटॉप पर QR Code का उपयोग कर डिजिटल विषय-वस्तु तक कैसे पहुँचे ?



1 QR Code के नीचे 6 अंक का Alpha Numeric Code दिया गया है।



2 ब्राउज़र में diksha.gov.in/cg टाइप करें।



3 सर्वर बार पर 6 डिजिट का QR CODE टाइप करें।



4 प्राप्त विषय-वस्तु की सूची से चाही गई विषय-वस्तु पर क्लिक करें।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, रायपुर

यह पाठ्यपुस्तक शासकीय संपत्ति है। इसका क्रय-विक्रय अवैधानिक है।

निःशुल्क वितरण हेतु

प्रकाशन वर्ष – 2026

© एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग., रायपुर

सहयोग



हृदय कांत दीवान (विद्या भवन, उदयपुर)

संयोजक

डॉ. विद्यावती चन्द्राकर

विषय समन्वयक

डॉ. सुधीर श्रीवास्तव

लेखक दल

यू.के. चक्रवर्ती, सी.पी.सिंह, जी.पी.पांडेय, नागेन्द्र भारती गोस्वामी, आर. के. चारी,

आर. के. देवांगन, बी.एल. गुप्ता, हुलेश पटेल, अनिल गभेल, मीना श्रीमाली,

संजय बोल्या, दीपक मंत्री, रंजना शर्मा

आवरण पृष्ठ

रेखराज चौरागड़े

प्रकाशक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़, रायपुर

मुद्रक

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर (छ.ग.)

मुद्रणालय

मुद्रित पुस्तकों की संख्या –

प्राक्कथन (Preface)

गणित शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को केवल गणित का ज्ञान देना ही नहीं है बल्कि उनमें ऐसी समझ का विकास करना है जिससे वे गणित से भयभीत होने के बजाय उसका आनंद उठा सकें, गणित से संबंधित सार्थक प्रश्न बना सकें, उन्हें हल कर सकें। साथ ही अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से निर्मित गणितीय ज्ञान का रूपान्तर अपनी सुविधानुसार कर सकें।

कक्षा आठवीं तक आते आते बच्चे गणित में निहित शक्ति का अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं। यहां वे बड़ी से बड़ी संख्या को अलग-अलग रूप में लिखना, घात की सहायता से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना तो सीखते ही हैं साथ ही साथ वे ज्यामितीय आकृतियों के विशिष्ट गुणों को भी पहचानने लगते हैं। वे बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन करने के साथ-साथ किसी वस्तु द्वारा स्थान घेरने से संबंधित अवधारणाओं को भी समझने लगते हैं। गणित का सबसे महत्वपूर्ण काम सोच व तर्कशक्ति में सक्षमता हासिल करना और उन्हें वृहद बनाना है।

यह पुस्तक गणित शिक्षा के उद्देश्यों एवं बच्चों के उपलब्धि स्तर को ध्यान में रखकर बनाई गई है। परन्तु, कोई भी पुस्तक अपने आप में पूर्ण नहीं होती अतः इसे और अधिक बोधगम्य एवं रुचिकर बनाने के लिए आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। आपके द्वारा दिये गए सुझाव प्रदेश के समस्त छात्रों के हित में होंगे।

इस पुस्तक के लेखन में हमें विभिन्न शासकीय और अशासकीय संस्थाओं तथा प्रबुद्ध नागरिकों का मार्गदर्शन और सहयोग मिला है, हम उनके प्रति आभारी हैं। विशेष कर हम आभारी है विद्याभवन सोसाइटी, उदयपुर के जिनका इस पुस्तक के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

राष्ट्र शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) ने कक्षा 1 से 8 तक सभी विषयों के लिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए हैं जो स्पष्ट और मापने योग्य हैं। इन्हें “अधिगम प्रतिफल” (Learning outcomes) कहा गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छ.ग. द्वारा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में दक्षता संवर्धन हेतु अतिरिक्त पाठ्य संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से Energized Text Books एक अभिनव प्रयास है, जिसे ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन (डाउनलोड करने के उपरांत) उपयोग किया जा सकता है। ETBs का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यवस्तु के अतिरिक्त ऑडियो-वीडियो, एनीमेशन फॉरमेट में अधिगम सामग्री, संबंधित अभ्यास, प्रश्न एवं शिक्षकों के लिए संदर्भ सामग्री प्रदान करना है।

हमने इस वर्ष अपनी पाठ्यपुस्तकों में इन अधिगम प्रतिफलों के सन्दर्भ में कुछ आवश्यक बदलाव किए हैं। कुछ नई पाठ्यसामग्रियाँ जोड़ी गई हैं, कुछ पाठ एक कक्षा से अन्य कक्षाओं में स्थानांतरित किए गए हैं। इससे शिक्षक और विद्यार्थी भ्रमित न हो।

संचालक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय-सूची (Contents)

अध्याय एक	:	वर्ग एवं घन (Square and Cube)	1—17
अध्याय दो	:	घातांक (Exponent)	18—24
अध्याय तीन	:	समान्तर रेखाएं (Parallel Lines)	25—39
अध्याय चार	:	बीजीय व्यंजकों के गुणा एवं भाग (Multiplication and Division of Algebraic Expressions)	40—52
अध्याय पांच	:	वृत्त एवं उसके अवयव (Circle and its Components)	53—68
अध्याय छः	:	सांख्यिकी (Statistics)	69—84
अध्याय सात	:	अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण (Direct and inverse variation)	85—100
अध्याय आठ	:	बीजीय व्यंजकों के गुणनखण्ड (Factors and Factorization of Algebraic Expressions)	101—109
अध्याय नौ	:	सर्वसमिकाएं (Identities)	110—118
अध्याय दस	:	बहुभुज (Polygon)	119—134
अध्याय ग्यारह	:	चतुर्भुज की रचना (Construction of Quadrilateral)	135—156
अध्याय बारह	:	समीकरण (Equation)	157—167
अध्याय तेरह	:	प्रतिशतता के अनुप्रयोग (Application of Percentage)	168—182
अध्याय चौदह	:	क्षेत्रमिति—1 (Mensuration-I)	183—198
अध्याय पन्द्रह	:	क्षेत्रमिति—3 (Mensuration-III)	199—209
अध्याय सोलह	:	आकृतियाँ (द्विविमीय एवं त्रिविमीय) Figures (Two and Three Dimensional)	210—223
अध्याय सत्रह	:	संख्याओं का खेल (Playing with Numbers)	224—243
अध्याय अठारह	:	परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं (Operation on Rational Number)	244—274
अध्याय उन्नीस	:	क्षेत्रमिति—2 (Mensuration-II)	275—285
	:	उत्तरमाला (Answers)	286—296



सीखने के प्रतिफल

प्रस्तावित अध्यापन प्रक्रिया

शिक्षार्थी को जोड़े / समूह / व्यक्तिगत तौर पर अवसर उपलब्ध कराते हुये, निम्नांकित हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।

- सभी संक्रियाओं में परिमेय संख्याओं के उपयोग के उदाहरण खोजना तथा इन संक्रियाओं में पैटर्न खोजना।
- 3 अंकों तक की संख्याओं के सामान्य रूप तथा बीजगणित की समझ द्वारा 2, 3, 4, — — से भाग के नियम खोजना, जिसे पूर्व में पैटर्न के अवलोकन द्वारा किया गया था।
- वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल की संख्या में पैटर्न खोजना तथा पूर्णांकों को घातांक के रूप में व्यक्त करने हेतु नियम बनाना।
- विद्यार्थियों को ऐसी स्थिति उपलब्ध कराना जो उन्हें समीकरण बनाने हेतु प्रेरित करें तथा उन्हें उचित विधि द्वारा हल करने हेतु प्रोत्साहित करें।
- वितरण नियम के पूर्व ज्ञान के आधार पर दो बीजीय व्यंजकों तथा बहुपदों का गुणा करना तथा विभिन्न बीजगणित सर्वसमिकाओं का मूर्त उदाहरणों की सहायता से सामान्यीकरण करना।
- दो संख्याओं के गुणनखण्ड निकालने के ज्ञान के आधार पर उचित गतिविधि का उपयोग कर विद्यार्थियों को बीजीय व्यंजकों के गुणनखण्ड से परिचित कराना।
- ऐसे संदर्भ विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना जिसमें प्रतिशत का उपयोग होता है जैसे — छूट, लाभ, हानि, VAT, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज आदि।
- साधारण ब्याज के बारंबार उपयोग से चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का सामान्यीकरण करना।
- विद्यार्थियों को ऐसी परिस्थितियां देना जिनमें एक राशि दूसरी पर निर्भर करती है। उन परिस्थितियों को पहचानना जिनमें दोनों राशियों में एक साथ वृद्धि होती है या एक राशि बढ़ती है तो दूसरी घटती है। जैसे— किसी वाहन की गति बढ़ने पर उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी में लगने वाला समय घट जाता है।
- विभिन्न चतुर्भुजों के कोणों तथा भुजाओं का मापना तथा उनके बीच संबंधों के पैटर्न की पहचान करना।

अधिगम परिणाम (Learning Outcomes)

शिक्षार्थी:

- M801. पैटर्न की मदद से परिमेय संख्याओं के योग, अंतर, गुणा, तथा भाग के गुणों का सामान्यीकरण कर सकता है।
- M802. दो परिमेय संख्याओं के बीच संभावित परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकता है।
- M803. 2, 3, 4, 5, 6, 9 तथा 11 के भाग के नियम का सत्यापन कर सकता है।
- M804. विभिन्न विधियों से संख्याओं का वर्ग, घन, वर्गमूल तथा घनमूल निकाल सकता है।
- M805. पूर्णांक घात के प्रश्न हल कर सकता है।
- M806. चरों का प्रयोग कर दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न तथा पहेलियां हल कर सकता है।
- M807. बीजीय व्यंजकों का गुणा कर सकता है। जैसे $(2x-5)(3x^2+7)$ का विस्तार करते हैं।
- M808. दैनिक जीवन के प्रश्नों को हल करने के लिए सार्वसमिकाओं का उपयोग कर सकता है।
- M809. लाभ हानि की स्थितियों में प्रतिशत की अवधारणा का प्रयोग छूट की गणना, VAT, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना के लिए कर सकता है। जैसे — अंकित मूल्य तथा वास्तविक छूट दिये गये हों तो छूट प्रतिशत ज्ञात करता है अथवा क्रय मूल्य तथा लाभ दिया हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकता है।
- M810. समानुपात तथा व्युत्क्रमानुपात पर आधारित प्रश्न हल कर सकता है।
- M811. कोणों के योग के गुण का प्रयोग कर चतुर्भुज के कोणों से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकता है।
- M812. समानान्तर चतुर्भुज के गुणों की पुष्टि कर सकता है तथा तर्क द्वारा उनके बीच संबंध स्थापित कर सकता है।

विद्यार्थियों को पैटर्न के सामान्यीकरण के आधार पर स्वयं की परिकल्पना का निर्माण करने देना तथा उसकी पुष्टि उचित उदाहरणों द्वारा करना।

- समानान्तर चतुर्भुज के गुणधर्मों की पुष्टि करना तथा समानांतर चतुर्भुज की रचना, उनके विकर्णों की रचना, कोणों तथा भुजाओं के मापन आदि से संबंधित गतिविधि करना।
- दैनिक जीवन की 3D वस्तुओं को 2D रूप में प्रदर्शित करना जैसे – समतल पर बॉक्स का चित्र बनाना, कागज पर बोटल का चित्र बनाना।
- विभिन्न आकृतियों जैसे घनाभ, घन, पिरामिड, प्रिज्म आदि के जाल बनाना। इसी प्रकार जाल से विभिन्न आकृतियाँ बनाना तथा शीर्षों, कोरों तथा सतह के बीच संबंध स्थापित करना।
- विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज की रचना का प्रदर्शन करना।
- ग्राफ पेपर पर समलम्ब चतुर्भुज तथा अन्य बहुभुज का अनुरेखन करना तथा विद्यार्थियों को इकाई वर्ग गिनकर अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- त्रिभुज तथा आयत (वर्ग) के क्षेत्रफल का प्रयोग करते हुए समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल हेतु सूत्र स्थापित करना।
- विभिन्न 3D वस्तुओं जैसे घन, घनाभ तथा बेलन की सतहों की पहचान करना।
- आयत, वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए घन, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल हेतु सूत्र स्थापित करना।
- इकाई घन की सहायता से दिए गए घन तथा घनाभ का आयतन ज्ञात करने का प्रदर्शन करना।
- आँकड़ों का संचय, उनका समूह में सारणीयन कर दण्ड आरेख/पाई आरेख के रूप में प्रदर्शन करना।
- बड़ी संख्या में एक समान पासे/सिक्के को उछालने की गतिविधि कर उससे बड़ी संख्या में घटनाओं के घटित होने की गणना करना तथा इसके आधार पर भविष्य की घटनाओं के लिए अवधारणा निर्मित करना।

M813. 3D आकृतियों को समतल जैसे कागज के पन्ने, श्याम पट आदि पर प्रदर्शित कर सकता है।

M814. पैटर्न की मदद से यूलर संबंध की पुष्टि कर सकता है।

M815. स्केल तथा परकार के प्रयोग से विभिन्न चतुर्भुजों की रचना कर सकता है।

M816. समलंब चतुर्भुज तथा अन्य बहुभुज के क्षेत्रफल का अनुमान इकाई वर्ग/ग्राफ पेपर की मदद से लगा सकता है तथा सूत्र द्वारा उसकी पुष्टि कर सकता है।

M817. बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता है।

M818. घनाभीय तथा बेलनीय आकृति की वस्तुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कर सकता है।

M819. दण्ड आरेख तथा पाई आरेख की रचना कर उनकी व्याख्या कर सकता है।

M820. किसी घटना के पूर्व में घटित होने या उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर भविष्य में होने वाली घटनाओं के घटित होने हेतु परिकल्पना बना सकता है।

विषय-सूची (Contents)

अध्याय क्र.	अध्याय का नाम	LOs
अध्याय एक	वर्ग एवं धन	M804
अध्याय दो	घातांक	M805
अध्याय तीन	समान्तर रेखाएं	--
अध्याय चार	बीजीय व्यंजकों के गुणा एवं भाग	M807
अध्याय पांच	वृत्त एवं उसके अवयव	--
अध्याय छः	सांख्यिकी	M819, M820
अध्याय सात	अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण	M810
अध्याय आठ	बीजीय व्यंजकों के गुणनखण्ड	M807
अध्याय नौ	सर्वसमिकाएं	M808
अध्याय दस	बहुभुज	M811, M812
अध्याय ग्यारह	चतुर्भुज की रचना	M815
अध्याय बारह	समीकरण	M806
अध्याय तेरह	प्रतिशतता के अनुप्रयोग	M809
अध्याय चौदह	क्षेत्रमिति-1	M816, M817
अध्याय पन्द्रह	क्षेत्रमिति-3	M818
अध्याय सोलह	आकृतियाँ (द्विविमीय एवं त्रिविमीय)	M813, M814
अध्याय सत्रह	संख्याओं का खेल	M803
अध्याय अठारह	परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं	M801, M802
अध्याय उन्नीस	क्षेत्रमिति-2	M818

उदाहरणार्थ रूब्रिक्स

Chapter अध्याय	Subtopics उप-विषय	Level 1 स्तर 1	Level 2 स्तर 2	Level 3 स्तर 3	Level 4 स्तर 4
After the lesson, students will be able to : पाठ के बाद, विद्यार्थी कर सकेंगे :		remember, recall, list, locate, label, recite याद करना, सूचीबद्ध करना, खोजना, लेबल करना, वर्णन करना	understand, explain, illustrate, summarise, match समझना, व्याख्या करना, संक्षेप में लिखना, उदाहरण देना, मेल करना	apply, organise, use, solve, prove, draw प्रयोग करना, व्यवस्थित करना, उपयोग करना, हल करना, साबित करना, चित्रण करना	evaluate, hypothesise, analyse, compare, create, categorise मूल्यांकन करना, परिकल्पना करना, विश्लेषण करना, तुलना करना, सृजन करना, वर्गीकरण करना
अध्याय -1 वर्ग एवं घन					
M-804	- पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान। - पाइथागोरीय त्रिक की पहचान। - घन संख्याओं की पहचान। - अभाज्य गुणनखण्ड विधि द्वारा वर्गमूल - भागविधि से वर्गमूल ज्ञात करना।	- पूर्ण वर्ग संख्या को परिभाषित करना व उदा. देना। - पूर्णवर्ग संख्या न होने का कारण बताना। - पाइथागोरीय त्रिक संख्या को परिभाषित करना। - घन संख्या को परिभाषित करना। - वर्गमूल को परिभाषित करना तथा उदाहरण देना। - वर्ग मूल व घनमूल का चिह्न पहचानना। $\sqrt{\quad}$	- संख्याओं से पूर्ण वर्ग संख्या / संख्याएँ बनाना। - पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करना। - संख्याओं से पूर्ण घन संख्याएँ बनाना। - पूर्ण घन संख्या की पहचान करना।	- अभाज्य गुणनखण्ड विधि से वर्गमूल की गणना करना। - भाग विधि से वर्गमूल की गणना करना। - पाइथागोरीय त्रिक के रूप में पहचान करना। - अभाज्य गुणनखण्ड विधि से घनमूल की गणना करना। - दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं को हल करने में वर्गमूल का प्रयोग करना।	नये पाइथागोरीय संख्याओं का त्रिक खोजना।

अध्याय-1


वर्ग एवं घन

SQUARE & CUBE



वर्ग संख्याएँ (Square Numbers)

नीचे दिए गए चित्र के प्रत्येक पंक्ति (आड़ी) एवं स्तम्भ (खड़ी) में बिन्दुओं की संख्या समान हैं। इनमें से प्रत्येक में 5-5 बिन्दु हैं, इन बिन्दुओं की कुल संख्या कितनी होगी?



चित्र 1

इसी प्रकार प्रत्येक पंक्ति तथा स्तम्भ में समान संख्या में दो-दो, तीन-तीन, चार-चार, आठ-आठ इत्यादि बिन्दु लेकर कुछ वर्गाकार पैटर्न (प्रतिरूप) बनाइए तथा तालिका की पूर्ति कीजिए—

सारणी 1.1
Table 1.1

क्रमांक	प्रत्येक पंक्ति या स्तम्भ में बिन्दुओं की संख्या	बनाए गए पैटर्न में बिन्दुओं की कुल संख्या
1.	5	25
2.	2	-----
3.	-----	9
4.	4	-----
5.	-----	-----
6.	-----	-----

अंतिम स्तम्भ की सभी संख्याएँ ऐसी हैं जो एक संख्या को उसी से गुणा करके प्राप्त की गई हैं। $25 = 5 \times 5$, $4 = 2 \times 2$, ये सभी संख्याएँ 1, 4, 9, 16, 25,... इत्यादि पूर्ण वर्ग संख्याएँ (Perfect Square Number) कहलाती हैं। आप भी 5 और पूर्ण वर्ग संख्याएँ लिखें।

इन संख्याओं को हमने स्वयं पूर्ण वर्ग संख्या बनाया है। अब यदि आपको कोई संख्या दी जाए तो कैसे पता करेंगे कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं?

पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान (Recognizing a Perfect Square Number)

आप पायेंगे कि 9 बिन्दुओं को तीन-तीन बिन्दुओं की तीन पंक्तियों में जमा सकते हैं, 16 बिन्दुओं को चार-चार की चार पंक्तियों में जमा सकते हैं, किन्तु 10, 11, 12 बिन्दु होने पर उन्हें इस तरह नहीं जमाया जा सकता कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में बिन्दुओं की संख्या बराबर हो। चाहें तो कोशिश करके देख लें। 10, 11, 12 बिन्दु होने पर तो हम इस प्रकार जमा कर देखने का प्रयास कर सकते हैं किन्तु यदि बिन्दुओं की संख्या 109 हो, 784 हो या और भी बड़ी हो तो इस तरह बिन्दुओं को जमा कर जाँचना कठिन हो जायेगा। पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने के लिए एक अच्छा तरीका है अभाज्य गुणनखण्ड की विधि।

अभाज्य गुणनखण्ड व पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान

(The Prime factor and the identification of the Perfect Square Number)

पूर्ण वर्ग संख्या में पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में बिन्दुओं की संख्या बराबर है। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या 6×6 , 5×5 , 3×3 , 7×7 इत्यादि।

जिस संख्या में भी इस तरह गुणनखण्डों के जोड़े पूरे-पूरे बन जाए वही पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसके लिए हम दी गई संख्या के गुणनखण्ड कर लेंगे और फिर जोड़े बनाएँगे।

अभाज्य गुणनखण्ड की विधि (The Prime Factorisation Method)

इस विधि में दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखण्ड करके जोड़े बनाते हैं। जिन संख्याओं में सभी समान अभाज्य गुणनखण्डों के जोड़े बन जाते हैं, वे पूर्ण वर्ग संख्या होंगी।

जैसे – (1) 144 को लें

144 के अभाज्य गुणनखण्ड हैं – $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$

यहाँ 144 में सभी अभाज्य गुणनखण्डों के जोड़े बन रहे हैं।

अतः 144 पूर्ण वर्ग संख्या है।

2	144
2	72
2	36
2	18
3	9
3	3
	1

(2) 252 को देखें

252 के अभाज्य गुणनखण्ड हैं – $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7$

इसमें 7 का कोई जोड़ा नहीं है

अर्थात् 252 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।

2	252
2	126
3	63
3	21
7	7
	1

क्रियाकलाप 1. (Activity 1)

नीचे दी गई सारणी में संख्याओं के अभाज्य गुणनखण्ड ज्ञात कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए

सारणी 1.2

क्र.सं.	संख्या	अभाज्य गुणनखण्ड	क्या सभी समान अभाज्य गुणनखण्डों के जोड़े बन रहे हैं?	पूर्ण वर्ग है या नहीं
1.	16	$2 \times 2 \times 2 \times 2$	हाँ	पूर्ण वर्ग हैं
2.	32	$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$	नहीं	नहीं
3.	36			
4.	48			
5.	40			
6.	49			
7.	56			
8.	64			

अब इन्हें भी जाँचिए कि नीचे दी गई संख्याएँ पूर्ण वर्ग संख्या हैं या नहीं –

- (i) 164 (ii) 256 (iii) 81 (iv) 120 (v) 576
 (vi) 205 (vii) 625 (viii) 324 (ix) 216 (x) 196

पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ गुण (Some characteristics of Perfect Square Numbers)

इकाई का अंक देख पूर्ण वर्ग की पहचान—

नीचे सारणी में दी गई पूर्ण वर्ग संख्याओं जैसे 4, 9, 16, 25, 81, 100, 169, 324, 256, 625 आदि को ध्यान से देखिए। क्या कोई ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसमें इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 अथवा 8 है? कुछ और संख्याएँ लेकर देखें क्या आप इनसे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आइए, इस सारणी को देखें –

सारणी 1.3

संख्या	पूर्ण वर्ग संख्या	संख्या	पूर्ण वर्ग संख्या
1	1	2	4
3	9	4	16
5	25	6	36
7	49	8	64
9	81	10	100
11	121	12	144
.....			
.....			

आप इस तालिका को और आगे बढ़ा सकते हैं।


तालिका में दी गई विषम एवं सम संख्याओं के पूर्ण वर्ग किस प्रकार के हैं? नीचे ✓ का चिह्न लगाएँ।

विषम संख्याओं का पूर्ण वर्ग — विषम/सम

सम संख्याओं का पूर्ण वर्ग — विषम/सम

एक और मजेदार बात — (Another Interesting Observation)

नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करें —



चित्र 2

चित्र में एक किनारे से आरम्भ करके विभिन्न वर्गों की रचना की गई है। इन वर्गों के हिस्से अपने आप नये वर्गों में शामिल होते गए हैं। यदि हम सब हिस्सों में शामिल बिन्दुओं को अलग-अलग जोड़ें तो हम देखते हैं कि वर्गों में बिन्दुओं की संख्या इस प्रकार से है—

पहला वर्ग	1	=	1	=	1^2
दूसरा वर्ग	1 + 3	=	4	=	2^2
तीसरा वर्ग	1 + 3 + 5	=	9	=	3^2
चौथा वर्ग	1 + 3 + 5 + 7	=	16	=	4^2
पांचवा वर्ग	1 + 3 + 5 + 7 + 9	=	25	=	5^2
छठा वर्ग	1 + 3 +	=	36	=	6^2
सातवा वर्ग		=		=	
आठवा वर्ग		=		=	

इसको आगे बढ़ाने पर हम देख सकते हैं कि जो भी वर्ग लें उसमें बिन्दुओं की कुल संख्या भी

पूर्ण वर्ग है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे आठवे वर्ग में और दसवे वर्ग में कुल कितने बिन्दु होंगे?

हमने देखा कि पहले, दूसरे आदि वर्गों में शामिल कुल बिन्दु इस प्रकार हैं।

पहला वर्ग = पहली विषम संख्या = 1^2

दूसरा वर्ग = पहली दो विषम संख्याओं का योग = 2^2

तीसरा वर्ग = पहली तीन विषम संख्याओं का योग = 3^2

और इसी तरह से आगे भी जैसे, पहली 8 विषम संख्याओं का योग 8^2 के बराबर होता है।

हम कितना भी आगे जाए यह बात सही निकलती है।

इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या n का वर्ग प्रारंभिक n विषम संख्याओं के योगफल के बराबर होता है।

कुछ और मनोरंजक पैटर्न –

1, 11, 111.... की वर्ग संख्याओं को देखें –

$$1^2 = 1$$

$$11^2 = 121$$

$$111^2 = 12321$$

$$1111^2 = 1234321$$

$$11111^2 = \text{-----}$$

$$111111^2 = \text{-----}$$

क्रियाकलाप 2. (Activity 2)

अपने मित्र से दो क्रमागत संख्या बोलने को कहें। उन संख्याओं को मौखिक रूप से जोड़कर अपने कॉपी में लिख लें। मित्र को उन दो क्रमागत संख्याओं की वर्ग संख्याएँ पता करने को कहें और बड़ी वर्ग संख्या में से छोटी वर्ग संख्या घटाने को कहें। बाद में अपनी कॉपी में लिखी संख्या को दिखा दें। दोनों संख्याएँ बराबर हैं न?

यह कैसे हुआ?

क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे होगा? निम्न प्रतिरूपों का अवलोकन करें।

$$4^2 - 3^2 = 16 - 9 = 7 = 4 + 3,$$

$$9^2 - 8^2 = 81 - 64 = 17 = 9 + 8,$$

$$13^2 - 12^2 = 169 - 144 = 25 = 13 + 12$$

इन उदाहरणों को देखिए

$$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2, \quad 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2$$

$$5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2 \text{ अर्थात् } 5^2 + 12^2 = 13^2$$

आप भी कुछ और ऐसे उदाहरण खोजें। आप देखेंगे कि हर उदाहरण में संख्याओं की एक तिगड़ी है। इस प्रत्येक तिगड़ी में विशेष प्रकार की संख्याएँ हैं। बड़ी संख्या का वर्ग, शेष दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। इस प्रकार की संख्याएँ पाइथगोरीय त्रिक कहलाती हैं। त्रिक याने तीन संख्याओं की तिगड़ी।

जैसे – (3, 4, 5), (6, 8, 10) एवं (5, 12, 13) पाइथगोरीय त्रिक हैं।

उदाहरण 1. जाँच कीजिए कि (9, 40, 41) पाइथागोरीय त्रिक है या नहीं?

हल: यहाँ $9^2 + 40^2 = 81 + 1600 = 1681$

तथा $41^2 = 1681$

अतः $9^2 + 40^2 = 41^2$, अतः (9, 40, 41) पाइथागोरीय त्रिक है।

अभ्यास 1 (PRACTICE - 1)

जाँच कीजिए कि नीचे दिए गए त्रिक पाइथागोरीय त्रिक हैं अथवा नहीं ?

(i) (5, 12, 13) (ii) (8, 15, 17)

(iii) (10, 15, 25) (iv) (4, 7, 11)

टिप्पणी : हमारे देश में संख्याओं का यह सम्बन्ध बहुत पहले से ज्ञात था। ऐसा माना जाता है कि 600 ईसा पूर्व एक भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने इसे सर्वाधिक व्यापक रूप में व्यक्त किया और अनेक संख्यात्मक उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया।

संख्याओं से पूर्ण वर्ग संख्याएँ बनाना (Making Perfect Squares From numbers)

जैसा कि पृष्ठ क्र. 2 में आपने देखा कि 252 के गुणनखण्डों में अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के जोड़े बन गए किन्तु अभाज्य गुणनखंड 7 का जोड़ा नहीं बना।

यदि इसमें 7 का गुणा या भाग कर दिया जाता तो सभी गुणनखण्डों के जोड़े बन जाएंगे, अर्थात् 7 वह न्यूनतम संख्या है जिसका 252 से गुणा या भाग करने पर गुणनफल या भागफल पूर्ण वर्ग हो जायेगा। आइये, इसे कुछ उदाहरणों से समझे –

उदाहरण 2. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 720 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो।

हल: $720 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5$

720 के अभाज्य गुणनखण्डों में केवल 5 का जोड़ा नहीं बना। अतः पूर्ण वर्ग संख्या वह होगी जिसमें 5 का भी जोड़ा बन जाए इसके लिए हमें 720 को 5 से गुणा करना होगा।

अतः 5 वह छोटी से छोटी संख्या है, जिसका 720 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी।

उदाहरण 3. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या हो।

हल: $140 = 2 \times 2 \times 5 \times 7$

140 के अभाज्य गुणनखण्डों में अभाज्य गुणनखंड 5 एवं 7 के जोड़े नहीं हैं। यदि हम 140 को $5 \times 7 = 35$ से भाग दें तब भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगी।

उदाहरण 4. वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 एवं 8 से पूर्णतः विभाजित हो।

हल: 6 एवं 8 का ल.स. = 24

24 के अभाज्य गुणनखण्ड = $2 \times 2 \times 2 \times 3$

अब हम देखते हैं कि 24 के गुणनखण्डों में 2 एवं 3 के जोड़े नहीं हैं। अतः यदि 24 को $(2 \times 3) = 6$ से गुणा कर दें तब वह ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी जो 6 एवं 8 दोनों से विभाजित होगी। अतः वांछित संख्या $24 \times 6 = 144$ होगी।

इन्हें भी कीजिए – (Try These Also)

$$(10)^2 = 100 \text{ होता है, } (300)^2 = 90000, (5000)^2 = 25000000$$

10 के वर्ग में 2 शून्य हैं, 300 के वर्ग में 4 शून्य तथा 5000 के वर्ग में 6 शून्य हैं, तो क्या कोई ऐसी संख्या सोच सकते हैं जिसका वर्ग करने पर मात्र इकाई के स्थान पर शून्य हों या इकाई, दहाई एवं सैकड़ा तीनों के स्थान पर शून्य हों।

अभ्यास 2 (PRACTICE - 2)

- वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिये जिसका 200 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए।
- वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिये जिसका 180 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए।
- वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिये जिसका 2352 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए।

प्रश्नावली 1.1 (EXERCISE - 1.1)

प्र.1. निम्न संख्याओं के गुणनखण्डों के जोड़े बनाकर बताइये कि ये संख्याएँ पूर्ण वर्ग हैं अथवा नहीं?

- | | | |
|----------|----------|-----------|
| (i) 164 | (ii) 121 | (iii) 289 |
| (iv) 729 | (v) 1100 | |

प्र.2. निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग न होने का कारण बताइये।

- | | | |
|-----------|------------|-----------------------------------|
| (i) 12000 | (ii) 1227 | (iii) 790 |
| (iv) 1482 | (v) 165000 | (vi) 15050 (vii) 1078 (viii) 8123 |

प्र.3. निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या एवं किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है ?

- | | | |
|------------|-------------|------------|
| (i) 14 | (ii) 277 | (iii) 179 |
| (iv) 205 | (v) 608 | (vi) 11288 |
| (vii) 1079 | (viii) 4010 | (ix) 1225 |

प्र.4. निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करें एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।

11^2	=	121
101^2	=	10201
1001^2	=	1002001
10001^2	=	-----
100001^2	=	-----
-----	=	1000002000001

घन संख्याएँ (Cube Numbers)

अब तक हमने वर्ग संख्याओं पर विचार किया। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या की वर्ग संख्या कहते हैं। यदि अब गुणनफल को पुनः उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तब प्राप्त संख्या उस संख्या की घन संख्या बन जाएगी।

जैसे $2 \times 2 \times 2 = 8$ या $2^3 = 8$

$7 \times 7 \times 7 = 343$ या $7^3 = 343$

यहाँ 8 एवं 343 क्रमशः 2 एवं 7 की घन संख्याएँ हैं।

निम्न सारणी का अवलोकन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।

सारणी 1.4

संख्या	तीनबार गुणा	घातीय रूप	घन संख्या
1	$1 \times 1 \times 1$	1^3	1
2	$2 \times 2 \times 2$	2^3	8
3	$3 \times 3 \times 3$	-----	-----
4	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----

उपरोक्त तालिका के अन्तिम स्तम्भ से प्राप्त संख्याएँ 1, 8, 27 इत्यादि क्रमशः 1,2,3,... इत्यादि पूर्णांकों की घन संख्याएँ हैं।

इस प्रकार की संख्याएँ पूर्ण घन संख्याएँ कहलाती हैं।

सारणी में दी गई सम संख्याओं एवं उनके घनों पर विचार करें, आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे? क्या सम संख्याओं के घन भी सम हैं? क्या विषम संख्याओं के घन भी विषम हैं?

घन संख्याओं की पहचान (Recognising Cube Numbers)

कोई संख्या घन संख्या है या नहीं इसकी पहचान कैसे होगी? वर्ग संख्याएँ पहचानने के लिए हमने अभाज्य गुणनखण्डों के जोड़े बनाए थे। जिनके पूरे जोड़े बन गए थे, वे वर्ग संख्याएँ हैं।

घन संख्याओं के लिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। 8 को हम $2 \times 2 \times 2$ के रूप में लिख सकते हैं अर्थात् इसके अभाज्य गुणनखण्ड करने पर हमें पता चलता है कि इसमें 2 को 2 के साथ तीन बार गुणा हुआ है और वह इनसे एक त्रिक (तिगड़ी) बनाने पर और कोई अभाज्य गुणनखण्ड नहीं बचता। इसी तरह 27 को देखें। इसमें तीन का तीन बार गुणा होता है। इसमें भी त्रिक बन जाएगा। यदि 24 को लें तो $24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$ अर्थात् 2 तीन बार है और उससे त्रिक (त्रिक) बन गया किन्तु 3 बच गया, इसका मतलब हुआ कि 24 घन संख्या नहीं है।

इस प्रकार, पूर्ण घन संख्याओं की पहचान के लिए हम देखते हैं कि संख्या के अभाज्य

गुणनखण्डों में समान अभाज्य गुणनखण्डों के यदि सभी गुणनखण्ड त्रिकों में व्यवस्थित हो जाए तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या होगी, अन्यथा नहीं।

आइए, कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे समझें –

उदाहरण 5. 216 पूर्ण घन संख्या है अथवा नहीं?

हल : $216 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times \underline{3 \times 3 \times 3}$ (अभाज्य गुणनखण्ड बनाने पर)
 $= 2^3 \times 3^3$ (सभी गुणनखण्डों के त्रिक बन गए)
 $= (2 \times 3)^3 = 6^3$

यहाँ 216 को 6 के घन के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है।

अतः 216 एक पूर्ण घन संख्या है।

उदाहरण 6. बताइये कि संख्या 23625 पूर्ण घन है अथवा नहीं?

हल : $23625 = \underline{3 \times 3 \times 3} \times \underline{5 \times 5 \times 5} \times 7$ (अभाज्य गुणनखण्ड करने पर)
 यहाँ 23625 के गुणनखण्डों में 3 एवं 5 के त्रिक तो बन गए किन्तु 7 का नहीं।
 अतः 23625 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है।

उदाहरण 7. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 68600 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन संख्या हो?

हल: $68600 = \underline{2 \times 2 \times 2} \times 5 \times 5 \times \underline{7 \times 7 \times 7}$

यहाँ 68600 के गुणनखण्डों में 2 एवं 7 के लिए तो त्रिक बन गए किन्तु 5 के त्रिक बनाने के लिए एक बार और 5 का गुणा करना होगा। अतः 68600 में यदि 5 का गुणा कर दें तब वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी।

उदाहरण 8. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 408375 में भाग करने पर भागफल पूर्ण घन हो जाए?

हल: $408375 = \underline{3 \times 3 \times 3} \times \underline{5 \times 5 \times 5} \times 11 \times 11$

यहाँ 408375 के गुणनखण्डों में 3 एवं 5 के लिए तो त्रिक बन गए किन्तु 11 का त्रिक नहीं बन सका। अतः 408375 में $11 \times 11 = 121$ का भाग दें तब भागफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी।

प्रश्नावली 1.2 (EXERCISE - 1.2)

प्र.1. निम्न संख्याओं में से कौनसी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी नहीं?

- | | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| (i) 125 | (ii) 800 | (iii) 729 | (iv) 2744 |
| (v) 22000 | (vi) 832 | | |

प्र.2. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए।

प्र.3. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1352 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए।

प्र.4. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8019 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए।

प्र.5. प्रश्न 1 में जो संख्याएँ घन संख्याएँ नहीं हैं उन्हें किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल घन संख्या बन जाए

वर्गमूल [Square Root]

अध्याय के शुरुआत में हमने पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में अध्ययन किया। आइए, उसे एक क्रियाकलाप द्वारा पुनः दोहराते हैं :-



क्रियाकलाप 3. (Activity 3)

सारणी 5

क्र.सं.	संख्या	अभाज्य गुणनखण्ड	किस संख्या का वर्ग है
1.	16	$2 \times 2 \times 2 \times 2$	$2 \times 2 = 4$
2.	25	5×5	5
3.	36		
4.	49		
5.	64		
6.	100		
7.	144		
8.	196		

उपरोक्त क्रियाकलाप में आपने देखा कि 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25, 8 का वर्ग 64 है।

इसे इस तरह भी हम कहते हैं कि 64 का वर्गमूल 8 है, 25 का वर्गमूल 5 है।

इसे ऐसे लिखते हैं :-

16 का वर्गमूल $= \sqrt{16} = 4$, 25 का वर्गमूल $= \sqrt{25}$ (वर्गमूल को चिह्न " $\sqrt{\quad}$ " से दर्शाते हैं।)

आपने देखा है कि किसी प्राकृत संख्या n का वर्ग, प्रारंभिक n विषम संख्याओं के योगफल बराबर होता है। (चित्र : 2)

जैसे : $5^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$

जिस प्रकार पाँच प्रारंभिक विषम संख्याओं को जोड़ कर 5 का वर्ग (25) प्राप्त किया है, क्या उसी प्रकार 25 में से विषम संख्याओं को घटाकर 25 का वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं?

आइए देखें—

$$25 - 1 = 24, \quad 24 - 3 = 21, \quad 21 - 5 = 16$$

$$16 - 7 = 9, \quad 9 - 9 = 0,$$

यहाँ 25 में उत्तरोत्तर से प्रारंभिक पाँच विषम संख्याओं को घटाने पर शेषफल शून्य (0) प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि 25 का वर्गमूल 5 है, अर्थात् $\sqrt{25}$

आप भी कुछ पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए इस प्रक्रिया को जाँचे।

आप पायेंगे कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में से जितनी प्रारंभिक विषम संख्याओं को घटाने पर शून्य प्राप्त होता है, वही उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल होता है।

क्या इस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण वर्ग संख्या की जाँच की जा सकती है?

आप पायेंगे कि शेषफल शून्य नहीं होने की दशा में दी गई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती।

अभ्यास 3 (PRACTICE - 3)

निम्नांकित के वर्गमूल मौखिक बताइए :-

- (i) 25 (ii) 49 (iii) 64 (iv) 81 (v) 121 (vi) 144

कुछ संख्याओं के वर्गमूल हम मौखिक निकाल सकते हैं किन्तु सभी संख्याओं के वर्गमूल हम मौखिक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आइए, हम वर्गमूल निकालने की विधि पर चर्चा करें।

(1) अभाज्य गुणनखण्ड विधि द्वारा वर्गमूल : (Square root by prime multiple factors)

इस विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखण्ड ज्ञात कर लेते हैं। इसके पश्चात् समान अभाज्य गुणनखण्डों के जोड़े बनाते हैं तथा प्रत्येक जोड़े से एक संख्या लेकर उनका गुणा कर लेते हैं।



उदाहरण 9. 441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए।

हल : $441 = 3 \times 3 \times 7 \times 7$

अतः $\sqrt{441} = \sqrt{3 \times 3 \times 7 \times 7}$
 $= 3 \times 7$ (प्रत्येक जोड़े में से एक-एक संख्या लेने पर)
 $= 21$

3	441
3	147
7	49
7	7
	1

उदाहरण 10. 1296 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए।

हल : $1296 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$

अतः $\sqrt{1296} = \sqrt{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3}$
 $= 2 \times 2 \times 3 \times 3$
 $= 36$

अभ्यास 4 (PRACTICE - 4)

निम्नांकित के अभाज्य गुणनखण्ड करके वर्गमूल ज्ञात कीजिए

- (i) 289 (ii) 625 (iii) 900 (iv) 361 (v) 1764

उदाहरण 11. यदि एक वर्गाकार चित्र का क्षेत्रफल 2025 वर्ग सेमी हो तब चित्र की एक भुजा की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

हल: वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल = (भुजा)² = 2025 वर्ग सेमी

$$\begin{aligned}
 \text{अतः चित्र की एक भुजा की लम्बाई} &= \sqrt{2025} \\
 &= \sqrt{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5} \\
 &= 3 \times 3 \times 5 \\
 &= 45 \text{ सेमी.}
 \end{aligned}$$

3	2025
3	675
3	225
3	75
5	25
5	5
	1

उदाहरण 12. एक व्यक्ति अपने बाग में 11025 आम के पौधे इस प्रकार लगाता है कि हर पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियाँ हैं तो बाग में कितनी पंक्तियाँ हैं?

हल:

माना बाग में पंक्तियों की संख्या x हैं

चूँकि पौधों की कुल संख्या $= x \times x = x^2$

$$x^2 = 11025 \text{ या } x = \sqrt{11025}$$

$$= \sqrt{3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 7 \times 7}$$

$$= 3 \times 5 \times 7 = 105$$

अतः बाग में पंक्तियों की संख्या = 105

3	11025
3	3675
5	1225
5	245
7	49
7	7
	1

प्रश्नावली 1.3 (EXERCISE - 1.3)

- निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखण्ड द्वारा ज्ञात करिए
 - 361
 - 400
 - 784
 - 1024
 - 2304
 - 7056
- एक बालकों की टोली ने 256 आम खरीदे और आपस में बाँट लिए यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितनी टोली में बालक थे तब बालकों की संख्या बताइये।

भागविधि से वर्गमूल ज्ञात करना (Finding Square Root through Division Method)

अभी तक हमने पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखा है।

गणित में ऐसी भी मजेदार विधि है जिससे हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के अलावा उन संख्याओं के वर्गमूल भी मालूम कर सकते हैं जो पूर्णवर्ग नहीं हैं। इसे वर्गमूल ज्ञात करने की 'भाग विधि' के नाम से जाना जाता है। इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों पर काम करेंगे।

आप जानते हैं कि एक अंक और दो अंक वाली पूर्णवर्ग संख्याओं के वर्गमूल के रूप में हमें एक अंक वाली संख्याएँ ही मिलती हैं। आप इन्हें पहाड़े का उपयोग कर आसानी से जान सकते हैं।

जैसे— $1 \times 1 = 1$, इसलिए 1 का वर्गमूल 1 है।

$3 \times 3 = 9$, इसलिए 9 का वर्गमूल 3 है।

$9 \times 9 = 81$, इसलिए 81 का वर्गमूल 9 है।

81 के बाद की पूर्ण वर्ग संख्या 100 है जो तीन अंक वाली संख्या है। इसका वर्गमूल 10 है, जो दो अंक वाली संख्या है। (क्या किसी संख्या और उसके वर्गमूल में निहित अंकों की संख्या में कोई पैटर्न दिखाई पड़ता है?) तीन अंकों वाली किसी बड़ी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं।

उदाहरण 13. 625 का वर्गमूल ज्ञात करें।

हल :-

पद 1 :- संख्या 625 की इकाई की ओर से आरंभ करते हुए संख्याओं के जोड़े बनाइए। जोड़े बनाने के लिए संख्याओं के ऊपर एक छोटी सी आड़ी रेखा खींच सकते हैं। यहाँ केवल एक जोड़ा बनेगा 25, 6 अकेला रहेगा।

पद 2 :- 625 को भाग चिह्न के भीतर रखिए। अब ऐसा बड़ा से बड़ा भाजक ढूँढ़िए जिसका वर्ग 6 से बड़ा न हो। यहाँ वह 2 होगा।

$$(2 \times 2 = 4, \quad 3 \times 3 = 9, \quad 9 > 6)$$

पद 3 :- भाजक और भागफल में 2 रखते हुए उनके गुणनफल 4 को 6 के नीचे रखकर घटाइए। शेष 2 मिलेगा।

पद 4 :- भाजक में उतनी ही संख्या जोड़िए। 4 मिलेगा। उसे नीचे लिखिए। पद-3 में जो शेष 2 बचा था, उसके आगे पूरी एक जोड़ी संख्या 25 उतारकर रखिए। यह नया भाज्य 225 बनेगा।

पद 5 :- अब हमें भाजक में 4 के आगे और भागफल में 2 के आगे एक ऐसी संख्या रखनी है जिससे उस संख्या और नए भाजक का गुणनफल 225 से अधिक न हो। यदि हम भागफल में 3 रखें तो भाजक में 4 के आगे भी 3 रखेंगे, जिससे नया भाजक 43 होगा।

$$43 \times 3 = 129, \quad 129 < 225$$

क्रमशः भागफल में 4 और 5 रखकर भी देखें।

$$44 \times 4 = 176 < 225$$

$$45 \times 5 = 225 = 225$$

स्पष्ट है कि भागफल में 5 लेना उपयुक्त होगा। इस गुणनफल 225 को नए भाज्य 225 के नीचे रखकर घटाइए। शेष 0 बचेगा। कुल भागफल 25 ही 625 का वर्गमूल होगा।

$$\text{अर्थात् } \sqrt{625} = 25.$$

$$\overline{6} \overline{25}$$

$$\begin{array}{r} \text{भागफल} \\ \sqrt{6 \overline{25}} \quad \text{भाजक} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \sqrt{6 \overline{25}} \\ \underline{-4} \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \sqrt{6 \overline{25}} \\ \underline{-4} \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \sqrt{6 \overline{25}} \\ \underline{-4} \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \sqrt{6 \overline{25}} \\ \underline{-4} \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \sqrt{6 \overline{25}} \\ \underline{-4} \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \sqrt{6 \overline{25}} \\ \underline{-4} \\ 2 \end{array}$$

हल :-

$$\sqrt{94\ 09}$$

94 09

$$\begin{array}{r} 9 \\ 9 \overline{) 94 \, 09} \\ \underline{-81} \\ 13 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 9 \\ 9 \overline{) 94 \, 09} \\ + 9 \quad \underline{- 81} \\ \hline 18 \quad 13 \, 09 \\ \sqrt{} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 97 \\ 9 \overline{) 94 \, 09} \\ + 9 \quad \underline{- 81} \\ 187 \quad \underline{13 \, 09} \\ \quad \underline{- 13 \, 09} \\ \quad \quad 0 \end{array}$$

हल :- आप जानते हैं कि 8772 को 8772.0000 के रूप में लिखा जा सकता है। जिस प्रकार पहले के दोनों उदाहरणों में हमने इकाई से शुरू करके संख्याओं के जोड़े बनाए थे, उसी

प्रकार यहाँ भी बनाएँगे। इकाई दहाई के अंक एक साथ, सैकड़े और हजार के अंक एक साथ। दशमलव चिह्न के दायीं ओर जोड़ियाँ बनाते समय दशांश और शतांश स्थानों के अंक एक साथ रखते हैं और उससे आगे भी इसी तरह।

संख्या 8772.0000 को इस प्रकार लिखेंगे – $\overline{8772.0000}$

पहले की ही तरह 8772 का वर्गमूल ज्ञात करें –

123 शेष बचने के बाद दशमलव चिह्न के बाद के शून्यों का एक जोड़ा उतारें। अब भागफल में जो संख्या लिखेंगे उसके पहले दशमलव का चिह्न लगाएँ। भाग की प्रक्रिया वैसे ही आगे बढ़ाएँ।

यदि वर्गमूल को दशमलव के बाद के दो अंकों तक ही प्राप्त करना हो तो यह प्रक्रिया यहाँ रोकी जा सकती है। यदि आगे बढ़ाना हो तो प्रत्येक बार शून्य का एक जोड़ा शेष के आगे लिखकर नया भागफल प्राप्त करते जाएँगे।

अतः 8772 का वर्गमूल लगभग 93.65 होगा।

$$\sqrt{8772} = 93.65 \text{ लगभग}$$

	93.65
9	$\overline{87\ 72\cdot00\ 00}$
+9	-81
183	672
+3	-549
1866	12300
+6	-11196
18725	110400
	-93625
	16775

प्रश्नावली 1.4 (EXERCISE - 1.4)

प्रश्न 01. निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल, भाग विधि से ज्ञात कीजिए :-

(i) 529 (ii) 1369 (iii) 1024 (iv) 5776

(v) 900 (vi) 7921 (vii) 50625 (viii) 363609

प्रश्न 02. एक सिनेमा हॉल में सिनेमा मालिक सीटों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि सिनेमा हॉल में जितनी स्तम्भों की संख्या है, उतनी ही संख्या पंक्तियों की हों। यदि उस हॉल में कुल 1849 सीटें हों तो पंक्तियों व स्तम्भों की संख्या ज्ञात कीजिए?

प्रश्न 03. एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 1444 वर्ग मीटर हो, तो बगीचे की लम्बाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए?

उदाहरण 16. 51.84 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए।

हल :-

	7.2
7	$\overline{51.84}$
+7	-49
142	0284
	-284
√	000

$$\sqrt{51.84} = 7.2$$

उदाहरण 17. 23.1 का वर्गमूल दशमलव के दो स्थानों तक ज्ञात कीजिए।

हल :-

$$\begin{array}{r}
 4.80 \\
 4 \overline{) 23.10\,00\,00} \\
 \underline{+ 4} - 16 \\
 88 07\,10 \\
 \underline{8} - 7\,04 \\
 960 6\,00 \\
 \underline{- 0\,00} \\
 6\,00
 \end{array}$$

$$\sqrt{23.1} = 4.80$$

उदाहरण 18. 2 का वर्गमूल दशमलव के तीन स्थानों तक ज्ञात कीजिए।

हल :-

$$\begin{array}{r}
 1.414 \\
 1 \overline{) 2.00\,00\,00} \\
 \underline{+ 1} - 1 \\
 24 1\,00 \\
 \underline{+ 4} - 96 \\
 281 04\,00 \\
 \underline{+ 1} - 2\,81 \\
 2824 1\,19\,00 \\
 \underline{- 1\,12\,96} \\
 0\,07\,04
 \end{array}$$

प्रश्नावली-1.5 (EXERCISE - 1.5)

प्रश्न 01. निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए :-

(i) 7.29 (ii) 16.81 (iii) 9.3025

प्रश्न 02. निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल दशमलव के दो स्थानों तक ज्ञात कीजिए :-

(i) 0.9 (ii) 5 (iii) 7

घनमूल (Cube root)

किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमने उसके अभाज्य गुणनखण्डों में से समान गुणनखण्डों के दो-दो के जोड़ों का प्रयोग किया था। प्रत्येक जोड़े में से एक-एक संख्या लेकर उनका गुणा करके वर्गमूल प्राप्त किया था। किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए उसके अभाज्य गुणनखण्डों में से

समान गुणनखण्डों के तीन-तीन के त्रिक (तिकड़ी) बनाएँगे तथा ऐसी प्रत्येक तिकड़ी से एक-एक संख्या लेकर उनका गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। यही दी गई संख्या का घनमूल होगा।

उदाहरण 17. 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए।

हल :-

$$512 = \underline{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}$$

$$\sqrt[3]{512} = \begin{matrix} 2 & 2 & 2 \end{matrix}$$

$$\sqrt[3]{512} = 8$$

2	512
2	256
2	128
2	64
2	32
2	16
2	8
2	4
2	2
	1

उदाहरण 18. 91,125 का घनमूल ज्ञात कीजिए।

(संकेत —: हम देखते हैं कि संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है अतः संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी।)

हल :-

$$91,125 = \begin{matrix} 5 & 5 & 5 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \end{matrix}$$

$$\sqrt[3]{91,125} = \begin{matrix} 5 & 3 & 5 \end{matrix}$$

$$\sqrt[3]{91,125} = 45$$

5	91,125
5	18,225
5	3,645
3	729
3	243
3	81
3	27
3	9
3	3
	1

प्रश्नावली—1.6 (EXERCISE - 1.6)

1. निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए :-

(i) 125

(ii) 343

(iii) 1331

(vi) 2197

(v) 9261

(vi) 166375

(vii) 4913

(viii) 42875



हमने सीखा (We Have Learnt)

- यदि n कोई संख्या है तब $n \times n$ या n^2 इसका वर्ग कहलाएगा और $n \times n \times n$ या n^3 इसका घन।
- जिन संख्याओं के इकाई में 2, 3, 7 या 8 हो वे पूर्ण वर्ग संख्याएँ नहीं हो सकती हैं।
- यदि पूर्ण वर्ग संख्या के अन्त में सम संख्या में शून्य हो तो वे भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी।
- सम संख्याओं के वर्ग एवं घन सदैव सम संख्याएँ एवं विषम संख्याओं के वर्ग एवं घन सदैव विषम संख्याएँ होती हैं।
- किसी प्राकृत संख्या n का वर्ग, प्रारम्भिक n विषम संख्याओं के योगफल के बराबर होता है।
- यदि तीन संख्याएँ इस प्रकार हो कि बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो तब संख्याएँ पाइथागोरिय त्रिक कहलाती हैं। जैसे $3^2 + 4^2 = 5^2$ अतः (3, 4, 5) पाइथागोरिय त्रिक है।
- वर्गमूल को ' $\sqrt{\quad}$ ' चिह्न के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस चिह्न को करणी चिह्न कहते हैं।



अध्याय-2

घातांक

EXPONENT

पूर्णाकों की घात (Exponents of Integers)

अब तक हमने प्राकृत संख्याओं के घातांकों पर विचार किया, परन्तु फातिमा के मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि ऋणात्मक संख्याओं की घातांकों से सम्बंधित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? उसने सोचा कि क्यों न धनात्मक के स्थान पर ऋणात्मक संख्या लिख कर उसके किसी भी घात के लिए हल करके देखें –

$$\begin{aligned}(-1)^2 &= (-1) \times (-1) = 1 \\(-1)^3 &= (-1) \times (-1) \times (-1) \\&= \{(-1) \times (-1)\} \times (-1) = 1 \times (-1) = -1 \\(-1)^4 &= (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) \\&= \{(-1) \times (-1)\} \times \{(-1) \times (-1)\} \\&= 1 \times 1 = 1 \\(-1)^5 &= (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) \\&= \{(-1) \times (-1)\} \times \{(-1) \times (-1)\} \times (-1) \\&= 1 \times 1 \times (-1) = -1\end{aligned}$$

इन्हें देखकर कमली ने कहा “जब (-1) का घात सम संख्या है तब उसका मान 1 एवं जब (-1) का घात विषम संख्या है तब उसका मान -1 है।”

अर्थात्

$$(-1)^{\text{सम संख्या}} = 1$$

एवं

$$(-1)^{\text{विषम संख्या}} = -1$$

इस प्रकार फातिमा एवं कमली के समझ में यह बात आ गई कि $(-1)^{25} = -1$, $(-1)^{50} = 1$
 $(-1)^{143} = -1$, $(-1)^{144} = 1$ इत्यादि।

अब निम्नांकित पर विचार करें :-

$$\begin{aligned}(-5) &= (-1) \times 5 \\(-5)^4 &= \{(-1) \times 5\}^4 \\&= (-1)^4 \times 5^4 \quad [\because (a \times b)^m = a^m \times b^m \text{ से}] \\&= 1 \times 5^4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 5^4 \\
 (-27)^{13} &= \{(-1) \times 27\}^{13} \\
 &= (-1)^{13} \times 27^{13} \\
 &= (-1) \times 27^{13} \quad [\because (-1)^{\text{विषम संख्या}} = -1] \\
 &= -27^{13} \\
 (-m)^{16} &= \{(-1) \times m\}^{16} \\
 &= (-1)^{16} \times m^{16} \quad [\because (-1)^{\text{सम संख्या}} = 1] \\
 &= m^{16}
 \end{aligned}$$

सोचकर बताएँ कि घातांक संख्याओं $(-35)^{12}$, $(-149)^{23}$, $(-m)^{37}$, $(-m)^{100}$, $(-11)^{111}$ में से कौनसी धनात्मक होगी एवं कौन-सी ऋणात्मक? क्या आप इनसे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आप पायेंगे कि यदि a और m कोई प्राकृत संख्याएँ हों, तो $(-a)^m = \{(-1) \times a\}^m = (-1)^m \times a^m$

अर्थात् $(-a)^m$ धनात्मक है या ऋणात्मक, $(-1)^m$ पर निर्भर करता है।
या $(-a)^m$ धनात्मक होगा यदि m सम संख्या हो तथा ऋणात्मक होगा यदि m विषम संख्या हो

उदाहरण 1. सरल कीजिए –

- (i) $(-5)^4 \times (-5)^7$
- (ii) $(-4)^2 \times (-4)^6 \times (-4)^{17}$
- (iii) $(-9)^8 \div (-9)^2$
- (iv) $(-x)^7 \div (-x)^4$

हल :

$$\begin{aligned}
 \text{(i)} \quad (-5)^4 \times (-5)^7 &= [(-1) \times 5]^4 \times [(-1) \times 5]^7 \\
 &= [(-1)^4 \times 5^4] \times [(-1)^7 \times 5^7] \\
 &= 1 \times 5^4 \times (-1) \times 5^7 \\
 &= -1 \times 5^{4+7} = -5^{11} \quad [\because a^m \times a^n = a^{m+n}] \\
 \text{(ii)} \quad (-4)^2 \times (-4)^6 \times (-4)^{17} &= [(-1) \times (4)]^2 \times [(-1) \times (4)]^6 \times [(-1) \times (4)]^{17} \\
 &= (-1)^2 \times (4)^2 \times (-1)^6 \times (4)^6 \times (-1) \times (4)^{17} \\
 &= 1 \times 4^2 \times 1 \times 4^6 \times (4)^{17} \times (-1) \times 4^{17} \\
 &= -4^{2+6+17} \\
 &= -4^{25} \quad [\because a^\ell \times a^m \times a^n = a^{\ell+m+n}] \\
 \text{(iii)} \quad (-9)^8 \div (-9)^2 &= \frac{(-9)^8}{(-9)^2} = \frac{\{(-1) \times 9\}^8}{\{(-1) \times 9\}^2} \\
 &= \frac{(-1)^8 \times 9^8}{(-1)^2 \times 9^2} = \frac{1 \times 9^8}{1 \times 9^2} = \frac{9^8}{9^2} \\
 &= 9^{8-2} = 9^6 \quad [\because a^m \div a^n = a^{m-n}]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(iv)} \quad (-x)^7 \div (-x)^4 &= \frac{(-x)^7}{(-x)^4} = \frac{\{(-1) \times x\}^7}{\{(-1) \times x\}^4} \\
 &= \frac{(-1)^7 \times x^7}{(-1)^4 \times x^4} = \frac{-1 \times x^7}{1 \times x^4} \\
 &= (-1) \times x^{7-4} = -x^3 \quad [\because a^m \div a^n = a^{m-n}]
 \end{aligned}$$

प्रश्नावली 2.1 (EXERCISE - 2.1)

- सरल करें :—
 (a) $(-5)^3$ (b) $(-4)^5$ (c) $(-2)^6$ (d) $(-3)^6$
- निम्न को घातांक के रूप में लिखें :—
 (a) $5^4 \times (-5)^2$ (b) $15 \times (-15)^{25}$
 (c) $12^5 \div (-12)^3$ (d) $(-p)^{14} \div (-p)^7$
- दोनों पक्षों को हल कर निम्न कथनों की सत्यता की जाँच कीजिए :—
 (a) $(-2)^4 \times (-2)^2 = (-2)^8 \div (-2)^2$
 (b) $(-3)^2 \times (-3)^{-6} = \frac{1}{(3^2)^2}$
 (c) $(-7)^{32} \div (-7)^{32} = 1$

परिमेय संख्याओं की घात (Exponents of rational numbers)

रजिया के मन में विचार आया कि अभी तक हमने प्राकृत संख्याओं एवं पूर्णाकों के घातांकों पर ही विचार किया है किन्तु इनके स्थान पर यदि परिमेय संख्याएं हों तब क्या होगा?

आइए, रजिया के सवाल का जवाब ढूँढ़ें।

परिमेय संख्याओं के कुछ घातांकों पर विचार कीजिए:—

$$\begin{aligned}
 (1) \quad \left(\frac{5}{7}\right)^4 &= \frac{5}{7} \times \frac{5}{7} \times \frac{5}{7} \times \frac{5}{7} \\
 &= \frac{5 \times 5 \times 5 \times 5}{7 \times 7 \times 7 \times 7} = \frac{5^4}{7^4}
 \end{aligned}$$

$$(2) \quad \left(-\frac{3}{11}\right)^5 = \left\{(-1) \times \left(\frac{3}{11}\right)\right\}^5 = (-1)^5 \times \left(\frac{3}{11}\right)^5$$

$$\begin{aligned}
 &= (-1) \times \frac{3}{11} \times \frac{3}{11} \times \frac{3}{11} \times \frac{3}{11} \times \frac{3}{11} \quad [\because (-1)^5 = -1] \\
 &= -\frac{3^5}{11^5} \\
 (3) \quad \left(-\frac{4}{3}\right)^6 &= (-1)^6 \times \left(\frac{4}{3}\right)^6 \\
 &= \frac{4}{3} \times \frac{4}{3} \times \dots \text{ 6 बार} \quad [\because (-1)^6 = 1] \\
 &= \frac{4^6}{3^6}
 \end{aligned}$$

अतः यदि हमारे पास कोई परिमेय संख्या $\left(\frac{5}{4}\right)^m$ हो, तब

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{5}{4}\right)^m &= \frac{5}{4} \times \frac{5}{4} \times \frac{5}{4} \times \dots \text{ (m बार)} \\
 &= \frac{5 \times 5 \times \dots \text{m बार}}{4 \times 4 \times \dots \text{m बार}} = \frac{5^m}{4^m}
 \end{aligned}$$

अब आप $\left(\frac{3}{2}\right)^3, \left(\frac{9}{4}\right)^5, \left(-\frac{4}{7}\right)^6, \left(-\frac{2}{5}\right)^3, \left(\frac{2}{3}\right)^p$ को विस्तारित करके देखें।

यदि कोई परिमेय संख्या $\frac{p}{q}$ (जहाँ $q \neq 0$) की घात m हो, तब

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{p}{q}\right)^m &= \frac{p}{q} \times \frac{p}{q} \times \frac{p}{q} \times \dots \text{ (m बार)} \\
 &= \frac{p \times p \times p \times \dots \text{m बार}}{q \times q \times q \times \dots \text{m बार}} = \frac{p^m}{q^m}
 \end{aligned}$$

अर्थात् $\boxed{\left(\frac{p}{q}\right)^m = \frac{p^m}{q^m}}$ जहाँ p, q कोई पूर्णांक हैं एवं $q \neq 0$

अब यदि परिमेय संख्या का घात ऋणात्मक हो, तब स्थिति कैसी होगी?
निम्न उदाहरणों पर विचार कीजिए :-

$$\left(\frac{5}{4}\right)^{-2} = \left(\frac{5^{-2}}{4^{-2}}\right) = \frac{1/5^2}{1/4^2} = \frac{4^2}{5^2} = \left(\frac{4}{5}\right)^2 \quad \left[\because \left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m} \text{ और } a^{-m} = \frac{1}{a^m} \right]$$

$$\left(\frac{3}{7}\right)^{-4} = \frac{3^{-4}}{7^{-4}} = \frac{1/3^4}{1/7^4} = \frac{7^4}{3^4} = \left(\frac{7}{3}\right)^4$$

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{-m} = \frac{2^{-m}}{5^{-m}} = \frac{1/2^m}{1/5^m} = \frac{5^m}{2^m} = \left(\frac{5}{2}\right)^m$$

अभ्यास (PRACTICE - 1)

निम्नलिखित को स्वयं हल करने का प्रयास करें -

$$\left(\frac{7}{5}\right)^{-5}, \left(\frac{14}{13}\right)^{-9}, \left(\frac{15}{6}\right)^{-4}, \left(\frac{113}{53}\right)^{-11}, \left(\frac{5}{7}\right)^{-7}$$

पुनः विचार करें :-

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-m} = \frac{a^{-m}}{b^{-m}} = \frac{b^m}{a^m} = \left(\frac{b}{a}\right)^m$$

इस प्रकार स्पष्ट है कि -

$$\boxed{\left(\frac{a}{b}\right)^{-m} = \left(\frac{b}{a}\right)^m} \quad \text{यहाँ } a, b \text{ कोई पूर्णांक हैं तथा } a \neq 0, b \neq 0$$

उदाहरण 2. निम्न को सरल कीजिए -

$$1. \quad \left(\frac{5}{7}\right)^4 \times \left(\frac{7}{5}\right)^2 \quad 2. \quad \left(-\frac{2}{9}\right)^{-4} \times \left(\frac{9}{2}\right)^2$$

हल : 1. $\left(\frac{5}{7}\right)^4 \times \left(\frac{7}{5}\right)^2 = \left(\frac{5}{7}\right)^4 \times \left(\frac{5}{7}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{7}\right)^{4+(-2)} \quad \left[\because \left(\frac{a}{b}\right)^m \times \left(\frac{b}{a}\right)^{-m} \right] \text{ एवं } [\because a^m \times a^n = a^{m+n}]$

$$\left(\frac{5}{7}\right)^2 = \frac{5^2}{7^2} = \frac{25}{49}$$

हल : 2. $\left(-\frac{2}{9}\right)^{-4} \times \left(\frac{9}{2}\right)^2 = \left(-\frac{9}{2}\right)^4 \times \left(\frac{9}{2}\right)^2$

$$\begin{aligned}
 &= (-1)^4 \times \left(\frac{9}{2}\right)^4 \times \left(\frac{9}{2}\right)^2 \\
 &= 1 \times \left(\frac{9}{2}\right)^{4+2} \\
 &= \left(\frac{9}{2}\right)^6 = \frac{531441}{64}
 \end{aligned}$$

3. $-\frac{36}{49}$ को घात के रूप में व्यक्त कीजिए।

$$\begin{aligned}
 \text{यहाँ } -\frac{36}{49} &= (-1) \times \frac{36}{49} \\
 &= (-1) \times \left(\frac{6}{7}\right)^2 = -\left(\frac{6}{7}\right)^2
 \end{aligned}$$

प्रश्नावली 2.2 (EXERCISE - 2.2)

1. निम्न को सरल कीजिए :-

$$(a) \left(\frac{2}{7}\right)^3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 \quad (b) \left(\frac{4}{5}\right)^4 \times \left(\frac{5}{4}\right)^2$$

$$(c) (-5)^3 \div \left(-\frac{1}{5}\right)^2 \quad (d) \left(\frac{3}{4}\right)^3 \times \left(\frac{3}{4}\right)^{-5}$$

2. घात के रूप में व्यक्त कीजिए :-

$$(a) -\frac{25}{49} \quad (b) \frac{27}{125} \quad (c) \frac{729}{64}$$

3. सिद्ध कीजिए :-

$$(a) \left(\frac{5}{7}\right)^7 \times \left(\frac{7}{5}\right)^7 - \left(\frac{3}{19}\right)^2 \times \left(\frac{19}{3}\right)^2 = 0$$

$$(b) \left(\frac{p}{q}\right)^m \times \left(\frac{p}{q}\right)^m \times \left(\frac{q}{p}\right)^m = \left(\frac{q}{p}\right)^{-m}$$

$$(c) \left(\frac{25}{16}\right)^{-4} = \left(\frac{16}{25}\right)^4$$



4. सत्य या असत्य लिखिए :-

(a) $\left(\frac{-5}{4}\right)^{65} = \frac{-5^{65}}{4^{65}}$

(b) $\left(\frac{-32}{19}\right)^{150} = \frac{32^{150}}{19^{150}}$

(c) $(25 \times 3)^5 = 25 \times 3^5$

(d) $\left(\frac{27}{16}\right)^{-15} = \frac{27^{15}}{16^{15}}$

हमने सीखा (We Have Learnt)

1.

$$(-1)^{\text{सम संख्या}} = 1$$

एवं

$$(-1)^{\text{विषम संख्या}} = -1$$

2.

यदि $\frac{p}{q}$ कोई परिमेय संख्या हो, तो

$$\left(\frac{p}{q}\right)^m = \frac{p^m}{q^m}$$

3.

यदि $\frac{a}{b}$ कोई परिमेय संख्या हो, तो

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-m} = \left(\frac{b}{a}\right)^m$$

अध्याय—3

समान्तर रेखाएँ

PARALLEL LINES



समान्तर रेखाएँ (Parallel Lines)

पिछली कक्षा में आपने समान्तर रेखाओं के बारे में पढ़ा है। ये एक ही तल पर स्थित ऐसी दो रेखाएँ हैं, जिनके बीच की लम्बवत् दूरी सदैव समान रहती है। इन्हें दोनों ओर कितना भी बढ़ाया जाए, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं।

वर्ग या आयत की सम्मुख भुजाएँ, श्यामपट के सम्मुख किनारे, रेल की पटरी इत्यादि समान्तर रेखाओं के उदाहरण हैं। आप भी समान्तर रेखाओं के ऐसे ही कुछ उदाहरणों को सोच कर अपने कॉपी में लिखें।


समान्तर रेखाओं के बीच की दूरी (Distance between two parallel lines:)

दो समान्तर रेखाओं की लम्बवत् दूरी सदैव समान होती है। इसे ज्ञात करने के लिए, एक रेखा के किसी बिन्दु से दूसरी रेखा पर लम्ब डालते हैं। इस प्रकार प्राप्त लम्ब की लम्बाई ही उन रेखाओं के बीच की दूरी होती है।



क्रियाकलाप 1 (Activity 1)

अपनी कॉपी पर दो समान्तर रेखाएँ बनाएं। उनके बीच की दूरी को अलग-अलग बिन्दुओं पर नाप कर अवलोकन सारणी को पूर्ण कीजिए —



चित्र 3.1

सारणी 3.1 (Table 3.1)

क्रमांक	रेखा l पर चिह्नित बिन्दु	रेखा l से समान्तर रेखा m पर डाले गए लम्ब का बिन्दु	दूरी (सेमी में)
1	A		
2	B	Q	BQ =.....
3	C		
4	D		

क्या प्रत्येक स्थिति में दोनों रेखाओं के बीच की दूरी समान है?

.....


दी गई रेखा से निश्चित दूरी पर समान्तर रेखा खींचना

(To draw a parallel line at a given distance with respect to a given line)

रेखा l खींच कर इससे 3 सेमी की दूरी पर एक समान्तर रेखा m की रचना करना—


रचना के चरण

- दी गई रेखा l पर कोई बिन्दु P लीजिए (चित्र 3.2)




चित्र 3.2

- P पर $PQ \perp l$ बनाइए (चित्र 3.3)




चित्र 3.3

- बिन्दु P को केन्द्र मानकर परकार की सहायता से PQ पर 3 सेमी. त्रिज्या का चाप काटिए जो PQ को R पर मिलता है। (चित्र 3.4)



चित्र 3.4

4. बिन्दु R पर $RS \perp PR$ बनाइए तथा RS को आगे बढ़ाकर रेखा m बनाइए (चित्र 3.5)



चित्र 3.5

रेखा m, रेखा l से 3 सेमी. दूरी पर स्थित समान्तर रेखा है।

टीप – सेट स्क्वायर की सहायता से भी दी गई रेखा से निश्चित दूरी पर समांतर रेखा खींची जा सकती है।

समान्तर रेखाओं से सम्बन्धित कुछ गुणधर्म

(Some characteristic features of parallel lines)




1. एक ही रेखा के दो बिन्दुओं पर खींची गई लम्बवत् रेखाएँ परस्पर समान्तर होती हैं।



क्रियाकलाप 2. (Activity 2)

एक रेखा l खींच कर उस पर कोई दो बिन्दु A एवं B लीजिए बिन्दु A से रेखा l पर लम्ब AM तथा बिन्दु B से लम्ब BN बनाइये।



चित्र 3.6

अब अपने मित्रों को भी इसी प्रकार अपनी-अपनी कॉपी में एक रेखा के लम्बवत् दो रेखाएँ खींचने को कहें तथा संगत कोण माप कर सारणी की पूर्ति करने को कहें –


सारणी 3.2 (Table 3.2)

क्र.सं.	नाम	$\angle 1$	$\angle 2$	क्या $\angle 1 = \angle 2$ है?
1.	मोहन	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----	-----
4.	-----	-----	-----	-----

हम देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में $\angle 1 = \angle 2$, चूँकि ये कोण संगत कोण हैं, अतः रेखाएँ AM एवं BN समान्तर रेखा होंगी। इस प्रकार एक ही तल में स्थित किसी रेखा के दो बिन्दुओं पर खींची गई लम्बवत् रेखाएँ आपस में समान्तर होती हैं।

अभ्यास — 1 (Practice -1)

1. एक रेखा खींच कर उससे 5 सेमी. की दूरी पर इसके समान्तर रेखा की रचना कीजिए।
2. एक रेखा खींच कर उससे 4.3 सेमी. की दूरी पर इसके समान्तर रेखा की रचना कीजिए। इस प्रकार किसी रेखा के समान्तर अधिकतम कितनी समान्तर रेखाएँ खींची जा सकती हैं?
3. ABCD एक समलम्ब चतुर्भुज है जिसमें $AB \parallel CD$, $CL \perp AB$ और $DM \perp AB$ है तो क्या $CL \parallel DM$? चतुर्भुज DMLC किस प्रकार का चतुर्भुज होगा? $\triangle ADM$ और $\triangle LCB$ किस प्रकार के त्रिभुज हैं?






2. एक ही रेखा के समान्तर दो रेखाएँ परस्पर समान्तर होती है



क्रियाकलाप 3

निम्न चित्रों में रेखाएँ m एवं n एक ही रेखा ℓ के समान्तर रेखाएँ हैं तथा t एक तिर्यक रेखा है जो इन्हें प्रतिच्छेद करती है। अब चित्रानुसार कोणों को माप कर सारणी की पूर्ति कीजिए—




सारणी 3.3

चित्र क्रमांक	कोणों की माप (अंश में)							
	$\angle 1$	$\angle 2$	$\angle 3$	$\angle 4$	$\angle 5$	$\angle 6$	क्या $\angle 2 = \angle 3$?	क्या $\angle 5 = \angle 6$?
3.7								
3.8								
3.9								

चित्र से हम पाते हैं कि $\angle 2 = \angle 3$ तथा $\angle 5 = \angle 6$, किन्तु ये संगत कोण हैं। अतः रेखाएँ m व n आपस में समान्तर होंगी अर्थात् “**एक ही रेखा के समान्तर खींची गई सभी रेखाएँ परस्पर समान्तर होती हैं।**”

अभ्यास 2 (Practice - 2)


- चित्र में ABCD एक समलम्ब चतुर्भुज है जिसमें $AB \parallel DC$ है। रेखाखण्ड $EF \parallel AB$ तथा E व F क्रमशः AD व BC पर हैं।
क्या $EF \parallel DC$ होगी, यदि हाँ तो क्यों ?
- इस आकृति में कितने समलम्ब चतुर्भुज हैं।
नाम लिखिए।



अन्तःखण्ड (Intercepts)

जब दो सरल रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा का सरल रेखाओं के बीच कटा हुआ भाग **अन्तःखण्ड** कहलाता है। चित्र में AB, रेखा ℓ एवं m के द्वारा रेखा n पर काटा गया अन्तःभाग है इसे अन्तःखण्ड AB कहेंगे।


यह आवश्यक नहीं है कि दो रेखाएँ ℓ एवं m समान्तर ही हों।



चित्र 3.10


अभ्यास 3

1. निम्न चित्र में अन्तःखण्ड की पहचान कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए




चित्र 3.11

अन्तःखण्ड _____



चित्र 3.12

अन्तःखण्ड _____



चित्र 3.13


अन्तःखण्ड _____

समान्तर रेखाएँ एवं समान अन्तःखण्ड (Parallel lines and equal intercepts)




क्रियाकलाप 4





दिए गए चित्रों में रेखा P पर तीन बिन्दु A, B, C इस प्रकार लिए गए हैं कि $AB = BC$, इन बिन्दुओं से होती हुए तीन समान्तर रेखाएँ l, m व n खींची गई हैं। इन समान्तर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक तिर्यक रेखा t खींची गई है, जो इन्हें क्रमशः D, E व F पर काटती है। स्केल की सहायता से नापकर दी गई सारणी पूरा कीजिए—



चित्र 3.14



चित्र 3.15



सारणी 3.4

चित्र.क्र.	DE	EF	क्या $DE = EF$?
3.14			
3.15			
3.16			
3.17			
3.18			
3.19			


उपरोक्त क्रियाकलाप में आपने पाया कि प्रत्येक स्थिति में $DE = EF$ प्राप्त होता है।

अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि “तीन समान्तर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा समान अन्तःखण्ड काटती है तो दूसरी तिर्यक रेखा भी समान अन्तःखण्ड काटेगी।”




क्रियाकलाप 5.


दिए गए चित्रों में $\ell \parallel m \parallel n$ है तथा तिर्यक रेखाएँ s व t तीनों समान्तर रेखाओं को A, B, C तथा D, E, F पर काटती हैं। स्केल की सहायता से सारणी में दिए गए मापों को नाप कर सारणी पूर्ण कीजिए?



चित्र 3.20



चित्र 3.21



चित्र 3.22

सारणी 3.5

क्र.सं.	चित्र क्र.	AB	BC	$\frac{AB}{BC}$	DE	EF	$\frac{DE}{EF}$	क्या $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$?
1.	3.20							
2.	3.21							
3.	3.22							

उपरोक्त क्रियाकलाप में प्रत्येक स्थिति में $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$ प्राप्त होता है।


अतः “तीन समान्तर रेखाओं पर किसी एक तिर्यक रेखा के द्वारा काटे गए अंतःखण्डों का जो अनुपात होता है, वहीं अनुपात अन्य तिर्यक रेखाओं में भी होता है।”

प्रश्नावली 3.1 (Exercise 3.1)


1. 6 सेमी. का एक रेखाखण्ड खींचकर इस पर कोई बिन्दु P लेकर 2.5 सेमी. दूरी पर एक समान्तर रेखा खींचिए।

2. दी गई आकृति में $\ell \parallel m$, $t \perp m$ एवं $t \perp n$ है, तो

- (i) क्या $m \parallel n$ है? क्यों?
 (ii) क्या $\ell \parallel n$ है? क्यों?
 (iii) क्या $t \perp \ell$ है? क्यों?




3. दिए गए चित्र में $a \parallel b \parallel c$ है तथा ℓ व m दो तिर्यक रेखाएँ हैं यदि $PQ = QR$ हो, तो क्या $ON = NS$ है? क्यों?




4. दी गई आकृति में $AB \parallel DC$, $EF \parallel AB$ और E रेखाखण्ड AD का मध्य बिन्दु है, तब

- (i) क्या $AB \parallel EF \parallel DC$ है? क्यों?
 (ii) क्या F, रेखाखण्ड CB का मध्यबिन्दु है? क्यों?




5. दी गई आकृति में $\ell \parallel m \parallel n$ है, तो क्या इनके अन्तःखण्डों का अनुपात बराबर होगा?



6. यदि DA, CB और OM सभी रेखाखण्ड AB पर लम्ब हैं जहाँ O रेखाखण्ड AC व DB का प्रतिच्छेद बिन्दु है। यदि $OA = 2.4$ सेमी. व $OC = 3.6$ सेमी. हो, तो

- (i) $\frac{AM}{BM}$ मान ज्ञात करो।

- (ii) यदि $BO = 3$ सेमी. तो DO का मान ज्ञात कीजिए।








त्रिभुज में एक भुजा के समान्तर खींची गई रेखा का अन्य दोनों भुजाओं से संबंध—



क्रियाकलाप 6.

नीचे दिए गए ABC में $DE \parallel BC$ है, जो AB को D तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। चित्र की सहायता से सारणी में आये तथ्यों के मान माप कर लिखिए।



सारणी 3.6

क्र.सं.	चित्र क्र.	AD	DB	$\frac{AD}{DB}$	AE	EC	$\frac{AE}{EC}$	क्या $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$?
1.	3.23							
2.	3.24							
3.	3.25							
4.	3.26							
5.	3.27							

उपरोक्त क्रियाकलाप में प्रत्येक स्थिति में $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ प्राप्त होता है।


“अतः किसी त्रिभुज में एक भुजा के समान्तर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है।”

त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को मिलाने वाली रेखा का तीसरी भुजा से सम्बन्ध




क्रियाकलाप 7


दिये गये $\triangle ABC$ में AB व AC के मध्य बिन्दु D व E हैं। DE पर बनने वाले कोण तथा B व C पर बने कोण को नाप कर सारणी में भरिए।




चित्र 3.28



चित्र 3.29



चित्र 3.30



चित्र 3.31

सारणी 3.7

क्र.सं.	चित्र क्र.	$\angle ADE$	$\angle B$	क्या $\angle ADE = \angle B$?	$\angle AED$	$\angle C$	क्या $\angle AED = \angle C$?
1.	3.28						
2.	3.29						
3.	3.30						
4.	3.31						

आप उपरोक्त क्रियाकलाप में पाते हैं कि $\angle ADE = \angle B$ तथा $\angle AED = \angle C$ है। पुनः इन कोणों को ध्यान से देखिए? इन कोणों को आप किस नाम से जानते हैं?

जब संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाओं में क्या सम्बन्ध होता है?

अतः “त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को मिलाने वाले रेखा तीसरी भुजा के समान्तर होती है।”

रेखाखण्ड का समान भागों में विभाजन (Division of a line segment into equal parts)

सलमा ने अशोक से कहा, क्या तुम 5 सेमी के एक रेखाखण्ड को तीन समान भागों में विभाजित कर सकते हो ?

अशोक ने कहा, क्यों नहीं उसने 5 को तीन से भाग दिया और $\frac{5}{3}=1.66..$ सेमी प्राप्त हुआ चूँकि स्केल से 1.66 सेमी मापा नहीं जा सकता है इसलिए उसने 1.6 सेमी तथा 1.6 सेमी के दो खण्ड किए तो तीसरा खण्ड 1.8 सेमी प्राप्त हुआ।

इस पर सलमा ने कहा, स्केल से मापकर किसी रेखाखण्ड को मनचाहे भागों में बाँटना तो सम्भव नहीं है, इसलिए कोई न कोई तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे बिना मापे रेखाखण्डों को समान भागों में विभाजित किया जा सके।

आइए देखें, किस प्रकार समान्तर रेखाओं का उपयोग कर बिना स्केल की सहायता से मापन किये बिना किसी रेखाखण्ड को कई समान भागों में विभाजित किया जा सकता है।

उदाहरण 1.

दिये गये रेखाखण्ड AB को 6 समान भागों में विभक्त करना।

रचना के पद


1. रेखाखण्ड AB के बिन्दु A पर न्यून कोण बनाते हुए AC किरण खींचें।
2. अब किरण AC के बिन्दु A से परकार की सहायता से समान दूरियों पर 6 भाग $AC_1, C_1C_2, C_2C_3, \dots, C_5C_6$ काटिये।
3. C_6 को B से मिलाइये और C_6B के समान्तर रेखाएँ क्रमशः $C_5, C_4, \dots, C_1$ से खींचिए जो रेखाखण्ड BA को $B_5B_4B_3 \dots B_1$ पर मिलती हैं।

इस प्रकार, AB रेखाखण्ड $AB_1, B_1B_2, B_2B_3, B_3B_4, B_4B_5, B_5B$, 6 समान भागों में विभक्त हो गया।


उदाहरण 2. 4 सेमी. लम्बाई का रेखाखण्ड लेकर इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए।

रचना के पद

1. 4 सेमी. लम्बाई लेकर रेखाखण्ड AB खींचिए उसके बाद AC किरण खींचिए जो AB पर न्यून कोण बनाए



चित्र 3.32



चित्र 3.33


2. किरण AC को परकार की सहायता से समान माप के चाप काट कर अनुपात के योगफल $(2+3=5)$ अर्थात् पाँच बराबर भागों में चिह्नित कीजिए। जैसे- $AC_1, C_1C_2, \dots, C_4C_5$ ।
3. अब C_5B मिलाइये और उसके बाद C_5B के समान्तर एक रेखा AC को 2:3 में विभाजित करने वाले बिन्दु C_2 से खींचिए जो रेखाखण्ड AB को B_1 पर प्रतिच्छेद करे। इस प्रकार अभीष्ट अनुपात का रेखाखण्ड AB_1 व B_1B प्राप्त हुआ अर्थात् $AB_1 : B_1B = 2 : 3$ ।
इसी प्रकार अब आप विभिन्न माप के रेखाखण्डों को लेकर मन चाहे अनुपात में विभाजित कीजिए तथा अपने साथियों को भी ऐसे ही प्रश्नों को हल करने दीजिए।

किसी रेखा के समान भाग करने की एक और विधि :

Another method to divide a line into equal parts -


शैली को रेखाखण्डों को विभाजित करने में मज़ा तो आ रहा था परन्तु कभी-कभी उसे समान्तर रेखा खींचने में कुछ परेशानी हो रही थी। आइए एक और तरीका देखें जिससे समान दूरी पर समान्तर रेखाएँ भी बड़ी आसानी से खींची जा सकती हैं।

उदाहरण 3. AB रेखाखंड खींचकर उसको चार समान भागों में विभाजित करना।



चित्र 3.34


- रचना 1.** AB रेखाखंड खींच कर उसके दोनों सिरों पर विपरीत दिशा में समान न्यून कोण बनाइए।
यह ध्यान रहे कि दोनों न्यून कोण एक समान हों।



चित्र 3.35


- रचना 2.** परकार की सहायता से दोनों किरणों AL व BM पर 4-4 समान त्रिज्या के चाप काटिए।

- रचना 3.** अन्तिम बिन्दु K_4 व C_4 को क्रमशः B व A से मिलाइए



चित्र 3.36


रचना 4. फिर K_3 को C_1 से K_2 को C_2 से और K_1 को C_3 से मिलाइए
इस प्रकार AB पर व तीन बिन्दु D_1, D_2 एवं D_3 प्राप्त हुए यह बिन्दु रेखाखण्ड को चार समान भागों में विभाजित करता है।



चित्र 3.37

प्रश्नावली 3.2


- दी गई आकृति में $DE \parallel BC$, यदि $AD = 1.5$ सेमी, $DB = 3$ सेमी और $EC = 4$ सेमी हो, तो AE का मान ज्ञात कीजिए।



- 7.5 सेमी. का एक रेखाखण्ड AB खींचिए और इसे तीन समान भागों में विभाजित कीजिए प्रत्येक भाग की लम्बाई नापिए।
- 8.4 सेमी. का एक रेखाखण्ड खींचिए और इसे सात समान भागों में विभाजित कीजिए प्रत्येक भाग की लम्बाई नापिए।
- 10 सेमी. के एक रेखाखण्ड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए।
- 7 सेमी. का एक रेखाखण्ड AB खींचिए इस पर एक बिन्दु P इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि

$$AP = \frac{2}{5}AB \text{ हो।}$$

6. दी गई आकृति में $AD = 8$ सेमी, $BD = 4$ सेमी तथा $AE = 9$ सेमी., $EC = 4.5$ सेमी. हो, तो क्या $DE \parallel BC$ है? क्यों?



हमने सीखा (We Have Learnt)

1. दो समान्तर रेखाओं के बीच की लम्बवत् दूरी सदैव समान रहती है।
2. एक रेखा के समान्तर खींची गई सभी रेखाएँ आपस में समान्तर होती हैं।
3. एक रेखा के विभिन्न बिन्दुओं से लम्बवत् खींची गई सभी रेखाएँ परस्पर समान्तर होती हैं।
4. तीन समान्तर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा समान अन्तःखण्ड काटती है तो अन्य तिर्यक रेखा भी समान अन्तःखण्ड काटेगी।
5. तीन समान्तर रेखाओं पर दो तिर्यक रेखाओं के अन्तःखण्डों का अनुपात समान होता है।
6. त्रिभुज में एक भुजा के समान्तर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है।
7. त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समान्तर होती है।



अध्याय-4

बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग

MULTIPLICATION & DIVISION OF ALGEBRAIC EXPRESSIONS

बीजीय व्यंजकों के योग एवं घटाने की क्रिया से आप परिचित हैं। योग एवं घटाने की क्रिया में पूर्णांक क्रमशः जुड़ते या घटते हैं तथा बीजांक वही रहता है। इसी प्रकार कक्षा सातवीं में आपने पढ़ा है – किन्हीं दो बीजीय व्यंजकों का गुणा करने पर उनके स्थिरांक का स्थिरांक से तथा चराकों का चराकों के साथ गुणा होता है।

क्रियाकलाप 1. (Activity 1)

नीचे दी गई तालिका में दो बीजीय व्यंजक एवं उनका गुणनफल दिया गया है। कुछ स्थान रिक्त हैं। रिक्त स्थानों में मान लिखिए।

सारणी 4.1 (Table 4.1)

क्र.सं.	प्रथम व्यंजक	द्वितीय व्यंजक	प्रथम व्यंजक × द्वितीय व्यंजक	द्वितीय व्यंजक × प्रथम व्यंजक	गुणनफल
1	-3	a	$-3 \cdot a$	$a \cdot (-3)$	$-3a$
2	x	5	$x \cdot 5$	$5 \cdot x$	$5x$
3	2a	3a	$2a \cdot 3a$	$3a \cdot 2a$	$6a^2$
4	7x	-4y	-----	-----	-----
5	-5xy	2x	-----	-----	-----
6	4a ²	-----	-----	-----	$-12a^3b$
7	$-7a^2b^2$	8ab	-----	-----	-----

उपरोक्त तालिका में पदों का स्थान आपस में बदलने से प्राप्त गुणनफल समान रहता है। इससे गुणा सम्बन्धी किस नियम की पुष्टि होती है?

आइए कुछ और उदाहरण देखें

- (i) $3x \cdot 5x = (3 \cdot 5) x \cdot x = 15x^2$
- (ii) $(-4x) 6y = (-4 \times 6) x \cdot y = -24xy$
- (iii) $(-ab) 5b^2 = (-1 \times 5) ab \cdot b^2 = -5 a \cdot b \cdot b^2 = -5ab^3$

इस प्रकार आप देखते हैं कि जहाँ आधार समान होता है वहाँ चराकों के घात, घातांक नियम के अनुसार आपस में जुड़ जाते हैं।

बीजीय व्यंजकों को जोड़ते समय आपने देखा है कि गुणांक आपस में जुड़ जाते हैं।

जैसे, $x + x = (1 + 1)x = 2x$ (यहाँ x का गुणांक 1 है)

इस प्रकार, $2x, x$ को दो बार आपस में जोड़ने से प्राप्त होता है।

इसी प्रकार, $x + x + x = 3x$

$$x + x + x + x = 4x$$

इस प्रकार, x को जितनी बार जोड़ते हैं, x का गुणांक उतना ही रहता है।

$2x$ में 2 गुणांक है एवं x चरांक है।

$2x$ का मान x के विभिन्न मानों के लिए भिन्न-भिन्न होगा।


यदि $x = 3$ हो, तो $2x = 2 \cdot (3) = 6$

यदि $x = -5$ हो, तो $2x = 2 \cdot (-5) = -10$

और यदि $x = 0$ हो, तो $2x = 2 \cdot (0) = 0$

$$x = \frac{3}{8} \text{ हो, तो } 2x = 2 \cdot \frac{3}{8} = \frac{3}{4}$$

निम्नांकित तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।



ध्यान रहे कि $2x$ में 2 गुणांक एवं x चरांक है। अतः यदि $x = 5$ हो, तो $2x = 25$ नहीं होगा, बल्कि $2x = 2 \times 5 = 10$ होगा।

एक दिन शिक्षक कक्षा में नीरज से पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या है?

नीरज — मेरी उम्र 13 वर्ष है।

शिक्षक — 2 वर्ष बाद आपकी उम्र क्या होगी?

नीरज — 2 वर्ष बाद मेरी उम्र $13 + 2 = 15$ वर्ष होगी।

शिक्षक — जितेन्द्र आपकी उम्र कितनी है?

जितेन्द्र — मेरी उम्र लगभग 12 वर्ष है।

शिक्षक — 2 वर्ष बाद आपकी उम्र क्या होगी?

जितेन्द्र — 2 वर्ष बाद मेरी उम्र $12 + 2 = 14$ वर्ष होगी।

शिक्षक : यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष हो, तो 2 वर्ष पश्चात् उसकी आयु क्या होगी?

मनीषा ने उत्तर दिया कि 2 वर्ष बाद उसकी उम्र $(x + 2)$ वर्ष होगी।


यदि हम x का मान अलग-अलग रखें तो $(x + 2)$ का मान भी भिन्न-भिन्न होगा।

यदि $x = 3$ हो, तो $x + 2 = 3 + 2 = 5$ वर्ष

$x = 8$ हो, तो $x + 2 = 8 + 2 = 10$ वर्ष

$x = 5$ हो, तो $x + 2 = 5 + 2 = 7$ वर्ष

निम्नांकित तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।



इस प्रकार हम पाते हैं कि $2x$ जहाँ x के दुगुने को प्रदर्शित करता है वहाँ $(2+x)$, x से 2 अधिक को प्रदर्शित करता है

यदि $x = 0$, तो $2x = 2 \times 0 = 0$

यदि $x = 0$, तो $2+x = 2 + 0 = 2$

अतः $2x \neq 2+x$

एकपदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक के साथ गुणा

(Multiplying monomial expression with polynomial expression)

कक्षा सातवीं में हमने किसी एकपदीय बीजीय व्यंजक का किसी द्विपदीय बीजीय व्यंजक से गुणा करना सीखा है।

आइए, एक पदीय व्यंजक का, द्विपदीय व्यंजक के साथ गुणा हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से पुनः दोहरा लेते हैं।



क्रियाकलाप 2. (Activity - 2)

आगे दी गई तालिका में एक पदीय व्यंजक का द्विपदीय व्यंजक के साथ गुणनफल दिया है। कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं उनकी पूर्ति कीजिए।

सारणी 4.2

क्र.सं.	एक पदीय व्यंजक	द्विपदीय व्यंजक	एक पदीय $\times$ द्विपदीय व्यंजक	गुणनफल
1	x	$a + b$	$x(a + b)$	$ax + bx$
2	$-4y$	$3a + b$	-----	-----
3	xy	$7 + 8x$	$xy(7 + 8x)$	-----
4	$2t^2$	$3r^2 - 55$	-----	-----
5	$\frac{1}{2}m$	$m^3 + \frac{3}{2}n$	-----	-----
6	$4a$	$5x - \frac{1}{2}y$	-----	-----

इसी तरीके से हम किसी एक पदीय व्यंजक का गुणा किसी बहुपदीय व्यंजक से कर सकते हैं।

$$\text{अथवा } a(b + c + d) = ab + ac + ad$$

$$(b + c + d)a = ba + ca + da$$

$$\text{इसी प्रकार } a(b + c + d + e) = ab + ac + ad + ae$$

$$\text{या } (b + c + d + e)a = ba + ca + da + ea$$

$$\begin{aligned} \text{उदाहरण 1. } 2a(a + 2b + 5c) &= 2a \cdot a + 2a \cdot 2b + 2a \cdot 5c \\ &= 2a^2 + 4ab + 10ac \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{उदाहरण 2. } (2q + r + 3s - t)p &= 2q \cdot p + r \cdot p + 3s \cdot p - t \cdot p \\ &= 2pq + pr + 3ps - pt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{उदाहरण 3. } (xy + 2y^2z + x^2)yz^2 &= xy \cdot yz^2 + 2y^2z \cdot yz^2 + x^2 \cdot yz^2 \\ &= xy^2z^2 + 2y^3z^3 + x^2yz^2 \end{aligned}$$

 क्रियाकलाप 3.

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

सारणी 4.3

क्र.सं.	बीजीय व्यंजकों का गुणा	गुणन प्रक्रिया	गुणनफल
1.	$(2a + b + c) 5d$	$2a \times 5d + b \times 5d + c \times 5d$	$10ad + 5bd + 5cd$
2.	$7a^2(b + 2d - t)$		
3.	$\dots (x^2 + xy + z)$	$p \times x^2 + p \times xy + p \times z$	$p x^2 + \dots$
4.	$-5m(\dots + \dots + b)$		$-5m^2 - 10mn - 5mb$
5.	$7p^2m(m + n^3 + p)$		

आइए, अब हम दो द्विपदीय व्यंजकों को आपस में गुणा करने पर विचार करें—

दो द्विपदीय व्यंजकों का गुणा (Multiplication of two binomial expressions)

दो द्विपदीय व्यंजकों का आपस में गुणा दो एकपदीय व्यंजकों का द्विपदीय व्यंजकों से गुणा के योग के समान है।

$$\begin{aligned}(a + b) (c + d) &= a (c + d) + b(c + d) \\ &= (ac + ad) + (bc + bd) \\ &= ac + ad + bc + bd\end{aligned}$$

इसे हम निम्न प्रकार से भी हल कर सकते हैं:—

$$\begin{aligned}(a + b) (c + d) &= (a + b) c + (a + b) d \\ &= ac + bc + ad + bd\end{aligned}$$

इस प्रक्रिया में गुणा का योग पर वितरण के नियम का दो बार उपयोग होता है ।

उदाहरण 4. $(5x + 3y)$ एवं $(4x + 5y)$ को आपस में गुणा कीजिए।

हल: $(5x + 3y) (4x + 5y) = 5x (4x + 5y) + 3y (4x + 5y)$

$$\begin{aligned}[(a + b) (c+d) &= a (c+d) + b (c+d) \text{ के प्रयोग से}] \\ &= 5x \cdot 4x + 5x \cdot 5y + 3y \cdot 4x + 3y \cdot 5y \\ [a (b + c) &= ab + ac \text{ के प्रयोग से}] \\ &= 20x^2 + 25xy + 12yx + 15y^2 \\ &= 20x^2 + 37xy + 15y^2\end{aligned}$$

इसे निम्न प्रकार से भी हल किया जा सकता है—

$$\begin{aligned}(5x + 3y) (4x + 5y) &= (5x + 3y) \cdot 4x + (5x + 3y) \cdot 5y \\ [(a + b) (c+d) &= (a+b) c + (a+b) d \text{ के प्रयोग से}] \\ &= 5x \cdot 4x + 3y \cdot 4x + 5x \cdot 5y + 3y \cdot 5y \\ [(a + b) c &= ac + bc \text{ के प्रयोग से}] \\ &= 20x^2 + 12yx + 25xy + 15y^2 \\ &= 20x^2 + 37xy + 15y^2\end{aligned}$$

उदाहरण 5. $(3s^2 + 2t)$ एवं $(2r^2 + st)$ का गुणनफल ज्ञात कीजिए —

हल: $(3s^2 + 2t) (2r^2 + st) = 3s^2 \cdot (2r^2 + st) + 2t \cdot (2r^2 + st)$

$$\begin{aligned}[(a + b) (c + d) &= a (c+d) + b (c+d) \text{ के प्रयोग से}] \\ &= 3s^2 \cdot 2r^2 + 3s^2 \cdot st + 2t \cdot 2r^2 + 2t \cdot st \\ [a (b + c) &= ab + ac \text{ के प्रयोग से}] \\ &= 6s^2r^2 + 3s^3t + 4tr^2 + 2st^2\end{aligned}$$

उदाहरण 6. $(5x + 3y)$ और $(x + y)$ का आपस में गुणा कीजिए एवं $x = 3, y = -2$ के लिए गुणनफल की जाँच कीजिए।

हल: $(5x + 3y)(x + y) = 5x(x + y) + 3y(x + y)$
 $= 5x \cdot x + 5x \cdot y + 3y \cdot x + 3y \cdot y$
 $= 5x^2 + 5xy + 3xy + 3y^2$
 $(5x + 3y)(x + y) = 5x^2 + 8xy + 3y^2$

जाँच: बायाँ पक्ष $= (5x + 3y)(x + y)$
 $[x = 3, y = -2 \text{ रखने पर}]$
 $= [5(3) + 3(-2)](3 - 2)$
 $= [15 - 6](1)$
 $= 9 \times 1 = 9$

दायाँ पक्ष $= 5x^2 + 8xy + 3y^2$
 $= 5(3)^2 + 8(3)(-2) + 3(-2)^2$
 $= 5(9) - 48 + 3(4)$
 $= 45 + 12 - 48$
 $= 57 - 48 = 9$

बायाँ पक्ष $=$ दायाँ पक्ष

क्रियाकलाप 4.

गुणा की प्रक्रिया के अनुसार सारणी में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –
सारणी 4.4

दो बीजीय व्यंजकों का गुणा	गुणा की प्रक्रिया		प्राप्त गुणनफल
	वितरण नियम के प्रयोग से	वितरण नियम के पुनः प्रयोग से	
1. $(a + b)(c + d)$	$a(c + d) + b(c + d)$ या $(a+b)c + (a+b)d$	$ac + ad + bc + bd$ या $ac + bc + ad + bd$	$ac + ad + bc + bd$ $ac + bc + ad + bd$
(a) $(4x + 5y)(2x + 3y)$	$4x(2x + 3y) + 5y(2x + 3y)$	$4x \times 2x + 4x \times 3y + 5y \times 2x + 5y \times 3y$	$8x^2 + 22xy + 15y^2$
(b) $(5x^2 + 2s)(2t + 5)$			
(c) $(2r^2 + 5s^3)(r^2 + t^3)$			
2. $(a + b)(c - d)$	$a(c - d) + b(c - d)$	$ac - ad + bc - bd$	$ac - ad + bc - bd$
(a) $(b + 2c)(3b - c)$			
(b) $(5x + 3y)(2y^2 - z)$			
3. $(a - b)(c + d)$	$a(c + d) - b(c + d)$	$ac + ad - bc - bd$	$ac + ad - bc - bd$
(a) $(2x - 3y)(3x + z)$			
(b) $(5p - 2q)(3x + 4s)$			
4. $(a - b)(c - d)$	$a(c - d) - b(c - d)$	$ac - ad - bc + bd$	$ac - ad - bc + bd$
(a) $(2s - 3p)(4x - 5t)$			
(b) $(x^2 + xy)(y^2 - z)(y^2 - z)$			

प्रश्नावली 4.1 (Exercise 4.1)

प्र.1 निम्न पदों का आपस में गुणनफल ज्ञात कीजिए।

(i) $(2x + 7)(3x + 2)$

(ii) $(3x - 5)(2x + 9)$

(iii) $(7x - 6)(15x - 2)$

(iv) $\left(\frac{1}{2}x + 5y\right)\left(3x - \frac{6}{5}y\right)$

(v) $(x + 5y)(7x - y)$

प्र.2 मान ज्ञात कीजिए –

(i) $(x + y)(2y + 3x) + (3x + y)(y + 2x)$ (ii) $\left(2x - \frac{1}{2}\right)\left(\frac{3x}{2} - \frac{1}{4}\right)$

(iii) $(x^2 + y^2)(3x - 5y)$

(iv) $(a + b)(a + b)$

प्र.3 $(x + y)$ और $(3y + 4x)$ का आपस में गुणा कीजिए एवं नीचे दिए मानों के लिए सत्यापन कीजिए –

(i) $x = 2, y = -1$

(ii) $x = 1, y = 0$

बीजीय व्यंजकों के भाग (Division of Algebraic Expressions)

आप किसी एक पूर्णांक से किसी दूसरे पूर्णांक का गुणा व भाग करना जानते हैं। आइए, कुछ उदाहरण देखें –

1. $6 \times 8 = 48$ तो $48 \div 8 = 6$ तथा $48 \div 6 = 8$

2. $-15 \times 3 = -45$ तो $-45 \div -15 = 3$ तथा $-45 \div 3 = -15$

3. $m \times n = mn$ तो $mn \div m = n$ तथा $mn \div n = m$

एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से भाग

(Division of a monomial expression by another monomial expression)

आइए, प्रारम्भ में हम एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से भाग देना जाने।

उदाहरण 7. $18x^2y$ में $6xy$ का भाग दीजिए।

हल : यहाँ $18x^2y \div 6xy = \frac{18x^2y}{6xy}$

$$= \frac{18}{6} \times \frac{x^2}{x} \times \frac{y}{y} = 3 \times \frac{x \times \cancel{x}}{\cancel{x}} \times \frac{\cancel{y}}{\cancel{y}} = 3x$$

उदाहरण 8. $-35mn^2p$ में $7np$ का भाग दीजिए।

हल : $-35mn^2p \div 7np = \frac{-35mn^2p}{7np}$

$$= \frac{-35}{7} \times \frac{m}{1} \times \frac{n^2}{n} \times \frac{p}{p} = -5 \times m \times \frac{n \times \cancel{n}}{\cancel{n}} \times \frac{\cancel{p}}{\cancel{p}} = -5mn$$

इस प्रकार आपने देखा कि भाग की क्रिया हम निम्न पदों में करते हैं –

1. यदि भाज्य और भाजक के चिह्न समान हों, तो भागफल के चिह्न धनात्मक होता है।
2. यदि भाज्य और भाजक के चिह्न असमान हों, तो भागफल का चिह्न ऋणात्मक होता है।
3. भाज्य के गुणांक में भाजक के गुणांक का भाग देते हैं।
4. भागफल में किसी चरांक का घात ज्ञात करने के लिए घातांक नियम $a^m \div a^n = a^{m-n}$ का उपयोग करते हैं। आइए, निम्न उदाहरण द्वारा समझें :-

उदाहरण 9. $-25a^3b^2c$ में $-5ab^2c$ का भाग दीजिए।

$$\begin{aligned}
 \text{हल : यहाँ } -25a^3b^2c \div -5ab^2c &= \frac{-25a^3b^2c}{-5ab^2c} \\
 &= \frac{-25}{-5} \times \frac{a^3}{a} \times \frac{b^2}{b^2} \times \frac{c}{c} \\
 &= 5 \times a^{3-1} \times b^{2-2} \times c^{1-1} [\because a^m \div a^n = a^{m-n}] \\
 &= 5a^2b^0c^0 = 5a^2 \{ \text{चूँकि } b^0 = 1, c^0 = 1 \}
 \end{aligned}$$

क्रियाकलाप 5.

निम्न सारणी में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

सारणी 4.5

क्र.सं.	पहली संख्या $\times$ दूसरी संख्या	दोनों संख्याओं के गुणनफल का मान	भाग संक्रिया के रूप में दर्शाना	
			पहली विधि	दूसरी विधि
1.	$3x \times 4y$	$12xy$	$12xy \div 3x = 4y$	$12xy \div 4y = 3x$
2.	$2x \times (-7x)$	$-14x^2$	-----	-----
3.	$m \times 4n$	$4mn$	-----	-----
4.	$18a^2 \times 2b^2$	-----	-----	-----
5.	$13p^2 \times 7pq$	$91p^3q$	-----	-----

इस प्रकार, हम देखते हैं कि $3x$ एवं $4y$ का गुणा करने पर $12xy$ प्राप्त होता है तथा $12xy$ में $3x$ का भाग देने पर $4y$ तथा $12xy$ में $4y$ का भाग देने पर $3x$ प्राप्त होता है। अतः गुणा एवं भाग एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं हैं।

बहुपदीय व्यंजकों का एकपदीय व्यंजक से विभाजन (Division of a polynomial expression by a monomial expression)

आपने एकपदीय का एकपदीय व्यंजक से विभाजन तो जान लिया। आइए, अब निम्न उदाहरणों में बहुपदीय व्यंजकों का एकपदीय व्यंजकों से विभाजन देखें –

उदाहरण 10. $16m^2 + 4mn - 12mn^2$ को $2m$ से भाग दीजिए।

$$\begin{aligned}\text{हल : } (16m^2 + 4mn - 12mn^2) \div 2m &= \frac{16m^2 + 4mn - 12mn^2}{2m} \\ &= \frac{16m^2}{2m} + \frac{4mn}{2m} - \frac{12mn^2}{2m} \\ &= 8m^{2-1} + 2m^{1-1}n - 6m^{1-1}n^2 \\ &= 8m + 2n - 6n^2\end{aligned}$$

यहाँ बहुपदीय व्यंजक को अलग-अलग एकपदीय व्यंजक में बदलकर भाग की क्रिया की गई है।

प्रश्नावली 4.2

प्र.1. मान ज्ञात कीजिए –

- | | |
|--|------------------------------------|
| (i) $(18x^2y^2) \div (-6xy)$ | (ii) $(-15x^3y^2z) \div (-5x^2yz)$ |
| (iii) $(-x^5y^7) \div -x^4y^5$ | (iv) $(32a^4b^2c) \div (-8abc)$ |
| (v) $(28a^4b^6c^8) \div (-7a^2b^4c^6)$ | |

प्र.2. भाग दीजिए।

- | |
|--|
| (i) $2x^4 - 6x^3 + 4x^2$ को $2x^2$ से |
| (ii) $5a^4b^3 - 10a^3b^2 - 15a^2b^2$ में $-5a^2b^2$ का |
| (iii) $27a^4 - 36a^2$ को $-9a$ से |
| (iv) $x^4 + 2x^3 - 2x^2$ को $4x^2$ से |
| (v) $a^2 + ab + ac$ को a से |



बहुपदीय में द्विपदीय का भाग (Division of a polynomial by binomial)

आप किसी एक पदीय या बहुपदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक का भाग देना जान चुके हैं। आइए, निम्न उदाहरण को देखें –

उदाहरण 11. $18a^2 + 12a + 27a^3 + 8$ में $3a + 2$ का भाग दीजिए।

हल : सर्वप्रथम दिये गये बहुपदीय व्यंजक $18a^2 + 12a + 27a^3 + 8$ को घात के घटते हुए क्रम में लिख लेते हैं।

जैसे, $27a^3 + 18a^2 + 12a + 8$

चरण 1. यहाँ भाज्य का पहला पद $27a^3$ है। इसमें भाजक के पहले पद $3a$ का भाग देते हैं –

$$\frac{27a^3}{3a} = 9a^2$$

और $9a^2$ को भागफल में लिख लेते हैं।

चरण 2. अब $9a^2$ को पूरे भाजक से गुणा करते हैं।

$$\text{अतः } 9a^2(3a + 2) = 27a^3 + 18a^2$$

यहाँ $27a^3 + 18a^2$ को भाज्य में सजातीय पदों के नीचे लिखते हैं और घटा देते हैं।

अर्थात् नीचे वाले पद के चिह्न बदल देते हैं।

चरण 3. घटाने के बाद शेष बची संख्या को नीचे लिख लेते हैं।

$$\begin{array}{r} 3a + 2 \overline{) 27a^3 + 18a^2 + 12a + 8} \\ \underline{9a^2} \\ 27a^3 + 18a^2 + 12a + 8 \\ \underline{\pm 27a^3 \pm 18a^2} \\ +12a + 8 \end{array}$$

चरण 4. अब शेष भाज्य के पहले पद $12a$ में भाजक के पहले पद $3a$ का भाग देते हैं।

$$12a \div 3a = 4$$

$+4$ को भागफल में लिखते हैं तथा $+4$ का पुनः पूरे भाजक में गुणा करते हैं।

$$\text{अतः } 4(3a + 2) = 12a + 8$$

चरण 5. भाज्य में सजातीय पदों के नीचे $12a + 8$ को लिख लेते हैं एवं घटा देते हैं।

$$\begin{array}{r} 3a + 2 \overline{) 27a^3 + 18a^2 + 12a + 8} \\ \underline{9a^2} \\ 27a^3 + 18a^2 + 12a + 8 \\ \underline{\pm 27a^3 \pm 18a^2} \\ +12a + 8 \\ \underline{\pm 12a \pm 8} \\ 0 \end{array}$$

चरण 6. यहाँ घटाने पर शेषफल शून्य बचता है।

$$\begin{array}{r} 3a + 2 \overline{) 27a^3 + 18a^2 + 12a + 8} \\ \underline{9a^2 + 4} \\ 27a^3 + 18a^2 + 12a + 8 \\ \underline{\pm 27a^3 \pm 18a^2} \\ 0 + 0 + 12a + 8 \\ \underline{\pm 12a \pm 8} \\ 0 \quad 0 \end{array}$$

चरण 7. $\therefore$ अभीष्ट भागफल $= 9a^2 + 4$ है।

आप जानते हैं कि जब किसी एक संख्या में किसी दूसरी संख्या का पूरा-पूरा भाग जाता है और शेषफल शून्य बचता है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखण्ड कहलाती है।

यहाँ $27a^3 + 18a^2 + 12a + 8$ में $(3a + 2)$ का पूरा-पूरा भाग देने से शेषफल शून्य बचता है अतः $(3a+2)$, $27a^3 + 18a^2 + 12a + 8$ का एक गुणनखण्ड होगा।

आइए, एक और उदाहरण देखते हैं –

उदाहरण 12. $-12x^3 - 8x^2 - 5x + 10$ को $(2x - 3)$ से विभाजित कीजिए।

हल :

$$\begin{array}{r}
 (2x - 3) \overline{) -12x^3 - 8x^2 - 5x + 10} \\
 \underline{-(6x^2 - 13x - 22)} \\
 -26x^2 - 5x + 10 \\
 \underline{-(13x^2 + 39x)} \\
 -44x + 10 \\
 \underline{-(22x + 66)} \\
 -56
 \end{array}$$

यहाँ भी पूर्व की भाँति भाग दिया गया है। परन्तु शेषफल -56 है, शून्य नहीं।

अतः हम कह सकते हैं कि $(2x - 3)$ व्यंजक $-12x^3 - 8x^2 - 5x + 10$ का एक गुणनखण्ड नहीं है।

उदाहरण 13. $8q^3 + 2q - 8q^2 - 1$ में $4q + 2$ का भाग दीजिए।

हल : यहाँ q के घात घटते क्रम में नहीं हैं, अतः पहले व्यंजक को घटते क्रम में लिखने पर $8q^3 - 8q^2 + 2q - 1$

$$\begin{array}{r}
 \overline{) 8q^3 - 8q^2 + 2q - 1} \\
 \underline{-(2q^2 - 3q + 2)} \\
 4q + 2 \overline{) 8q^3 - 8q^2 + 2q - 1} \\
 \underline{-(4q^3 + 8q^2)} \\
 -12q^2 + 2q - 1 \\
 \underline{-(6q^2 + 6q)} \\
 +8q - 1 \\
 \underline{-(4q + 8)} \\
 -5
 \end{array}$$

यहाँ भी भाग के चरण पूर्व में बताए अनुसार पूर्ण किए गए हैं। भाग की क्रिया तब तक करते हैं। जब तक शेषफल में बीजीय चरांक का घात भाजक के बीजीय चरांक के घात से कम न हो जाए।

जांच : भाज्य = भाजक × भागफल + शेषफल

(Verification : Dividend = Divisor x Quotient + Remainder)

इस प्रश्न में,

$$\text{भाज्य} = 8q^3 - 8q^2 + 2q - 1$$

$$\text{भाजक} = 4q + 2$$

$$\text{भागफल} = 2q^2 - 3q + 2$$

$$\text{शेषफल} = -5$$

$$\text{दायाँ पक्ष} = \text{भाजक} \times \text{भागफल} + \text{शेषफल}$$

$$= (4q + 2) \cdot (2q^2 - 3q + 2) + (-5)$$

$$= 4q(2q^2 - 3q + 2) + 2(2q^2 - 3q + 2) - 5$$

$$= 8q^3 - 12q^2 + 8q + 4q^2 - 6q + 4 - 5$$

$$= 8q^3 - 12q^2 + 4q^2 + 8q - 6q - 1$$

$$= 8q^3 - 8q^2 + 2q - 1$$

$$= \text{बायाँ पक्ष}$$

$$\text{अर्थात्} \quad \boxed{\text{भाज्य} = \text{भाजक} \times \text{भागफल} + \text{शेषफल}}$$

$$\text{Dividend} = \text{Divisor} \times \text{Divison} + \text{Remainder}$$

अतः प्राप्त भागफल = $2q^2 - 3q + 2$ और शेषफल = -5 सही है।

प्रश्नावली 4.3

प्र.1. निम्नलिखित बहुपद को चर राशि के घातांक के घटते क्रम में लिखिए –

(i) $15x^2 - 3x + 8x^4 - 4x^3 - 15$

(ii) $12m^5 - 9m^3 + 16 - 6m^2 + 8m$

(iii) $9m^4 - 16m^2 - 4m + 16 - m^3$

(iv) $4 - 8y^3 + 12y^4 - 6y^2$

प्र.2. भागफल ज्ञात कीजिए एवं बताइये कि क्या भाजक, भाज्य का एक गुणनखण्ड है ?

(i) $x^2 - 11x + 30$ को $(x - 5)$ से

(ii) $x^2 + 20x + 91$ में $(x + 7)$ का

(iii) $x^2 - 5x - 6$ में $(x - 6)$ का

(iv) $x^3 - 5x^2 - 2x + 24$ को $(x - 4)$ से

(v) $a^2 + 2ab + b^2$ में $(a + b)$ का

प्र.3 भागफल ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि भाजक भाज्य का गुणनखण्ड नहीं है ?
भागफल एवं शेषफल लिखिए –

- (i) $x^3 + 2x^2 + 3x + 4$ को $x - 1$ से
- (ii) $-12 + 3x^2 - 4x + x^3$ को $x + 5$ से
- (iii) $4x^4 - 2x^3 - 10x^2 + 13x - 6$ को $2x + 3$ से
- (iv) $8x^3 - 6x^2 + 10x + 15$ को $4x + 1$ से

प्र.4. भाग देकर जांच कीजिए कि क्या –

$$\text{भाज्य} = \text{भाजक} \times \text{भागफल} + \text{शेषफल}$$

- (i) $m^2 - 3m + 7$ को $m - 2$ से
- (ii) $a^3 - 2a^2 + a + 2$ को $a + 2$ से
- (iii) $9x^3 + 15x^2 - 5x + 3$ को $3x + 1$ से
- (iv) $2x^3 + 3x^2 + 7x + 15$ को $x^2 + 4$ से



हमने सीखा (We Have Learnt)

1. दो एक पदीय व्यंजकों का गुणा करने के लिए पहले उनके गुणांकों का उसके बाद चरांकों का गुणा करते हैं।
2. एक पदीय व्यंजक का द्विपदीय व्यंजकों से गुणा करने के लिए एक पदीय व्यंजक को, द्विपदीय व्यंजक के प्रत्येक पद से गुणा करते हैं तथा प्राप्त गुणनफलों को जोड़ देते हैं। इस प्रकार वितरण नियम का प्रयोग करते हैं।
3. चरांकों का गुणा करते समय घातांक नियम का उपयोग करते हैं।
4. दो द्विपदीय व्यंजकों का आपस में गुणा करने के लिए दो बार वितरण नियम का प्रयोग करते हैं। जैसे—

$$(a+b)(c+d) = a(c+d) + b(c+d)$$

$$= ac + ad + bc + bd$$
5. गुणा करते समय यदि बीजीय व्यंजकों के चिह्न समान हो तो व्यंजक के चिह्न धनात्मक होता है एवं असमान चिह्न होने पर ऋणात्मक हो जाता है।
6. भागफल की क्रिया तब तक करते हैं जब तक शेषफल में बीजीय चरांक की घात, भाजक के घात से कम न हो जाये।
7. बहुपदीय व्यंजक में, एक पदीय व्यंजक का भाग देते समय प्रत्येक पद में, एकपदीय व्यंजक का भाग देते हैं।

अध्याय 5

वृत्त एवं उसके अवयव CIRCLE AND ITS COMPONENTS




अनु ने कक्षा छठवीं में वृत्त के पाठ में पढ़ा था कि वृत्त के प्रत्येक बिन्दु की केन्द्र से दूरी समान होती है, यह दूरी त्रिज्या कहलाती है। उसको विभिन्न मापों का वृत्त बनाना भी आता है, चूड़ी से वृत्ताकार आकृति बनाना और नये नये डिजाइन बनाना तो उसका प्रिय खेल हैं।

एक दिन उसकी एक चूड़ी टूट गयी उसने चूड़ी के टुकड़ों को निश्चित स्थान में रखकर फिर से चूड़ी बना ली और पेंसिल की सहायता से एक वृत्ताकार आकृति भी बना ली। अनु सोच रही थी कि जिस प्रकार चूड़ी के कई टुकड़े हो सकते हैं वैसे ही क्या वृत्त के भी कई टुकड़े हो सकते हैं?

आप क्या सोचते हैं? आप शायद सोच रहे होंगे कि जब चूड़ी के टुकड़े हो सकते हैं, तो वृत्त के क्यों नहीं?

आइये, इन प्रश्नों का उत्तर ढूँढें—

कक्षा छठी में आपने पढ़ा है कि वृत्त के किन्हीं दो बिन्दुओं को मिलाने वाली सरल रेखा, जो वृत्त के केन्द्र से होकर गुजरती है, व्यास कहलाती है।




क्रियाकलाप 1. (Activity 1)

कागज पर किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए तथा वृत्त के केन्द्र को चिन्हांकित कीजिए। वृत्त में एक व्यास खींचिए। व्यास के सापेक्ष वृत्त को काट लीजिए। क्या कटे हुए दोनों भाग समान हैं? क्या किसी भी वृत्त को व्यास के सापेक्ष काटने पर वह दो समान भागों में विभाजित होगा?


क्या इस प्रकार दो समान भागों में बँटे वृत्तों को अर्द्धवृत्त कह सकते हैं?

क्रियाकलाप 2. (Activity 2)

नीचे दिए गए वृत्तों पर कुछ बिन्दुएँ अंकित हैं। इन्हें मिलाने पर कौनसा रेखाखंड वृत्त को दो अर्द्ध वृत्तों में बाँटेगा तथा क्यों?



5.1 (i)




O 5.1 (ii)

चित्र 5.1 (i) में AB व्यास हैं एवं AC, AD, DC, BD और BC जीवाएँ हैं। प्रत्येक जीवा वृत्त

को दो वृत्तखण्डों में बाँटती है, इन वृत्त की परिधि के भाग को चाप कहते हैं। चित्र 5.1 (ii) में ON, NM, ML, PO इत्यादि चाप हैं।

चित्र (iii) में यदि चाप XY कहा जाए तो यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह कौनसा चाप है। गहरा वाला या हल्का वाला। अतः हम चापों का निर्धारण तीन बिन्दुओं से करते हैं जैसे चाप XLY या $\widehat{XLY}$ तथा इसी प्रकार चाप




5.1 (iii)


XMY या $\widehat{XMY}$, चाप $\widehat{XLY}$ की माप अर्द्धवृत्त से छोटी है, इसलिए इसे लघुचाप कहते हैं। उसी प्रकार $\widehat{XMY}$ की माप अर्द्धवृत्त से बड़ी है इसलिए इसे दीर्घचाप कहते हैं।

क्रियाकलाप 3.


नीचे दिये गये चित्रों में लघु चाप एवं दीर्घ चाप को पहचानिए—



5.2 (i)



5.2 (ii)



5.2 (iii) P


क्या सिर्फ देखकर यह बताया जा सकता है कि कोई चाप दीर्घ चाप है या लघु चाप?

पंकज सोच रहा था कि चित्र 5.2(i) में तो स्पष्ट दिख रहा है कि $\widehat{AXB}$ लघुचाप तथा $\widehat{AYB}$ दीर्घचाप है और इसी प्रकार चित्र 5.2 (ii) में $\widehat{PRQ}$ लघुचाप तथा $\widehat{PSQ}$ दीर्घचाप है। परंतु 5.2 (iii) में तो यह बताना मुश्किल है कि $\widehat{XPY}$ और $\widehat{XQY}$ में कौन सा दीर्घचाप है और कौन सा लघुचाप।

तभी राकेश ने चित्र 5.2 (i) में बिन्दु A और B को वृत्त के केन्द्र बिन्दु O से मिला दिया और यह देखा कि $\angle AOB$ जो कि $\widehat{AXB}$ की ओर बन रहा है यह $\widehat{AYB}$ की ओर बने $\angle AOB$ से छोटा है। आप भी चित्र 5.2 (ii) में बिन्दु P और बिन्दु Q को केन्द्र से मिलाइए और केन्द्र पर बने कोणों को नापकर बताइये कि कौन सा चाप, बड़ा और कौन सा चाप छोटा है ?

अनु ने चित्र 5.2 (iii) में बिंदु X और Y को केन्द्र से जोड़ा और पाया कि XPY और XQY दोनों ओर बने कोण समान हैं, अतः दोनों चाप समान हैं। XOY एक सरल रेखा है अतः $\angle XOY = 180^\circ$ । इसलिए राकेश ने कहा जिस चाप की तरफ केन्द्र पर बना कोण 180° से कम है, वह चाप लघु चाप और जिस चाप की ओर केन्द्र पर बना कोण 180° से अधिक है, वह चाप दीर्घ चाप कहलाएगा।


अब तो आप चापों को पहचानने लगे हैं, आइए इन्हीं से संबंधित कुछ गतिविधियाँ भी करते हैं—



नीचे एक वृत्त दिया गया है (चित्र 5.3) इस वृत्त में कितने चाप बना सकते हैं? सुरेश सोच रहा था कि एक वृत्त के तो अनगिनत बिन्दु हैं और किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच का भाग चाप है। तब तो किसी वृत्त में भी अनगिनत चाप हो सकते हैं। सुरेश ने ठीक ही सोचा, एक वृत्त में अनगिनत चाप हो सकते हैं तथा जिस प्रकार अनगिनत बिन्दु हैं उसी प्रकार इनमें से किन्हीं दो बिन्दुओं को मिलाकर अनगिनत जीवाएँ बन सकती हैं।

रमेश ने एक वृत्त बनाकर उसमें चित्रानुसार (चित्र 5.4) बिन्दुओं को अंकित किया और उनमें से दो बिन्दुओं A व C को मिलाकर जीवा AC प्राप्त की।

इसे देख कर सुरेश ने कहा कि जीवा AC वृत्त के दो वृत्त खण्डों (चापों) में विभाजित करती है। एक लघुचाप AC और दूसरा दीर्घ चाप AC। लघु चाप AC को तो $\widehat{ABC}$ लिखते हैं क्योंकि इस चाप में बिन्दु B सम्मिलित है, परन्तु दीर्घ चाप AC में बहुत सारे बिन्दुएँ इसे कैसे लिखा जाए? आइये सोचते हैं।




आप भी सोचिए ?

दीर्घ चाप AC को उस वृत्त खण्ड में आए सभी बिन्दुओं को लेकर AHGFEDC लिखना होगा। इस चाप को भी लघु चाप AC ($\widehat{ABC}$) की तरह $\widehat{AHC}$ या $\widehat{AGC}$ या या $\widehat{ADC}$ लिख सकते हैं जो कि उस दीर्घ वृत्त खंड को दर्शाते हैं।


चाप (वृत्तखण्ड) द्वारा वृत्त पर बनाया गया कोण – (Angle made by the arc on the circle)

चित्र (5.5) में एक $\triangle ABC$ दिया गया है जिसके सभी शीर्ष A, B व C वृत्त पर स्थित हैं। यहाँ $\widehat{BXC}$ द्वारा वृत्त के बिन्दु X पर $\angle BAC$ बनाया गया है। क्या आप $\widehat{CYA}$ और $\widehat{AZB}$ द्वारा वृत्त पर बने कोणों को पहचान सकते हैं? कोणों को पहचान कर लिखिए।



क्रियाकलाप 4.

नीचे दिए गए चतुर्भुज ABCD के चारों शीर्ष A, B, C व D वृत्त पर स्थित हैं। इस वृत्त में किस चाप द्वारा वृत्त पर कौन सा कोण अंतरित किया जा रहा है, पहचान कर लिखिए—




क्र.	बिन्दु जिनके बीच चाप बना है	लघुचाप का नाम	लघुचाप द्वारा वृत्त पर बना कोण	दीर्घ चाप का नाम	दीर्घ चाप द्वारा वृत्त पर बना कोण
1.	A एवं B	APB	कोई कोण नहीं	ADB या ACB	कोई कोण नहीं
2.	A एवं C				
3.					
4.					
5.					
6.					

प्रश्नावली 5.1 (Exercise 5.1)

1. संलग्न चित्र से संबंधित निम्न प्रश्नों का उत्तर ढूँढिए—

- $\widehat{ABC}$ या $\widehat{ACB}$ किस चाप द्वारा बना है?
- $\widehat{BCD}$ या $\widehat{CDB}$ किस चाप द्वारा बना है?
- लघु चाप $\widehat{AB}$ द्वारा अंतरित कोणों के नाम लिखिए।
- $\angle ACB$ किस चाप द्वारा बना है?
- $\angle CBA$ किस चाप द्वारा बना है?
- $\angle CBD$ और $\angle CAD$ किस चाप द्वारा बने हैं।
- चापों द्वारा बिन्दु D पर बने कोणों के नाम लिखिए।






वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त पर बनने वाले सभी कोणों को आपने पहचान लिया है, आइए इन कोणों के बीच संबंध ढूँढ़ें।

वृत्तखण्ड के कोणों के गुण (Qualities of an arc)



क्रियाकलाप 5.

दिए गए प्रत्येक चित्र में एक चाप द्वारा वृत्त पर कई कोण बनाए गए हैं। उन कोणों को माप कर सारणी को पूरा कीजिए।




क्र.सं.	चित्र क्र.	चाप का नाम	चाप द्वारा वृत्त पर बने कोणों के नाम एवं उनका माप		
			1	2	3
1.					
2.					
3.					

उपरोक्त क्रियाकलापों को करते हुए शैली ने देखा कि किसी भी चाप द्वारा उसके सम्मुख वृत्तखण्ड पर जितने भी कोण बनाए जाते हैं वे सभी एक ही माप के हैं अर्थात् किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखण्ड में बने कोण बराबर होते हैं।


आप भी ऐसे ही कई वृत्त लेकर उनमें चाप खींचिए तथा उन चापों द्वारा सम्मुख वृत्तखण्डों पर कई कोण बनाइए और अपने साथियों से नपवाकर देखिए कि क्या एक ही चाप से बने सभी कोण समान हैं

प्रश्नावली 5.2


निम्न चित्रों में अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा दर्शाए गए कोणों के माप चाँदा से बिना मापे ज्ञात कीजिए—




(i)




(ii)



(iii)



(iv)



(v)

A =

x =

p =

m =

u =

y =

n =


v =

क्रियाकलाप 6.

O केन्द्र वाले वृत्त में व्यास AOB खींचिए। व्यास के ऊपर वाले अर्धवृत्त पर बिन्दु C, D, E लीजिए। तथा $\angle ACB$, $\angle ADB$, $\angle AEB$ बनाइए। चाँदे की सहायता से इन कोणों को मापिए और उनका मान लिखिए—

$\angle ACB = \dots\dots\dots$, $\angle ADB = \dots\dots\dots$, $\angle AEB = \dots\dots\dots$

इन कोणों के माप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? चित्र 5.8




अवलोकन पश्चात आप पायेंगे कि सभी कोण समकोण हैं अर्थात् अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है।


वृत्त पर स्थित दो बिन्दुओं द्वारा लघु वृत्तखण्ड एवं संगत दीर्घ वृत्तखण्ड के कोण—

क्रियाकलाप 7.


केन्द्र O लेकर, एक वृत्त बनाइए। वृत्त पर दो बिन्दु A और C लीजिए जिससे यह एक लघु वृत्तखण्ड ABC तथा एक दीर्घवृत्त खण्ड ADC में बँट जाए।



5.9 (i)



5.9 (ii)



5.9 (iii)

लघुवृत्तखण्ड का कोण $\angle ABC$ है तथा संगत दीर्घवृत्त खण्ड का कोण $\angle ADC$ है। इन्हें मापकर निम्न सारणी पूर्ण कीजिए।

क्र.सं.	लघुवृत्तखण्ड का कोण x°	संगत दीर्घ-वृत्तखण्ड का कोण y°	$x^\circ + y^\circ$
1.	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----


सारणी पूर्ण करने के पश्चात आप पायेंगे कि जीवा के दोनों ओर के वृत्तखण्डों में बने कोणों का योगफल 180° होता है।

प्रश्नावली 5.3

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

- लघु वृत्तखण्ड का कोण ----- है। (न्यून कोण / अधिक कोण)
- दीर्घ-वृत्तखण्ड का कोण ----- है। (न्यून कोण / अधिक कोण)
- एक ही वृत्त में लघुवृत्तखण्ड एवं संगत दीर्घ वृत्तखण्ड में बने कोणों का योग ----- होता है। (180° / 270° / 360°)

उदाहरण 1. नीचे दिए गये आकृति में वृत्त का केन्द्र O है यदि $\angle C = 55^\circ$ है तो $\angle BAC$ का मान ज्ञात कीजिए—




5.10

हल: AC व्यास है। (वह केन्द्र O से गुजरता है।) अतः $\angle ABC$ अर्द्धवृत्त का कोण है। जो कि समकोण होता है। अर्थात् $\angle B$ या $\angle ABC = 90^\circ$

अतः $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$ ($\because$ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180° होता है।)

$$\begin{aligned}
 &= \angle A + 90^\circ + 55^\circ = 180^\circ \\
 &= \angle A + 145^\circ = 180^\circ \\
 &= \angle A = 180^\circ - 145^\circ \\
 &= \angle A = 35^\circ \quad \text{उत्तर}
 \end{aligned}$$

उदाहरण 2. दिये गये चित्र में $\angle AEB = 115^\circ$ तो $\angle ACB$ तथा $\angle ADB$ ज्ञात कीजिए।



हल: दिया है – $\angle AEB = 115^\circ$

ज्ञात करना है – $\angle ACB$ तथा $\angle ADB$

चूँकि जीवा के दोनों ओर के वृत्तखण्डों में बने कोणों का योग 180° होता है। अतः

$$\angle AEB + \angle ACB = 180^\circ$$

$$115^\circ + \angle ACB = 180^\circ$$


$$\angle ACB = 180^\circ - 115^\circ$$

$$\angle ACB = 65^\circ$$


हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखण्ड पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं अतः $\angle ACB = \angle ADB = 65^\circ$

प्रश्नावली 5.4


प्रश्न 1 सामने दिए चित्र में O वृत्त का केन्द्र है। $\angle PRQ$ तथा $\angle QPR$ के माप ज्ञात कीजिए।




प्रश्न 2 सामने के चित्र में वृत्तखण्ड PQXY में बने $\angle YPQ = 70^\circ$ तथा $\angle YQP = 30^\circ$ हैं। $\angle PYQ$ तथा $\angle PXQ$ के माप ज्ञात कीजिए।




प्रश्न 3 दिए गए चित्र में $PQ = PR$ है
तथा O वृत्त का केन्द्र है तो त्रिभुज
 PQR के तीनों कोण ज्ञात कीजिए।



प्रश्न 4 सामने चित्र में $AB=BC$
तथा $\angle ACB=65^\circ$ है।
 $\angle ADC$ की माप ज्ञात कीजिए।




प्रश्न 5 सामने चित्र में $\angle PTR$ और $\angle PSR$ की माप
ज्ञात कीजिए। जिसमें $\angle PQR=130^\circ$ है।



क्रियाकलाप-8

अपनी कापी में अलग-अलग माप का वृत्त लेकर
दी गई आकृति के अनुसार आकृति बनाइए तथा
कोणों को मापकर निम्न सारणी पूर्ण कीजिए।

वृत्त क्र.	x°	y°	$x^\circ+y^\circ$	z°	u°	$z^\circ+u^\circ$
1.						
2.						
3.						
4.						



एक ही चाप का कोण और चाप द्वारा केन्द्र पर बनाये गये कोण में संबंध –


(Relationship between the angles formed by an arc on the remaining segment of a circle and its centre)

आप चाप $\widehat{AB}$ द्वारा केन्द्र O पर बनाए गए $\angle AOB$ को पहचान चुके हैं। आपने चाप $\widehat{AB}$ द्वारा शेष वृत्तखण्ड के बिन्दु P पर $\angle APB$ बनाना भी सीख लिया है।




क्रियाकलाप 9


अब चाप AB का केन्द्रीय कोण $\angle AOB$ तथा शेष चाप पर बना कोण $\angle APB$ एक ही वृत्त पर निम्न प्रकार से बनाइए तथा अपनी कॉपी में कई वृत्त बनाकर इन कोणों को मापिए और तालिका पूर्ण कीजिए—



5.12



5.12



5.12

आकृति क्रं.	$\angle AOB$ की माप	$\angle APB$ की माप	$2 \angle APB$ की माप	क्या $\angle AOB = 2 \angle APB$
5.12 (i)				
5.12 (ii)				
5.12 (iii)				

आपने क्या देखा?

$\angle AOB$ और $2 \angle APB$ समान या लगभग समान हैं?

अतः $\angle AOB = 2 \angle APB$ (1)

अर्थात् चाप AB का केन्द्रीय कोण = $2 \times$ (शेष चाप पर बना कोण)

समी. (1) से, $\angle APB = \frac{1}{2} \times \angle AOB$

दूसरे शब्दों में, वृत्त में “किसी चाप द्वारा शेष वृत्तखण्ड के किसी बिन्दु पर अंतरित कोण, उसी चाप द्वारा केन्द्र पर बने कोण का आधा होता है।”

अभ्यास (Practice)

निम्न तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

चाप का केन्द्रीय कोण या अंशीय माप	चाप का कोण या चाप द्वारा शेष वृत्तखण्ड के किसी बिन्दु पर बनाया गया कोण	चाप कैसा है? लघुचाप/अर्धवृत्त/दीर्घचाप
150°	75° (क्यों)	लघुचाप (क्यों)
220°	-----	दीर्घचाप
-----	90°	अर्धवृत्त
-----	-----	दीर्घ चाप
-----	-----	लघु चाप

उदाहरण 3. एक वृत्त के चाप की अंशीय माप 132° है। इसी चाप द्वारा शेष वृत्तखण्ड के किसी बिन्दु पर अंतरित $\angle ACB$ ज्ञात कीजिए।


हल $\angle AOB = 132^\circ$ (दिया है)

चूँकि $\angle AOB = 2 \times \angle ACB$

या $\angle ACB = \frac{1}{2} \angle AOB$

$= \angle ACB = \frac{1}{2} \times 132^\circ = 66^\circ$

$\therefore \angle ACB = 66^\circ$



5.13

उदाहरण 4.

समबाहु $\triangle ABC$ के परिगत वृत्त का केन्द्र O है।

$\angle BOC$ की माप ज्ञात कीजिए।

हल: $\triangle ABC$ एक समबाहु त्रिभुज है।


अतः $\angle A = \angle B = \angle C = 60^\circ$

$\therefore \widehat{BC}$ का केन्द्रीय कोण $= \angle BOC$

$\therefore \angle BOC = 2 \angle BAC$

$= \angle BOC = 2 \times 60^\circ = 120^\circ$

अतः $\angle BOC = 120^\circ$



5.14


इस उदाहरण में OA को मिलाने पर $\angle AOC$ और $\angle AOB$ की माप बताइए?

समान चाप, संगत जीवा, चाप की अंशीय माप

क्रियाकलाप 10.

एक सफेद कागज पर 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाइए जिसका केन्द्र O है। व्यास AB खींचिए। AB से 90° का कोण बनाते हुए व्यास CD खींचिए।

आप जानते हैं प्रत्येक वृत्त अपने व्यास के सापेक्ष सममित है अतः दो समकोण बनाते हुए व्यास AB और CD वृत्त को चार समान टुकड़ों में बांट देंगे।



5.15

कागज को AB और CD दो बार मोड़ने से प्रत्येक चौथाई भाग एक दूसरे को पूरी तरह ढँक लेगा।


यहाँ चाप AD, DB, BC और CA एक दूसरे को पूरी तरह ढँक लेते हैं। इन चापों का केन्द्रीय कोण 90° है।

अतः लघु $\widehat{AD} = \widehat{DB} = \widehat{BC} = \widehat{CA}$

तो $\angle AOD = \angle DOB = \angle BOC = \angle COA = 90^\circ$

क्रियाकलाप 11.

O केन्द्र वाला एक वृत्त कागज पर बनाइए। व्यास AB खींचिए। इसे व्यास पर मोड़िये। केन्द्र O से इसे किसी अन्य त्रिज्या OC पर मोड़िये। कैंची से इसे OC पर काट लीजिए। फिर OB पर काटिये इस तरह दो टुकड़े OBC और OBC' दोनों त्रिज्या खण्ड हैं जो बराबर हैं।



अब चाप BC की लंबाई = चाप BC' की लंबाई
और $\angle COB = \angle C'OB'$

परिणाम—



एक ही वृत्त में समान लंबाई के चाप, केन्द्र पर समान कोण बनाते हैं एवं इसका विलोम भी सत्य है अर्थात् “एक ही वृत्त में केन्द्र पर बराबर कोण बनाने वाले चाप बराबर होते हैं।”
ऊपर लिखे क्रियाकलाप में BC और B'C' को मिलाइए।

अब देखिए ये दोनों त्रिज्याखण्ड OBC और OB'C'

इनमें $\angle COB = \angle C'OB'$

चाप BC = चाप B'C'

जीवा BC = जीवा B'C'



अतः समान चाप के संगत जीवाओं की लंबाई समान है एवं इसके विपरीत बराबर जीवाओं द्वारा केन्द्र पर अंतरित कोण बराबर होता है।

उदाहरण 5. आकृति में दो त्रिज्याखण्ड AOB तथा COD हैं।


$\angle AOB = \angle COD = 50^\circ$ यदि $AB = 2.5$ सेमी तो CD की लम्बाई ज्ञात कीजिए।

हल : चूँकि समान केन्द्रीय कोण वाले जीवाओं की लम्बाई समान होती है अतः

जीवा AB = जीवा CD

जीवा AB = 2.5 सेमी

अतः जीवा CD = 2.5 सेमी




उदाहरण 6. आकृति में वृत्त की त्रिज्या 3.6 सेमी है तथा $\angle AOB = 60^\circ$ है जीवा AB की लम्बाई तथा $\angle OAB$, $\angle OBA$ की माप ज्ञात कीजिए।

हल: दिया है त्रिज्या = 3.6 सेमी

OAB में

$OA = OB = 3.6$ सेमी (त्रिज्याएं)



∴ इन भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे।

∴ $\angle OBA = \angle OAB = x^\circ$ (माना)

ΔOAB में कोणों को योग $= 180^\circ$

$$\angle BOA + \angle OBA + \angle OAB = 180^\circ$$

$$60^\circ + x^\circ + x^\circ = 180^\circ$$

$$60^\circ + 2x^\circ = 180^\circ$$

$$2x^\circ = 180^\circ - 60^\circ$$

$$2x^\circ = 120^\circ$$

$$x^\circ = \frac{120^\circ}{2} = 60^\circ$$

∴ ΔOAB के तीनों कोण $60^\circ, 60^\circ, 60^\circ$ के हैं।


यह एक समबाहु त्रिभुज है।

∴ $AB = OB = OA = 3.6$ सेमी


अतः जीवा $AB = 3.6$ सेमी, $\angle OAB = 60^\circ$, $\angle OBA = 60^\circ$

प्रश्नावली 5.5


प्रश्न 1 निम्न आकृतियों में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए।



(a)



(b)




(c)


प्रश्न 2 निम्न आकृतियों में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए बताइये।

जब (i) $x = y$

(ii) $x = 2y$




(i)




(ii)



प्रश्न 3 आकृति में $AB = CD$ यदि $\angle AOB = 70^\circ$ तो $\angle COD$ का मान ज्ञात कीजिए।



प्रश्न 4 आकृति में $RS = 3.2$ सेमी तो PQ की माप क्या होगी?



प्रश्न 5 निम्न आकृतियों में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए।



जीवा — पूर्व में आपने सीखा है कि वृत्त के किन्हीं दो बिन्दुओं को मिलाने पर जो रेखाखण्ड प्राप्त होता है उसे जीवा कहते हैं और सबसे बड़ी जीवा ही व्यास है। आइए जीवा के कुछ गुणों को जाने।

वृत्त के केन्द्र से जीवा पर डाला गया लंब —

क्रियाकलाप 12.


केन्द्र O वाला एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त में जीवा AB खींचिए। अब $OM \perp AB$ इस प्रकार खींचिए कि M जीवा AB पर स्थित हो।

अलग-अलग त्रिज्याएँ और केन्द्र लेकर और उनसे वृत्त खींचकर उपर्युक्त क्रिया को दोहराइए।

उन आकृतियों को इसी प्रकार से नामांकित कीजिए।

वृत्तों को 1, 2 व 3 से नामांकित कीजिए।

प्रत्येक स्थिति में AM तथा BM को माप कर सारणी पूर्ण कीजिए।






चित्र क्र. 5.21

वृत्त	AM	BM	क्या $AM = BM$?
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

आप देखेंगे कि प्रत्येक स्थिति में AM तथा BM का समान है अतः $AM=BM$

क्रियाकलाप 13.

एक मोटा कागज लीजिए और उस पर O केन्द्र वाला एक वृत्त बनाइए। इस वृत्त में जीवा AB भी खींचिए।



चित्र क्र. 5.22

अब वृत्त को इस प्रकार मोड़िए कि A बिन्दु B बिन्दु पर पड़े, रेखा l के अनुदिश मोड़ का निशान प्राप्त करने के लिए कागज को दबाइए मोड़ के निशान को देखने पर पता चलता है कि रेखा l वृत्त केन्द्र O से होकर गुजरती है, तथा दोनों भाग एक दूसरे को पूर्णतया ढँक लेते हैं।

अब कागज को खोलकर l और जीवा AB के प्रतिच्छेद बिन्दु को M से अंकित कीजिए।

$\angle OMA$ तथा $\angle OMB$ को मापिये, ये दोनों 90° के होंगे। चूँकि AM, BM के संपाती है अतः $AM=BM$


क्रियाकलाप 11 व 12 से स्पष्ट होता है कि –

“वृत्त में उसके केन्द्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है।”

क्रियाकलाप 14.

केन्द्र O वाला एक वृत्त खींचिए। इसकी एक जीवा AB भी खींचिए। AB को एक बिन्दु M पर समद्विभाजित कीजिए तथा O और M को मिलाइए।

इसी क्रियाकलाप को दोहराकर अन्य वृत्त बनाइए। इन वृत्तों को 1, 2, 3 से चिह्नित कीजिए एवं सभी आकृतियों को समान रूप से नामांकित कीजिए।



चित्र क्र. 5.23

प्रत्येक वृत्त में $\angle OMA$ को मापिए तथा निम्न सारणी को पूरा कीजिए।

वृत्त	$\angle OMA$	$\angle OMB$	क्या $\angle OMA = \angle OMB$?
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

आप पायेंगे कि प्रत्येक स्थिति में $\angle OMA = \angle OMB$ (लगभग 90°) प्राप्त होता है। चूँकि

$\angle OMA$ तथा $\angle OMB$ दोनों जीवा AB के बीच के एक बिन्दु पर बने कोण हैं अतः उनका योगफल 180° है और साथ ही दोनों कोण बराबर हैं।


$$\text{अतः } \angle OMA = \angle OMB = 90^\circ$$

अर्थात् $OM \perp AB$

अतः “वृत्त की जीवा के मध्य बिन्दु को केन्द्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लम्ब होती है।”

क्रियाकलाप 15.

एक कागज लीजिए और उस पर O केन्द्र वाला एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त की एक जीवा AB खींचिए और उसका मध्य बिन्दु M को चिन्हांकित कीजिए। M और O को मिलाइए, अब रेखा OM के अनुदिश इसे मोड़िए जिससे कि बिन्दु A बिन्दु B पर पड़े।



चित्र क्र. 5.24

अब कागज को खोलिए आप पायेंगे कि $\angle OMA$, $\angle OMB$ पर पड़ता है। अतः $\angle OMA = \angle OMB = 90^\circ$


अर्थात् $OM \perp AB$

क्रियाकलाप 13 व 14 से स्पष्ट होता है कि —


“वृत्त की किसी जीवा के मध्य-बिन्दु को केन्द्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लम्ब होती है।”

प्रश्नावली 5.6


प्रश्न 1. आकृति में $OM \perp AB$. यदि $AM = 3.5$ सेमी. हो, तो BM और AB का मान ज्ञात कीजिए।



प्रश्न 2. आकृति में जीवा AB का मध्य बिन्दु M है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए।



प्रश्न 3. आकृति में $OM \perp PQ$. यदि $PQ = 8$ सेमी. हो, तो PM और MQ का मान ज्ञात कीजिए। क्या $PM=MQ$?



प्रश्न 4. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

- (1) वृत्त के केन्द्र से जीवा पर डाला गया लम्ब जीवा को करता है।
- (2) वृत्त में किसी जीवा के मध्य-बिन्दु को केन्द्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर होती है।

हमने सीखा (We Have Learnt)

1. वृत्त के किसी चाप द्वारा शेष वृत्त खण्ड पर बने सभी कोण समान होते हैं।
2. किसी जीवा के दोनों ओर वृत्त खण्डों में बनने वाले कोणों का योगफल 180° होता है।
3. वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त शेष वृत्तखण्ड पर अंतरित कोण चाप द्वारा वृत्त के केन्द्र पर अंतरित कोण का आधा होता है।
4. एक ही वृत्त में समान लम्बाई के चाप केन्द्र पर समान कोण बनाते हैं।
5. किसी वृत्त के केन्द्र से वृत्त के जीवा पर डाला गया उस जीवा को समद्विभाजित करता है।
6. वृत्त की किसी जीवा के मध्य बिन्दु को केन्द्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लम्ब होती है।



अध्याय-6 सांख्यिकी STATISTICS



समान्तर माध्य [MEAN]

जानवरों को पानी पिलाने में राधा बहुत आनन्द अनुभव करती है। वह रोज़ एक बड़ी टंकी में जानवरों के लिए पानी भर देती है और हिसाब भी रखती है कि प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच कितने जानवर पानी पी रहे हैं। उसके द्वारा लिखे गए पिछले हफ्ते का हिसाब कुछ इस प्रकार है :-



चित्र 6.1

सोमवार	—	12,	मंगलवार	—	15,	बुधवार	—	13,
बृहस्पतिवार	—	11,	शुक्रवार	—	13,	शनिवार	—	12
रविवार	—	14						

क्या आप बता सकते हैं कि राधा प्रतिदिन औसतन कितने जानवरों को पानी पिलाती है।

क्रिकेट खिलाड़ी A ने अपनी दस पारियों में 60, 70, 15, 90, 72, 45, 11, 77, 125, 200 रन बनाये। इसी तरह खिलाड़ी B ने अपनी छः पारियों में 220, 110, 70, 37, 15, 07 रन बनाये। क्या आप बता सकते हैं कि किस खिलाड़ी की उपलब्धि अच्छी रही?

इस तरह की तुलना हम औसत निकाल कर आसानी से कर सकते हैं।

इसी प्रकार दैनिक जीवन में हम कई स्थानों पर औसत का उपयोग करते हैं। जैसे –

- (1) आपकी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है।
- (2) आपका रात में सोने का औसत समय 8 घंटे है।
- (3) दैनिक समाचार पत्रों का औसत मूल्य 2.50 रुपये है।
- (4) कक्षा में विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति 45 है।
- (5) इस वर्ष रायपुर में औसत से कम वर्षा हुई।

उपरोक्त उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। रात में सोने का औसत समय 8 घंटे है। इनसे तात्पर्य यह नहीं है कि कक्षा के प्रत्येक छात्र की आयु 14 वर्ष है या रोज़ रात में आप 8 घंटे सोते हैं। न ही यह अधिकतम या न्यूनतम है।

वास्तव में, औसत दिए गए प्रेक्षणों (अँकड़ों) के योग में प्रेक्षणों (अँकड़ों) की संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। इसे समान्तर माध्य भी कहते हैं। इसे संकेत M द्वारा दर्शाते हैं।

$$\text{अतः औसत या समान्तर माध्य (Mean) (M) = \frac{\text{प्रेक्षणों का योग (Sum of scores)}}{\text{प्रेक्षणों की संख्या (No. of scores)}}$$

अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि राधा प्रतिदिन औसतन कितने जानवरों को पानी पिलाती है।

$$\text{औसत} = \frac{12 + 15 + 13 + 11 + 13 + 13 + 14}{7} = \frac{91}{7} = 13$$

अतः राधा औसतन 13 जानवरों को प्रतिदिन पानी पिलाती है।

अब आप स्वयं खिलाड़ी A व B की पारियों का समान्तर माध्य ज्ञात कर बताइए कि किस खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा रहा।



क्रियाकलाप 1.(Activity 1)

आप अपने परिवार के सदस्यों की औसत आयु निकालिए।



क्रियाकलाप 2.(Activity 2)

आप अपनी अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत निकालिए।

उदाहरण 1. एक फल की दुकान पर पांच टोकरियों में 46 किग्रा, 21 किग्रा, 18 किग्रा, 25 किग्रा. तथा 35 किग्रा. सेब रखे हैं। इनका समान्तर माध्य ज्ञात कीजिए।

हल:

$$\text{समान्तर माध्य (M) = } \frac{\text{प्रेक्षणों का योग}}{\text{प्रेक्षणों की संख्या}}$$

$$\text{समान्तर माध्य (M)} = \frac{46 + 21 + 18 + 25 + 35}{5} = \frac{145}{5} = 29 \text{ किग्रा.}$$

उदाहरण 2. प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समान्तर माध्य ज्ञात कीजिए।

हल: प्रथम दस प्राकृत संख्याएँ निम्नांकित हैं —

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

$$\text{समान्तर माध्य (M)} = \frac{\text{प्रेक्षणों का योग}}{\text{प्रेक्षणों की संख्या}}$$

$$\begin{aligned} \text{समान्तर माध्य (M)} &= \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10}{10} \\ &= \frac{55}{10} = 5.5 \end{aligned}$$

बहुलक [MODE]

विद्यालय द्वारा कक्षा आठवीं के छात्रों को दीपावली अवकाश में किसी दर्शनीय स्थल के भ्रमण कराने का निश्चय किया गया। प्रधानाध्यापक ने सिरपुर, रतनपुर, जगदलपुर तथा अम्बिकापुर में से एक स्थान का चुनाव करने का निर्देश दिया। कुछ छात्र सिरपुर तो कुछ छात्र जगदलपुर जाना चाहते हैं। स्थान तय नहीं होने के कारण, कक्षाध्यापक द्वारा चारों स्थानों के नाम श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों से हाथ खड़े करवाकर टैली (गणन चिह्न) द्वारा बारम्बारता सारणी बनाई गई, जो निम्नानुसार है—

सारणी 6.1

दर्शनीय स्थल	गणना चिह्न	विद्यार्थियों की संख्या
सिरपुर		7
जगदलपुर		13
रतनपुर		5
अम्बिकापुर		5

सारणी बनाने के बाद कक्षाध्यापक ने कहा सर्वाधिक 13 विद्यार्थी जगदलपुर जाना चाहते हैं, अतः हमें जगदलपुर जाना चाहिए।

दैनिक जीवन में भी ऐसी कई घटनाएँ होती हैं जिनका चयन इसी प्रकार करते हैं। जैसे — अधिकतर समान व्यक्तियों की शर्ट की माप 38 या 40 नम्बर होती है। अतः रेडिमेड कपड़े की दुकान में हमें 38 या 40 नम्बर की ही शर्ट आसानी से मिलती है। इससे कम या अधिक माप की शर्ट दुकान में कम रखी जाती है, क्योंकि उसकी मांग कम है। अतः कम्पनी उसी नम्बर का शर्ट अधिक बनाती है जिसकी मांग बाजार में अधिक है।

चयन का यह आधार ही बहुलक है। अर्थात् “बहुलक दिए गये प्रेक्षणों में से वह मान है जो सर्वाधिक बार दोहराया गया हो।” इसे संकेत M_0 द्वारा दर्शाते हैं।

उदाहरण 3. एक फुटबाल टीम के 11 खिलाड़ियों द्वारा पहने गए जूतों के नाप के नम्बर निम्न प्रकार हैं—

6, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 6, 7, 8

बहुलक ज्ञात कीजिए।

हल : दिए गये नम्बरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिखने पर,

4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8

स्पष्ट है कि यहाँ 6 नम्बर सबसे अधिक बार (4 बार) आया है,

अतः बहुलक 6 होगा अर्थात् $M_0 = 6$



माधिका [MEDIAN]

उदाहरण 4. एक कक्षा के 15 छात्रों के वार्षिक परीक्षा में पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नानुसार हैं :-

(A) 15, 35, 16, 25, 45, 76, 90, 99, 50, 16, 57, 60, 86, 17, 95

बताइये इनमें से कितने छात्रों के अंक आधे से अधिक हैं। यहाँ प्राप्तांकों को देखने से तो यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। आइए, इन्हें हम आरोही (बढ़ते) क्रम में व्यवस्थित करके देखें —

(B) 15, 16, 16, 17, 25, 35, 45, 50, 57, 60, 76, 86, 90, 95, 99

(अ) प्राप्तांकों (A) के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

1. दिए गए प्राप्तांकों (पदों) में मध्य पद हैं ?
2. मध्य पद के प्राप्तांक से कम प्राप्तांक वाले कितने पद हैं ?
3. मध्य पद के प्राप्तांक से अधिक प्राप्तांक वाले कितने पद हैं ?
4. क्या मध्य पद के प्राप्तांक से कम एवं अधिक प्राप्तांक वाले पदों की संख्या समान (बराबर) है ?

(ब) व्यवस्थित प्राप्तांकों (B) के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

1. व्यवस्थित प्राप्तांकों में मध्य पद के प्राप्तांक क्या हैं ?
2. मध्य पद के प्राप्तांक से कम प्राप्तांक वाले कितने पद हैं ?
3. मध्य पद के प्राप्तांक से अधिक प्राप्तांक वाले कितने पद हैं ?
4. क्या मध्य पद के प्राप्तांक से कम एवं अधिक प्राप्तांक वाले पदों की संख्या समान है ?

पदों को घटते क्रम या बढ़ते क्रम में रखने पर ही मध्य पद का निर्धारण होता है। इसी मध्य पद को माधिका कहते हैं।

अर्थात् “दिए गए आँकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके बीच वाला मान ही माध्यिका है।” माध्यिका को संकेत M_d द्वारा दर्शाते हैं।

[A] माध्यिका ज्ञात करना जब आँकड़ों की संख्या N विषम हो :

[A] Finding the Median when the number of scores N is odd :

जब दिए गए आँकड़ों की संख्या विषम संख्या में हो, तो सर्वप्रथम उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखकर $M_d = \left(\frac{N+1}{2} \right)$ वाँ पद का मान ज्ञात करते हैं। प्राप्त मान ही माध्यिका है।

अर्थात् माध्यिका $M_d = \left(\frac{N+1}{2} \right)$ वाँ पद का मान

Median $M_d = \left(\frac{N+1}{2} \right)$ th item

उदाहरण 6. 3, 5, 10, 9, 8, 14, 6, 12, 13, 11, 7 की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

हल : आँकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करके लिखने पर,

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (यहाँ कुल पदों की संख्या 11 अर्थात् विषम है)

$M_d = \left(\frac{N+1}{2} \right)$ वाँ पद का मान $= \left(\frac{11+1}{2} \right)$ वाँ पद का मान $= 6$ वाँ पद का मान

$$M_d = 9$$

[B] माध्यिका, जब आँकड़ों की संख्या N सम हो :-

[B] Finding the Median when the number of scores N is even :

जब दिए गए आँकड़े सम संख्या में हों तो उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में दो संख्याएँ होती हैं। ऐसी स्थिति में हम उन दोनों मध्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कर माध्यिका निकालते हैं।

अर्थात्
$$M_d = \frac{\left[\left(\frac{N}{2} \right) \text{ वाँ पद का मान} + \left(\frac{N}{2} + 1 \right) \text{ वाँ पद का मान} \right]}{2}$$

$$M_d = \frac{\left[\left(\frac{N}{2} \right) \text{ item} + \left(\frac{N}{2} + 1 \right) \text{ item} \right]}{2}$$

उदाहरण 7. बंटन 5, 9, 4, 6, 12, 8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

हल : दिये गये आँकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर,

4, 5, 6, 8, 9, 12

यहाँ $N = 6$ (सम संख्या है)

$$\text{माध्यिका } M_d = \frac{\left[\frac{6}{2} \text{ वाँ पद का मान} + \left(\frac{6}{2} + 1 \right) \text{ वाँ पद का मान} \right]}{2}$$

$$\begin{aligned}
 M_d &= \left[\frac{\frac{6}{2} \text{ वाँ पद का मान} + \left(\frac{6}{2} + 1\right) \text{ वाँ पद का मान}}{2} \right] \\
 &= \frac{\text{तीसरे पद का मान} + \text{चौथे पद का मान}}{2} \\
 &= \frac{6+8}{2} = 7 \\
 \boxed{M_d = 7}
 \end{aligned}$$

प्रश्नावली 6.1 (Exercise 6.1)

- प्र.1. समान्तर माध्य ज्ञात कीजिए।
81, 74, 69, 73, 91, 55, 61
- प्र.2. 50 से 70 तक की सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए।
- प्र.3. माध्यिका ज्ञात कीजिए।
4, 5, 10, 6, 7, 14, 9, 15
- प्र.4. एक कक्षा के 11 छात्रों का भार (किलोग्राम में) निम्न प्रकार हैं –
25, 27, 29, 32, 30, 28, 26, 31, 35, 41, 34
इनकी माध्यिका ज्ञात करो।
- प्र.5. कक्षा आठवीं के छात्रों में विज्ञान प्रतियोगिता में निम्नानुसार अंक प्राप्त किये।
83, 61, 48, 73, 76, 52, 67, 61, 79
उपरोक्त आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए।
- प्र.6. दिये गये आँकड़ों से बहुलक प्राप्त कीजिए :-
7, 5, 9, 9, 3, 1, 9, 7, 5, 3, 1, 1, 9, 7, 7, 5, 5, 5, 3, 1, 5, 3, 5, 1, 5, 7, 7, 9, 9, 1
- प्र.7. निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए।
5, 3, 2, 2, 4, 5, 3, 3, 4, 3, 5, 3
- प्र.8. प्रथम पाँच विषम प्राकृत संख्याओं का समान्तर माध्य ज्ञात कीजिये।
- प्र.9. संख्याएँ 8, 5, x, 6, 10, 5 का माध्य 7 हैं। x का मान ज्ञात कीजिए।


पाई चार्ट (वृत्त चित्र) (Pie Chart)

क्रियाकलाप 1. (Activity 1)

किसी राज्य के A,B,C,D,E, 5 जिलों में वनों की मात्रा को वृत्ताकार रेखा चित्र द्वारा दर्शाया गया।

यह मान लिया जाये कि जिस जिले में सर्वाधिक वन हैं, उस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो क्या आप बता सकते हैं कि –

1. किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है?
2. किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है?




चित्र 6.2

क्रियाकलाप 2. (Activity 2)

किसी विधानसभा चुनाव में 4 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा। उनके प्राप्त मतों को वृत्ताकार रेखाचित्र में दर्शाया गया है। वृत्ताकार रेखा चित्र को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. किस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत मिले?
2. किस उम्मीदवार को सबसे कम मत मिले?



चित्र 6.3

इसका आंकलन आपने कैसे किया?

आप जानते हैं कि किसी वृत्त के केन्द्र पर बने कोणों का योग 360° होता है। उम्मीदवार A के प्राप्त मतों का क्षेत्र केन्द्र पर सबसे बड़ा कोण बनाता है। उसी प्रकार उम्मीदवार D के मतों द्वारा घेरा गया क्षेत्र केन्द्र पर सबसे छोटा कोण बनाता है।

उदाहरण 8. जशपुर के एक विद्यालय में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक पढ़ने वाले विद्यार्थी की संख्या निम्नांकित है। इनको वृत्ताकार रेखाचित्र में दर्शाइये।

कक्षा	6	7	8	9	10
विद्यार्थी की संख्या	216	180	150	110	64

हल: वृत्ताकार रेखाचित्र बनाने के लिए हम सबसे पहले सभी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का योग करते हैं और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के लिए वृत्त के केन्द्र पर बनने वाले कोण का मान ज्ञात करते हैं।

कुल विद्यार्थी = 216 + 180 + 150 + 110 + 64 = 720

सम्पूर्ण वृत्त 720 छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है।

∴ 720 छात्रों के लिए इस वृत्त के केन्द्र पर कोण बनाया जाता है = 360°

∴ एक छात्र के लिए केन्द्र पर बना कोण = $\frac{360^\circ}{720}$

∴ 216 छात्रों के लिए = $\frac{360^\circ}{720} \times 216$


अतः कक्षा 6 के छात्रों के लिए बना कोण = $\frac{360^\circ}{720} \times 216 = 108^\circ$

कक्षा 7 -----,----- = $\frac{360^\circ}{720} \times 180 = 90^\circ$

कक्षा 8 -----,----- = $\frac{360^\circ}{720} \times 150 = 75^\circ$

कक्षा 9 -----,----- = $\frac{360^\circ}{720} \times 110 = 55^\circ$

कक्षा 10 -----,----- = $\frac{360^\circ}{720} \times 64 = 32^\circ$




चित्र 6.4

कोण ज्ञात करने के बाद किसी भी त्रिज्या का वृत्त बनाकर इसे एक-एक त्रिज्या खण्ड द्वारा चित्रानुसार (चित्र 6.4) निरूपित करेंगे।

उदाहरण 9. कक्षा आठवीं के 100 छात्रों की विभिन्न खेलों में रुचि (प्रतिशत में) निम्नानुसार है—
सारणी 6.2

खेल का नाम	खेलों में रुचि (%)	केन्द्रीय कोण
क्रिकेट	65	$\frac{65}{100} \times 360^\circ = 234^\circ$
फुटबॉल	15	$\frac{15}{100} \times 360^\circ = 54^\circ$
हॉकी	10	$\frac{10}{100} \times 360^\circ = 36^\circ$
हैंडबाल	3	$\frac{3}{100} \times 360^\circ = 11^\circ$
वालीबॉल	7	$\frac{7}{100} \times 360^\circ = 25^\circ$
कुल छात्रों की संख्या	100	कुल केन्द्रीय कोण 360°

ग्राफीय निरूपण –



चित्र 6.5

उपर्युक्त उदाहरणों में आंकड़ों को वृत्त के माध्यम से दर्शाया गया है।

यदि आंकड़ों को वृत्त के त्रिज्याखण्डों द्वारा दिखाया जाता है तो इसे पाई चार्ट (वृत्त चित्र या वृत्ताकार लेखाचित्र) कहा जाता है।

क्रियाकलाप 3.

आप कक्षा सातवीं की परीक्षा में विभिन्न विषयों के आपके प्राप्तांकों का पाई चार्ट बनाइये।

उदाहरण 10. एक किसान के खेत में गत वर्ष पैदा हुई फसलों को वृत्ताकार लेखाचित्र द्वारा दर्शाया गया। यदि फसलों की कुल पैदावार 720 क्विंटल हुई हो तो प्रत्येक फसल की पैदावार का मान ज्ञात कीजिए।

हल: फसल की कुल पैदावार = 720 क्विंटल

$$\therefore 360^\circ = 720 \text{ क्विंटल}$$

$$\therefore 1^\circ = \frac{1}{360} \times 720 \text{ क्विंटल}$$

$$\therefore 135^\circ = \frac{135}{360} \times 720 \text{ क्विंटल}$$


$$\text{अतः गेहूँ की पैदावार} = \frac{135}{360} \times 720 = 270 \text{ क्विंटल}$$

$$\text{चावल की पैदावार} = \frac{90}{360} \times 720 = 180 \text{ क्विंटल}$$

$$\text{उड़द की पैदावार} = \frac{45}{360} \times 720 = 90 \text{ क्विंटल}$$

$$\text{मूँग की पैदावार} = \frac{40}{360} \times 720 = 80 \text{ क्विंटल}$$

$$\text{सरसों की पैदावार} = \frac{50}{360} \times 720 = 100 \text{ क्विंटल}$$



चित्र 6.6

प्रश्नावली 6.2

प्र.1. गीता द्वारा गणित की छः माहों की मासिक जांच परीक्षा में प्राप्तांक निम्नानुसार हैं –

महीनों के नाम	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
प्राप्तांक 100 में	40	45	65	35	55	60

उपर्युक्त आंकड़ों से पाई-चार्ट (वृत्ताकार लेखाचित्र) बनाइये।

प्र.2. एक परिवार की मासिक आय 12000 रु. है। परिवार को मासिक खर्च निम्नानुसार है, दिये गये आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइये।

क्र.सं.	मद	खर्च किये जाने वाली राशि(रूपयों में)
1.	मकान किराया	1500
2.	भोजन	6000
3.	शिक्षा	1200
4.	मनोरंजन	1800
5.	स्वास्थ्य	1500

प्रायिकता (Probability)

आज स्कूल की छुट्टी होने वाली थी कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बच्चे सोच रहे थे कि ऐसी तेज बारिश में घर कैसे जाए। तभी मीना ने अनु से कहा कि अक्टूबर माह में इस बारिश की संभावना तो नहीं थी। अनु ने कहा कि संभावना नहीं थी ऐसी बात नहीं है, संभावना कम थी। जैसे जुलाई के महीने में बारिश होने की संभावना ज्यादा होती है वैसे ही अक्टूबर या अप्रैल में बारिश की सम्भावना बहुत कम होती है।

दैनिक जीवन में कई स्थानों पर संभावना का उपयोग किया जाता है, जैसे दो दलों के बीच खेल में कौन जीतेगा, यह मालूम नहीं होता परन्तु अच्छे दल के जितने की संभावना अधिक होती है। नीचे कुछ परिस्थितियाँ दी गई हैं। उनके घटने की संभावना अधिक है या कम, लिखिए—

1. पोलियो की दवा पिलाने पर पोलिया होने की संभावना
2. धूम्रपान से फेफड़े का केन्सर होने की संभावना
3. जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं वहाँ वर्षा होने की संभावना

4. गाड़ी धीरे चलाने पर दुर्घटना होने की संभावना
5. वर्षा ऋतु में साँप दिखने की संभावना

ऊपर की सभी संभावनाओं का पता आपने या किसी और व्यक्ति ने आँकड़ों की सहायता से लगाया है। जैसे पोलियो की दवा नहीं पिलाने पर पोलियो होने की सम्भावना अधिक होती है। आँकड़े बताते हैं कि अधिकतर दुर्घटना गाड़ी की तेज रफ्तार के कारण होती है।
आइए, संभावना का अनुमान लगाने का प्रयास करें—

क्रियाकलाप 4.

दो डिब्बे लीजिए। उनमें क्रमशः A और B लिखिए। कागज के समान आकार के 25 टुकड़े लीजिए। उनमें से 10 टुकड़ों पर Y लिखिए तथा 15 टुकड़ों पर X लिखिए। सभी टुकड़ों को एक समान मोड़कर अलग-अलग ढेरी में रखिए। एक डिब्बे में X लिखे पाँच व Y लिखे पाँच टुकड़े तथा दूसरे डिब्बे में 5, X तथा 10, Y लिखे हुए टुकड़े लें।

डिब्बे में टुकड़ों को डालकर अच्छी तरह से हिलाएँ, जिससे दोनों प्रकार के टुकड़े भली भाँति मिल जाए। अब अपने साथियों से दोनों डिब्बों में से एक-एक कागज का मुड़ा हुआ टुकड़ा आँख बंद कर उठाने को कहिए तथा उसके द्वारा निकाले गए टुकड़ों में X लिखा है या Y, नोटकर पुनः उस टुकड़े को वापस वैसा ही मोड़ कर डिब्बे में डालकर अच्छी तरह से हिलाएँ तथा दूसरे सभी साथियों के लिए यही प्रक्रिया दोहराएँ तथा प्राप्त परिणाम नीचे दी गई सारणी में भरिए—

सारणी-6.3

क्र.सं.	नाम	A डिब्बे में से निकाले गए कागज के टुकड़े पर लिखा गया अक्षर	B डिब्बे में से निकाले गए कागज के टुकड़े पर लिखा गया अक्षर
1			
2			
3			
4			
		A डिब्बे से निकले कुल X = A डिब्बे से निकले कुल Y =	B डिब्बे से निकले कुल X = B डिब्बे से निकले कुल Y =

अब सारणी देखकर बताइये कि —

किस डिब्बे में से X लिखा हुआ टुकड़ा आने की संभावना अधिक है? तथा क्यों?


प्रश्न को हल करते हुए सुरेश ने कहा— B डिब्बे में कुल 15 कागज के टुकड़े हैं जिनमें से 5 में X लिखे हैं और 10 में Y, चूँकि Y लिखे हुए टुकड़े अधिक हैं, इसलिए Y के आने की संभावना अधिक है।

तभी रानी ने पूछा “तो क्या A डिब्बे में से X और Y आने की संभावना समान है?”

रानी के प्रश्न का उत्तर आप भी सोचिए और सोचकर कारण सहित उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए।

क्रियाकलाप 5.

चित्र में दिए गए बॉक्सों में सफेद (W) और काले (B) रंग की गेंदें रखी हुई हैं। बॉक्स में से यदि बिना देखे कोई एक गेंद निकालनी हो, तो नीचे दिए गए संभावनाओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।



चित्र 6.7

प्र.1 गेंद सफेद हो, इस बात की संभावना किस बाक्स में सर्वाधिक है?

प्र.2 गेंद काली हो, इस बात की संभावना किस बाक्स में सर्वाधिक है?

प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए रानी ने एक सारणी बनायी—

सारणी 6.4

बाक्स क्र.	सफेद गेंदों की संख्या	काले गेंदों की संख्या	कुल गेंदों की संख्या
1	3	3	6
2	2	6	8
3	10	4	14
4	4	3	7

रानी द्वारा बनाए गए सारणी को देखकर सुरेश ने कुछ इस प्रकार निष्कर्ष निकाले—

1. बाक्स क्र. 1 में कुल 6 गेंदों में से 3 गेंदें काली हैं और 3 गेंदें सफेद हैं इसलिए दोनों गेंदों के आने की संभावना समान है।
2. बाक्स क्र. 2 में कुल 8 गेंदों में से 2 गेंदें सफेद हैं तथा 6 गेंदें काली हैं, इसलिए काली गेंद आने की संभावना अधिक है।
3. बाक्स क्र. 3 में कुल 14 गेंदों में से 10 गेंदें सफेद हैं तथा 4 गेंदें काली हैं, अतः सफेद गेंद आने की संभावना अधिक है।
4. बाक्स क्र. 4 में कुल 7 गेंदों में से 4 गेंदें सफेद हैं तथा 3 गेंदें काली हैं, अतः सफेद गेंद के आने की संभावना अधिक है।

सुरेश द्वारा सोचा गया उत्तर तो सही है, परंतु उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि बॉक्स क्र. 3 में कुल 14 में से 10 सफेद गेंदे हैं तथा बॉक्स क्र. 4 में कुल 7 में से 4 सफेद गेंदे हैं, तो किस बॉक्स में से सफेद गेंद खींचने की संभावना ज्यादा है?

मेरी ने सुझाया – इसे अगर भिन्न के रूप में देखा जाए तो कैसा रहेगा, जैसे कि – 14 में

से $10 = \frac{10}{14}$ और 7 में से $4 = \frac{4}{7}$, इन दोनों भिन्न संख्याओं की तुलना करने पर—

$$\frac{10}{14} = \frac{10}{14} \text{ और } \frac{4}{7} = \frac{4 \times 2}{7 \times 2} = \frac{8}{14} \text{ (सम हर बनाने पर) इस प्रकार}$$

$\frac{10}{14}$ और $\frac{8}{14}$ में से $\frac{10}{14}$ बड़ी संख्या है। अतः कुल 14 गेंदों में से 1 गेंद खींचने पर

सफेद आने की संभावना कुल 7 में से 1 गेंद खींचने पर सफेद आने की संभावना से ज्यादा होगी।

फैसला सिक्का उछाल कर करना— Taking a decision by tossing a coin-

आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच के प्रारंभ में कप्तान सिक्को की उछाल (Toss) अपने पक्ष में आने पर पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी का निर्णय लेते हैं।

क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जिनमें निर्णय सिक्का उछालकर कर लिया जा सकता हो?

क्रियाकलाप 6.

आइए एक क्रियाकलाप करके देखें—

एक सिक्का लीजिए और बारी-बारी से आप सभी उछालिए तथा सिक्का जमीन में गिरने के बाद चित आता है या पट निम्न तालिका में नोट कीजिए—

सारणी 6.5

क्र.सं.	विद्यार्थी का नाम	क्या आया चित/पट
1		
2		
3		
4		

तालिका देख कर बताइए—

1. क्या चित और पट लगातार एक के बाद एक आते हैं?
2. क्या चित और पट की कुल संख्या लगभग समान है?
3. किसी सिक्के को उछालने पर चित या पट में से किसके आने की संभावना ज्यादा है?

आपने ध्यान दिया होगा कि एक सिक्के में दो पक्ष होते हैं— एक चित और दूसरा पट। इस प्रकार कुल दो पक्ष में से चित के आने की संभावना 2 में से 1 है या $\frac{1}{2}$ है। उसी प्रकार कुल दो पक्षों में से पट के आने की संभावना भी 2 में से 1 अर्थात् $\frac{1}{2}$ होगी।

किसी बाक्स में यदि 3 गेंदे क्रमशः लाल, पीला और सफेद रंग की हों और उनमें से आँख बंद कर एक गेंद निकाली जाए तो गेंद के लाल होने की संभावना कुल तीन गेंदों में से 1 लाल गेंद के आने की संभावना के तुल्य होगी अर्थात् यह $\frac{1}{3}$ होगी। इसी प्रकार निकाली गई एक गेंद पीली हो, उसकी संभावना भी $\frac{1}{3}$ होगी और उसके सफेद होने की संभावना भी $\frac{1}{3}$ होगी।

अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि संभावना को भी मापा जा सकता है तथा “किसी घटना के घटित होने की संभावना को मापना प्रायिकता कहलाता है।

आइए, कुछ उदाहरणों के माध्यम से और अधिक जानें —

उदाहरण 11. ताश की गड्डी से यदि आपको आँख बंद कर हुकुम का एक पत्ता निकालने को कहा जाए, तो उसको निकालने की प्रायिकता (संभावना) क्या होगी?

हल: चूँकि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिनमें से 13 पत्ते हुकुम के होते हैं,

अतः हुकुम का एक पत्ता निकालने की प्रायिकता = 52 में से 13 अर्थात् $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$

उदाहरण 12. किसी पासे के एक उछाल में शीर्ष पर तीन आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

हल: पासे में कुल 6 फलक होते हैं जिनमें क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 व 6 बिन्दु अंकित होते हैं।

अतः शीर्ष पर तीन आने की प्रायिकता = 6 में से 1

$$= \frac{1}{6}$$

(क्योंकि छः फलकों में से केवल एक फलक में ही तीन बिन्दु अंकित होता है।)

उदाहरण 13. एक थैले में तीन सफेद, पाँच लाल और आठ काली गेंदे हैं। उनमें से एक लाल गेंद निकालने की संभावना क्या होगी?

हल: थैले में कुल गेंद = 3 सफेद + 5 लाल + 8 काली = 16

थैले में से एक लाल गेंद निकालने की संभावना 16 में से 5 होगी, क्योंकि थैले में कुल 5 गेंदे लाल हैं, अर्थात्

$$\text{एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता (संभावना)} = \frac{5}{16}$$

उदाहरण 14. ताश की गड्डी में से बिना देखे एक पत्ता खींचा जाता है। उस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

हल: ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या = 52

ताश की गड्डी में बादशाह की संख्या = 4

ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचने पर चारों बादशाह में से कोई भी एक बादशाह बाहर आ सकता है।

अतः बादशाह होने की प्रायिकता = 52 में से 4

$$= \frac{4}{52}$$

$$= \frac{1}{13}$$

प्रश्नावली 6.3

1. ताश की गड्डी से ईंट का एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या होगी?
2. एक थैले में 6 सफेद, 11 लाल और 7 नीले रंग की गेंदे हैं। उस थैले में से एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए?
3. एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता में कुल पाँच प्रतिभागी हैं। उनके जीतने की संभावना ज्ञात कीजिए?
4. एक टोकरी में 10 सेब, 8 अनार और 12 अमरुद हैं तो टोकरी में से एक सेब निकालने की प्रायिकता क्या होगी?
5. पासे के एक उछाल में उसके शीर्ष पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए?
6. यदि एक सिक्का उछालें तो उसमें चित आने की संभावना ज्ञात कीजिए और पट आने की संभावना भी ज्ञात कीजिए।

हमने सीखा (We have learnt)

1. औसत(माध्य)वह एकमात्र अंक है, जो आंकड़ों के समूहन को प्रदर्शित करता है।

$$2. \quad \text{समान्तर माध्य} = \frac{\text{समस्त आंकड़ों का योगफल}}{\text{आंकड़ों की कुल संख्या}}$$

3. माधिका ज्ञात करते समय आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में रखा जाता है।

4. माधिका घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों के समूहन के मध्य का अंक होता है।

$$5. \quad (i) \quad M_d = \frac{N+1}{2} \text{ वाँ पद} \quad (\text{जब } N \text{ विषम संख्या हो})$$

$$(ii) \quad M_d = \frac{\left[\left(\frac{N}{2} \right) \text{ वाँ पद} + \left(\frac{N}{2} + 1 \right) \text{ वाँ पद} \right]}{2} \quad (\text{जब } N \text{ सम संख्या हो})$$

6. आंकड़ों में सर्वाधिक बारम्बारता वाला आंकड़ा बहुलक होता है।

7. किसी घटना के घटित होने की संभावना ही उसकी प्रायिकता है।



अध्याय-7

अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण

DIRECT AND INVERSE VARIATION



भूमिका (Introduction)

कभी कभी ऐसी चर्चाएँ सुनने में आती हैं कि जिस वर्ष अधिक पानी गिरता है उस वर्ष तालाब और कुँओं में जल स्तर अधिक बढ़ जाता है। जनसंख्या बढ़ने के साथ पानी की खपत भी बढ़ जाती है। जैसे-जैसे तालाबों की संख्या कम हो रही है इससे जल इकट्ठा करने की क्षमता भी कम हो रही है। बिजली का उत्पादन कम होने से उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन कम हो जाता है।



वर्षा अधिक होने से तालाब में जलस्तर भी अधिक हो गया।

चित्र-7.1

उपरोक्त कथनों पर विचार करें तो हम देखते हैं कि दो राशियाँ किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर है तथा किसी एक का मान बदलने से दूसरे का मान भी बदल जाता है।

इस प्रकार दो संबंधित राशियों में से एक राशि का मान बदलने पर दूसरी राशि का मान बदलने को गणित में **विचरण** कहते हैं तथा जब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े या एक के घटने से दूसरा घटे तो इस प्रकार के विचरण को **अनुक्रमानुपाती** विचरण कहते हैं।

आप भी अपने आसपास इस तरह के परिवर्तन से संबंधित उदाहरण सोचिए और लिखिए।

राजू ने लिखा कि यदि खेती की जमीन अधिक रहेगी तो फसल भी ज्यादा पैदा होगी अर्थात् यदि एक एकड़ में 24 बोरा धान उत्पन्न होता है तो 3 एकड़ में 72 बोरा धान उत्पन्न होगा।

सुधा ने अनाज की मात्रा और उसके मूल्य के बीच संबंध को लिखा। उसने लिखा कि यदि 1 किलो चावल का मूल्य 9 रु. है तो 2 किलो का मूल्य 18 रु. एवं 5 किलो चावल का मूल्य 45 रु. होगा।

इन उदाहरणों को पढ़कर मेरी ने कहा कि “परन्तु हमेशा ऐसा तो नहीं होता कि दो राशियों में एक का मान बढ़ने से दूसरा भी एक निश्चित अनुपात में बढ़े अथवा एक का कम होने से दूसरा भी उसी अनुपात में कम हो। कभी-कभी एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है या एक के कम होने से दूसरा

अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुक्रमानुपाती विचरण के पाँच उदाहरण सोचकर लिखिए।
जिन दो चरों में अनुक्रमानुपाती विचरण का संबंध होता है, उनके बीच का अनुपात सदैव एक समान होता है। प्राप्त समान अनुपात को स्थिरांक या अचर राशि कहते हैं।

अर्थात् यदि x और y अनुक्रमानुपात में विचरण करते हैं तो $\frac{x}{y} = k$

यदि वही अनुपात x_1 और y_1 तथा x_2 और y_2 के बीच भी हो तो $\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2} = k$ होगा।



क्रियाकलाप-3

यदि x और y के बीच अनुक्रमानुपाती सम्बन्ध हों, तो निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए—

क्र.सं.	x	y	$\frac{x}{y}$
(1)	3	18	
(2)	25		$\frac{1}{6}$
(3)	9		$\frac{1}{6}$

क्र.सं.	x	y	$\frac{x}{y}$
(4)		24	$\frac{1}{6}$
(5)	7	42	
(6)		66	$\frac{1}{6}$

उदाहरण 2. यदि 3 किग्रा. गेहूँ का मूल्य 36 रु. है तो 18 किग्रा. गेहूँ का मूल्य ज्ञात कीजिए।

हल: चूंकि गेहूँ की मात्रा बढ़ने से संगत मूल्य भी बढ़ रहा है। अतः यहाँ अनुक्रमानुपाती विचरण का सम्बन्ध है।

माना कि 18 किग्रा. गेहूँ का मूल्य x रु. है।

तो इसे हम निम्नांकित सारणी के रूप में लिखते हैं—

गेहूँ की मात्रा (किग्रा में)	3	18
मूल्य (रु. में)	36	x

यहाँ 18 और x के बीच वही अनुपात होनी चाहिए जो 3 और 36 के बीच है या

$$\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$$

$$\therefore \frac{3}{36} = \frac{18}{x}$$

या $3 \times x = 18 \times 36$ (तिर्यक गुणा से) (By Cross multiplication)

$$\text{या } x = \frac{18 \times 36}{3}$$

$$\therefore x = 216 \text{ रु.}$$

अर्थात् 18 किग्रा. गेहूँ का मूल्य 216 रु. है।

उदाहरण 3. एक रेलगाड़ी 2 घण्टे में 120 किमी. दूरी तय करती है। उसी चाल से वह 5 घण्टे में कितनी दूरी तय करेगी?

हल: चूंकि समय में वृद्धि के साथ तय की गई दूरी भी अधिक होगी, अतः यहाँ अनुक्रमानुपाती विचरण का सम्बन्ध है।

माना कि 5 घंटे में x किमी. दूरी तय करेगी।

तो उसे हम निम्नांकित सारणी के रूप में लिख सकते हैं—

समय (घण्टे में)	2	5
तय की गई दूरी (किमी. में)	120	x

यहाँ 5 और x के बीच वही अनुपात होनी चाहिए, जो 2 और 120 के बीच है।

$$\text{या } \frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$$

$$\therefore \frac{2}{120} = \frac{5}{x}$$

$$\text{या } 2 \times x = 5 \times 120 \text{ (तिर्यक गुणा से) (By Cross multiplication)}$$

$$\text{या } x = \frac{5 \times 120}{2}$$

$$\therefore x = 300 \text{ किमी.}$$

अर्थात् वह रेलगाड़ी 5 घण्टे में 300 किमी. दूरी तय करेगी।

उदाहरण 4. यदि 4 घण्टे काम करने पर 32 रु. मजदूरी मिलती हो, तो 7 घण्टे काम करने पर कितनी मजदूरी मिलेगी?

हल: चूंकि अधिक समय काम करने पर अधिक मजदूरी मिलेगी, अतः यहाँ अनुक्रमानुपाती विचरण का संबंध है।

माना कि 7 घण्टे काम करने पर x रु. मजदूरी मिलेगी। तो सारणी इस प्रकार होगी—

समय (घण्टे में)	4	7
मजदूरी (रुपये में)	32	x

यहाँ 7 और x के बीच वही अनुपात होनी चाहिए, जो 4 और 32 के बीच है।

$$\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$$

$$\therefore \frac{4}{32} = \frac{7}{x}$$

या $4 \times x = 7 \times 32$ (तिर्यक गुणा से)

$$\text{या } x = \frac{7 \times 32}{4}$$

$$\therefore x = 56 \text{ रुपये}$$

अर्थात् 7 घण्टे काम करने पर 56 रुपये मज़दूरी मिलेगी।

उदाहरण 5. यदि कागज के 6 पत्रों का भार 45 ग्राम हो, तो ऐसे कितने पत्रों का भार $1\frac{1}{2}$ किग्रा. होगा?

हल: चूँकि पत्रों की संख्या बढ़ने से उसका भार भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, अतः यहाँ अनुक्रमानुपाती विचरण का संबंध है।

माना कि x पत्रों का भार $1\frac{1}{2}$ किग्रा. या 1500 ग्राम है।

(यहाँ पर भार को समान इकाइयों (ग्राम) में बदला गया है)

सारणी इस प्रकार होगी—

पत्रों की संख्या	6	x
भार (ग्राम में)	45	1500

यहाँ x और 1500 के बीच वही अनुपात होना चाहिए, जो 6 और 45 के बीच है।

$$\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$$

$$\frac{6}{45} = \frac{x}{1500}$$

$$\therefore \frac{6}{45} = \frac{x}{1500}$$

या $6 \times 1500 = 45 \times x$ (तिर्यक गुणा से)

$$\text{या } \frac{6 \times 1500}{45} = x \quad \text{या } x = \frac{6 \times 1500}{45}$$

$$\therefore x = 200 \text{ पत्र}$$

अर्थात् 200 पत्रों का भार $1\frac{1}{2}$ किग्रा. होगा।

प्रश्नावली 7.1 (Exercise 7.1)

प्र.1 नीचे दी गई किन सारणियों में x और y अनुक्रमानुपात में विचरण करते हैं? स्थिरांक का मान भी ज्ञात कीजिए।

सारणी (i)

x	7	9	13	21	25	30	41
y	21	27	39	63	75	90	123

सारणी (ii)

x	2.5	7.5	11	17.5	19
y	2.5	7.5	11	17.5	19

सारणी (iii)

x	5	6	7	8	9	11
y	25	24	35	40	50	66

सारणी (iv)

x	1	2	3	4	5
y	2	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$

प्र.2 निम्नांकित अनुक्रमानुपाती विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

मजदूरों की संख्या	1	2		4	5	
मजदूरी (रुपये में)	50		150	200		300

प्र.3 निम्नांकित सारणी में x और y अनुक्रमानुपात में विचरण करते हैं। स्थिरांक k का मान ज्ञात कीजिए—

x	2	4	8	16	32
y	14	28	56	112	224
$k = \frac{x}{y}$					

प्र.4 एक कार 3 घण्टे में 600 किमी. चलती है, तो 5 घण्टे में कितनी दूरी चलेगी?

प्र.5 यदि x और y परस्पर अनुक्रमानुपात में विचरण करते हैं, तो निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

x	4	24			44	52
y	10		70	90		

प्र.6 निम्नलिखित अनुक्रमानुपाती विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

समय (मिनटों में)	3	4	—	25	—
तय की गई दूरी (किमी. में)	—	48	84	—	1860

प्र.7 निम्नलिखित में से कौन-कौन सी राशियाँ अनुक्रमानुपात में विचरती हैं ?

- वस्तुओं की संख्या और उनका मूल्य
- कक्षा-7 वीं के गणित की किताबों की संख्या और उनका मूल्य
- खेत का क्षेत्रफल और उसका मूल्य
- दूध की लीटर में मात्रा और उसका मूल्य
- श्रमिकों की संख्या और कार्य समाप्त होने में दिनों की संख्या
- चाल और समय जबकि तय की गई दूरी वही रहे।

प्र.8 समान मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य 18 रु. है। 72 रुपये में उसी मूल्य वाले कितने टिकट खरीदे जा सकते हैं?

प्र.9 एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है। 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी चलेगी?

प्र.10 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रु. है। 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए।

प्र.11 एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। उसी प्रकार 2×10^3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा?

प्र.12 एक साइकिल चालक 3 घण्टे में 12 किमी. चलता है। कितने घण्टे में वह 20 किमी. की दूरी तय करेगा?

प्र.13 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है। 40 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए?

प्र.14 एक मजदूर को 13 दिनों के काम के लिए 806 रुपये मिलता है। यदि उसे 1798 रुपये मिले, तो बताइये कि उन्होंने कितने दिनों तक काम किया?

प्र.15 100 मीटर की दूरी तय करने में नम्रता 1225 कदम चलती हैं 2835 कदम चलने पर वह कितनी दूरी तय करेगी?

प्र.16 1000 रु. का सामान बेचने पर एक दलाल को 73 रु. कमीशन मिलता है। 100 रु. का सामान बेचने पर उसे कितना कमीशन मिलेगा?

प्र.17 यदि कागज के 500 पत्रों की मोटाई 3.5 सेमी है, जो उस कागज के 275 पत्रों की मोटाई ज्ञात कीजिए।

- प्र.18 एक व्यक्ति 1 मिनट में 180 शब्द पढ़ सकता है, तो 768 शब्द पढ़ने में उसे कितना समय लगेगा?
- प्र.19 सुनीता एक घंटे में 1080 शब्द टाइप करती है। इसके टाइप करने की दर शब्द प्रति मिनट में ज्ञात कीजिए।
- प्र.20 25 मजदूर एक सप्ताह में 7.5 किमी लम्बी सड़क बनाते हैं। कितने मजदूर एक सप्ताह में 10.2 किमी. लम्बी सड़क तैयार कर लेंगे?
- प्र.21 10 बोरी सीमेंट का वजन 4.50 क्विंटल है। ऐसी ही 35 बोरियों का वजन बताइये।
- प्र.22 एक कार 60 किमी. प्रति घण्टा की चाल से चलती है। नीचे दी गई सारणी में तय की गई दूरियाँ और समय अनुक्रमानुपाती विचरण में दिये गये हैं तो दूरी तथा समय का सही सम्बन्ध जोड़िए—

	दूरी (किमी.)	समय (घण्टे में)
(i)	120	(a) 3
(ii)	180	(b) 2
(iii)	210	(c) 4
(iv)	240	(d) $3\frac{1}{2}$

व्युत्क्रमानुपाती विचरण (INVERSE VARIATION)



दैनिक जीवन में हम कुछ स्थानों पर यह देखते हैं कि एक राशि के बढ़ने



से दूसरी राशि एक स्थिर अनुपात में घटने लगती है अथवा पहली राशि के घटने से दूसरी राशि एक स्थिर अनुपात में बढ़ने लगती है। इस प्रकार के आनुपातिक सम्बन्धों को व्युत्क्रमानुपात कहते हैं।

आइए, एक उदाहरण देखें—

एक सड़क पर मिट्टी डालने के काम को पूरा करने के लिए आवश्यक मजदूरों और दिनों की संख्या नीचे सारणी में दी हुई हैं—

मजदूरों की संख्या (x)	5	10	15	20	30
दिनों की संख्या (y)	60	30	20	15	10

ऊपर सारणी में मजदूरों की संख्या (x) है तथा दिनों की संख्या (y) है क्या आप प्रत्येक x के लिए दिए गए y के मध्य कोई सम्बन्ध प्राप्त कर सकते हैं? जो x, y के प्रत्येक मान के लिए स्थिर है।

उदाहरण को देखकर आशु सोच रही थी कि मजदूरों की संख्या दुगुनी होने पर दिनों की संख्या आधी हो गई तथा आगे मजदूरों की संख्या तीन गुनी हो जाने पर दिनों की संख्या $1/3$ गुनी हो गई। उसी प्रकार मजदूरों की संख्या यदि 10 गुनी कर दी जाए तो दिनों की संख्या $1/10$ गुनी हो जायेगी। यदि x और y के मानों को गुणा किया जाए तो एक स्थिरांक प्राप्त होगा।

जिस प्रकार अनुक्रमानुपाती सम्बन्ध में $\frac{x}{y}$ या $x:y$ स्थिरांक होता है उसी प्रकार यहाँ $x \times y$ या $\frac{x}{1/y}$ या $x:\frac{1}{y}$ स्थिरांक होता है। जो कि अनुक्रमानुपात का व्युत्क्रम है इसलिए हम इसे व्युत्क्रमानुपात कहते हैं।

क्या आप आशु से सहमत हैं? यहाँ हम पाते हैं कि मजदूरों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ती है, ठीक उसके उल्टे या विपरीत अनुपात में दिनों की संख्या घटती है और जिस अनुपात में मजदूरों की संख्या घटती है, ठीक उसके उल्टे या विपरीत अनुपात में दिनों की संख्या बढ़ती है। ऐसे अनुपात को विलोम अनुपात या **व्युत्क्रमानुपात** कहते हैं। जैसे उपरोक्त उदाहरण में मजदूरों की संख्या और दिनों की संख्या में व्युत्क्रमानुपात है।

अर्थात् दोनों राशियों में विचरण व्युत्क्रम अनुपात में है।



क्रियाकलाप-4

एक यात्री गाड़ी 12 किमी./घण्टा की चाल से चलकर कोई दूरी 4 घण्टे में तय करती है। बताइए—

- चाल बढ़ाकर 24 किमी./घण्टा कर देने से उस दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा?
- चाल बढ़ाकर 36 किमी./घण्टा कर देने से उस दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा?

साथ ही निम्नांकित सारणी को भी पूर्ण करें—

चाल (किमी./घण्टा में)	12	24	36	48
क्रमशः बढ़ाने पर				
समय (घण्टे में)	4			
चाल $\times$ समय = दूरी	48	48	48	48

निष्कर्ष : चाल बढ़ाने पर समय लगता है।

चाल किमी प्रतिघंटा में क्रमशः कम करने पर	48	32	16	6
समय (घंटे में)	1			
चाल $\times$ समय = दूरी	48			

निष्कर्ष— चाल होने पर समय अधिक लगता है।

आप भी दैनिक जीवन से संबंधित ऐसे पांच उदाहरण लिखिए, जो परस्पर व्युत्क्रम अनुपात में हों।

आइए, एक और उदाहरण देखें— प्रतिदिन 16 पृष्ठ पढ़ने पर एक पुस्तक 15 दिनों में पूर्णतः पढ़ी जा सकती है। यदि प्रतिदिन 8 पृष्ठ पढ़ें, तो पुस्तक को पूर्णतः पढ़ने में कितने दिन लगेंगे? यदि 12, 15 तथा 24 पृष्ठ प्रतिदिन पढ़ें तो पुस्तक को कितने दिनों में पढ़ा जा सकता है।

यदि प्रतिदिन पढ़े गये पृष्ठों की संख्या x तथा पढ़ने में लगे संगत दिनों की संख्या y से व्यक्त करें, तो हल करने से प्राप्त उत्तरों को निम्नानुसार सारणी में लिखा जा सकता है—

पृष्ठों की संख्या (x)	16	8	12	15	24
दिनों की संख्या (y)	15	30	20	16	10

$$\text{यहाँ } \frac{1}{y} = \frac{1}{15} = \frac{1}{30} = \frac{1}{20} = \frac{1}{16} = \frac{1}{10}$$

$$x: \frac{1}{y} = \frac{x}{\frac{1}{y}} = \frac{16}{\frac{1}{15}} = \frac{8}{\frac{1}{30}} = \frac{12}{\frac{1}{20}} = \frac{15}{\frac{1}{16}} = \frac{24}{\frac{1}{10}}$$

$$\text{मानक रूप में } x \times y = 16 \times 15 = 8 \times 30 = 12 \times 20 = 15 \times 16 = 24 \times 10 \\ = 240 \quad = 240 \quad = 240 \quad = 240 \quad = 240$$

$$x: \frac{1}{y} = \frac{x}{\frac{1}{y}} = xy = 240 = k \text{ (माना)}$$

यहाँ पृष्ठों की संख्या, दिनों की संख्या के व्युत्क्रम अनुपात में है। चूँकि पृष्ठों की संख्या के प्रत्येक मान के लिए आवश्यक दिनों की संख्या के मध्य व्युत्क्रम अनुपाती संबंध हर जगह एक स्थिर मान देता है। इसलिए पृष्ठों की संख्या के सभी दिनों की संख्याओं के संगत मानों के व्युत्क्रम समानुपाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पृष्ठों की संख्या x और संगत दिनों की संख्या y का गुणनफल एक नियत राशि है अर्थात् $xy=k$

अब यदि xy के एक से अधिक मान k के बराबर हैं तो वे आपस में भी बराबर होंगे
 $x_1 y_1 = x_2 y_2$

निष्कर्ष: हम पाते हैं कि “जब दो चर राशियों में परस्पर इस प्रकार का संबंध हो कि उनमें से एक राशि का मान बढ़ाने से दूसरी राशि का मान कम हो या पहली राशि का मान कम करने से दूसरी राशि का मान बढ़ता है तथा प्रत्येक स्थिति में दोनों राशियों का गुणनफल नियत रहे, तो उनके बीच के सम्बन्ध को व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं।”

गणितीय रूप में, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तो $xy = k$

यदि x के दो मान x_1 एवं x_2 के लिए y के दो संगत मान y_1 एवं y_2 हो तो $x_1y_1 = x_2y_2$

क्रियाकलाप-5

नीचे दी गई किन सारणियों में x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है—

(i)

x	6	2	3	18
y	3	9	6	1

(ii)

x	40	20	16	10	2.5
y	2	4	5	8	32

(iii)

x	10	5	2	4
y	3	6	15	8

(iv)

x	9	10	12	15
y	5	4.5	3.75	3

क्रियाकलाप-6

यदि x और y व्युत्क्रमानुपात में विचरण करते हैं, तो निम्नांकित सारणी में आवश्यकतानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

(i)

x	9	18	20	---	30
y	4	---	---	1.5	----

(ii)

x	16	8	--	---
y	3	---	12	24

(iii)

x	20	50	25	----
y	---	4	----	5

आइए, व्युत्क्रमानुपाती विचरण के कुछ उदाहरणों को देखें—

उदाहरण 6. 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिनों में बना लेंगे?

हल चूंकि मजदूरों की संख्या बढ़ाने से काम पूरा होने में कम समय लगेगा, अतः यहाँ व्युत्क्रमानुपाती विचरण की स्थिति है।

माना कि 20 मजदूर उस दीवार को y दिनों में बना लेंगे। तो सारणी इस प्रकार होगी—

मजदूरों की संख्या(x)	12	20
दिनों की संख्या (y)	10	y

व्युत्क्रमानुपाती विचरण में—

$$\begin{aligned}
 x_1 y_1 &= x_2 y_2 \\
 12 \times 10 &= 20 \times y \\
 \Rightarrow \frac{12 \times 10}{20} &= y \\
 \Rightarrow 6 &= y \\
 \Rightarrow y &= 6
 \end{aligned}$$

अर्थात् 20 मजदूर उस दीवार को 6 दिन में बना लेंगे।

उदाहरण 7. एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 24 दिन की खाद्य सामग्री है। यदि छात्रावास में 100 छात्र और शामिल हो जाएँ, तो खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी?

हल 100 छात्रों के और शामिल हो जाने से छात्रावास में छात्रों की संख्या = $200 + 100 = 300$ चूंकि खाद्य सामग्री निश्चित है और छात्रों की संख्या बढ़ने से खाद्य सामग्री कम समय में समाप्त हो जाएगी, अतः यहाँ व्युत्क्रमानुपाती सम्बन्ध है।

माना कि खाद्य सामग्री y दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो सारणी इस प्रकार होगी—

छात्रों की संख्या (x)	200	300
दिनों की संख्या (y)	24	y

व्युत्क्रमानुपाती विचरण में —

$$\begin{aligned}
 x_1 y_1 &= x_2 y_2 \\
 \therefore 200 \times 24 &= 300 \times y \\
 \text{या } \frac{200 \times 24}{300} &= y \\
 \text{या } 16 &= y \Rightarrow y = 16
 \end{aligned}$$

अर्थात् खाद्य सामग्री 16 दिनों में समाप्त हो जायेगी।

उदाहरण 8. शालू 12 किमी/घण्टा की औसत चाल से साइकिल चलाकर घर से स्कूल जाती है। वह 20 मिनट में स्कूल पहुँच जाती है। यदि वह 15 मिनट में स्कूल पहुँचना चाहे, तो उसकी औसत चाल क्या होनी चाहिए?

हल: चूंकि कम समय में स्कूल पहुँचने के लिए चाल बढ़ानी होगी, अतः यहाँ व्युत्क्रमानुपाती विचरण की स्थिति है।

माना कि अभीष्ट औसत चाल x किमी/घण्टा है।

तो यहाँ सारणी इस प्रकार होगी—

चाल (किमी./घण्टा में) (x)	12	x
समय (मिनटों में) (y)	20	15

व्युत्क्रमानुपाती विचरण में—

$$x_1 y_1 = x_2 y_2$$

$$\text{या } 12 \times 20 = x \times 15$$

$$\text{या } \frac{12 \times 20}{15} = x$$

$$\text{या } 16 = x$$

$$\therefore x = 16 \text{ किमी/घण्टा}$$

अर्थात् 15 मिनट में स्कूल पहुँचने के लिए शालू की औसत चाल 16 किमी/घण्टा होनी चाहिए।

प्रश्नावली 7.2

- यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हों, तो आवश्यकतानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

x	8	6	4	-----	36
y	9	12	-----	10	----

- निम्नांकित विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

चाल (किमी/घण्टा में)	4	8			64
लगा समय (मिनटों में)		40	20	10	

- 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं। उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे?
- 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं, तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे?

5. एक बस 30 किमी/घण्टा की चाल से 6 घण्टे में एक निश्चित दूरी तय करती है। उसी दूरी को वह बस किस चाल से केवल 4 घण्टे में तय कर लेगी?
6. 40 घोड़े एक क्विंटल चने को 7 दिनों में खाते हैं। कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिनों में खायेंगे?
7. एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जायें तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी?
8. एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों की पर्याप्त खाद्य सामग्री है। किन्तु कुछ और सैनिकों के आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिनों में समाप्त हो जाती है। बताइये कि बाद में छावनी में और कितने सैनिक आये?
9. एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिनों में पूरा पढ़ लेता है। यदि वह प्रतिदिन 12 पृष्ठ पढ़े तो तो पूरे पुस्तक को वह कितने दिनों में पढ़ लेगा?
10. एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों की रसद सामग्री है। यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाये, तो रसद सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जायेगी?
11. निम्नलिखित में से कौन-कौन सी व्युत्क्रमानुपात में विचरण करती है?
 - (i) खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत।
 - (ii) बस द्वारा तय की गई दूरी और खपत पेट्रोल की कीमत।
 - (iii) साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल।
 - (iv) एक पुल बनाने में लगाये गये मजदूरों की संख्या और पुल बनने में लगने वाला समय।
 - (v) छात्रों की संख्या और प्रतिछात्र वितरित मिठाई का वजन। (यदि 40 किग्रा. मिठाई बाटनी है)।
 - (vi) मजदूरी और कार्य के घण्टे।
 - (vii) वस्तुओं की संख्या और उनका कुल मूल्य।
12. 26 जनवरी को एक विद्यालय के 800 छात्रों में 100 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से मिठाई बांटी गई। उतनी ही मिठाई यदि 1000 छात्रों में बराबर-बराबर बांटी जाये, तो प्रत्येक छात्र को कितने ग्राम मिठाई मिलेगी?
13. जब एक नल एक घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक पानी टंकी को भरने में 10 घण्टे का समय लगता है। यदि उसी टंकी को दूसरे नल से 8 घण्टे में भरा गया हो, तो दूसरे नल ने प्रतिघंटा कितना पानी भरा?

हमने सीखा

1. जब दो चर राशियाँ इस प्रकार संबंधित हो कि एक चर का मान बढ़ने या घटने से दूसरे चर का मान भी उसी अनुपात में बढ़ या घट जाता है, तो वे अनुक्रमानुपाती कहलाती हैं।
2. जब दो चर राशियों x और y अनुक्रमानुपात में होती हैं तो उनका अनुपात एक स्थिरांक होता है अर्थात् $\frac{x}{y} = k$
3. यदि दो राशियाँ अनुक्रमानुपात में हों तथा एक राशि के दो मानों x_1 और x_2 के लिए दूसरी राशि के संगत मान क्रमशः y_1 एवं y_2 हों तो $\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2}$
4. जब दो चर राशियाँ इस प्रकार संबंधित हों कि एक चर का मान बढ़ने (या घटने से) दूसरे चर के मान में उसी अनुपात में कमी (वृद्धि) हो तो राशियाँ व्युत्क्रमानुपात में होती हैं।
5. जब दो राशियाँ x और y व्युत्क्रमानुपात में होती हैं तो उनका गुणनफल एक स्थिरांक होता है, अर्थात् $x \cdot y = k$ जहाँ k एक स्थिरांक है।
6. यदि दो राशियाँ व्युत्क्रमानुपात में हों तथा एक राशि के दो मानों x_1 और x_2 के लिए दूसरी राशि के संगत मान क्रमशः y_1 और y_2 हो तो

$$x_1 \times y_1 = x_2 \times y_2$$



अध्याय-8

बीजीय व्यंजकों के गुणनखण्ड एवं गुणनखण्डन (FACTORS & FACTORIZATION OF ALGEBRAIC EXPRESSIONS)



भूमिका (Introduction)

एक शिक्षिका गणतंत्र दिवस के अवसर पर कक्षा 8 वीं के छात्रों को टॉफियाँ बाँट रही थीं। उनकी थैली में 60 टॉफियाँ थीं। सभी छात्रों का ध्यान इस ओर लगा था कि किसी को ज्यादा न मिले और सारी टॉफियाँ बाँट भी जावें। तभी लता ने सोचना शुरू किया हमारी कक्षा में 10 छात्र हैं प्रत्येक छात्र को 6 टॉफियाँ मिलेंगी और शेष कुछ नहीं बचेगा। यदि कक्षा में 15 छात्र होते तब प्रत्येक को 4 टॉफियाँ मिलतीं। लता ने अपनी कॉपी निकालकर हिसाब लिखना शुरू किया कि कितने छात्र हों तो 60 टॉफियों को इस प्रकार बराबर-बराबर बाँटा जा सकता है कि कोई टॉफी शेष न बचे।

उसने देखा कि 60 टॉफियों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 एवं 60 बच्चों में बाँटा जाए तो कोई भी टॉफी शेष नहीं बचेगी।

रमा, जो बहुत देर से लता की इस उधेड़बुन को देख रही थी, ने लता को बताया कि ऊपर लिखी गई सभी संख्याओं का 60 में पूरा-पूरा भाग जाता है, अतः ये सभी संख्याएँ 60 के गुणनखण्ड (factors) हैं। इसे सर्व सम्भव गुणनखण्ड भी कहते हैं।

आखिर कितने गुणनखण्ड (How many multiple factor ?)

उसी समय उमेश ने लता से पूछा कि क्या इसी तरह बीजीय व्यंजक $5ab$ के गुणनखण्ड (Factors) निकाले जा सकते हैं। लता ने लिखकर बताया कि $5ab$ में 5, a एवं b का पूरा-पूरा भाग जाता है। रमा भी यह सुन रही थी उसने बताया कि पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक संख्या 1 व स्वयं से पूरी-पूरी विभाजित होती है अतः 1 और $5ab$ भी $5ab$ के गुणनखण्ड होंगे तथा $5a$ एवं $5b$ से भी $5ab$ पूरी विभाजित होती है। इस प्रकार

$5ab$ के गुणनखण्ड = 1, 5, a , b , $5a$, $5b$ व $5ab$ होंगे।

रेखा ने कहा "तुमने एक गुणनखण्ड छोड़ दिया है।" सब सोचने लगे कौनसा, तभी रमेश बोला हाँ, ab भी तो एक गुणनखण्ड होगा। इस प्रकार $5ab$ के गुणनखण्ड बने 1, 5, a , b , ab , $5a$, $5b$ व $5ab$

रमा ने कहा चलो, हम सब गुणनखण्ड निकालने का खेल खेलें। रोहित ने अपनी कॉपी में $12x^2$ के गुणनखण्ड लिखकर बताए कि $12x^2$ के गुणनखण्ड = 1, 2, 3, 4, 6, $2x^2$, $3x^2$, $4x^2$, $6x^2$, $12x^2$ होंगे।

रमा ने रोहित को बताया कि अभी भी $12x^2$ के सभी गुणनखण्ड नहीं लिखे गये हैं। रमा

ने पहले गुणांकों के, तत्पश्चात् बीजांकों के गुणनखण्ड लिखकर $12x^2$ के सम्पूर्ण गुणनखण्ड इस प्रकार लिखे।

12 के गुणनखण्ड = 1, 2, 3, 4, 6 एवं 12

x^2 का गुणनखण्ड = 1, x , x^2

अतः $12x^2$ के सभी गुणनखण्ड = 1, 2, 3, 4, 6, 12, x , $2x$, $3x$, $4x$, $6x$, $12x$, x^2 , $2x^2$, $3x^2$, $4x^2$, $6x^2$ एवं $12x^2$

सभी गुणनखण्ड कैसे पहचानें (How to recognize all the factors ?)

रोहित ने कहा – ठीक है परन्तु किसी एक पदीय बीजीय व्यंजक के इतने सारे गुणनखण्डों को लिखने का कोई तरीका तो होगा जिससे यह पता चल सके कि सभी गुणनखण्डों को लिखा गया है।

लता ने कहा – “चलो गणित की शिक्षिका से पूछें और उनसे रमा के द्वारा निकाले गए $12x^2$ के गुणनखण्डों की जाँच भी करवा लें।”

शिक्षिका ने कहा : $12x^2$ के सभी गुणनखण्डों को आपने लिख लिया है और इस प्रकार के व्यंजकों के सभी गुणनखण्डों को लिखने के लिए स्थिरांक के गुणनखण्डों को आड़ी पंक्ति में लिखें तथा चरांक के सभी गुणनखण्डों को खड़े स्तंभों में लिखें। इस प्रकार हमें एक गुणन तालिका प्राप्त होगी। इस तालिका को भरने पर एक पदीय बीजीय व्यंजक (monomial) के सभी गुणनखण्ड प्राप्त हो जाएंगे। शिक्षिका ने गुणनखण्डों को इस प्रकार तालिकाबद्ध किया।

सारणी 8.1 (Table 8.1)

$\times$	1	2	3	4	6	12
1	1	2	3	4	6	12
x	x	$2x$	$3x$	$4x$	$6x$	$12x$
x^2	x^2	$2x^2$	$3x^2$	$4x^2$	$6x^2$	$12x^2$

शिक्षिका ने छात्रों से पूछा कि क्या तालिका में लिखे गये सभी व्यंजकों का पूरा-पूरा भाग $12x^2$ में जाता है? आप भी जाँच कीजिए कि क्या तालिका में रमा द्वारा लिखे गये सभी गुणनखण्ड आ गए हैं?

कुछ और उदाहरण (Some more example)

शिक्षिका ने लता से $10ab^2$ के गुणनखण्ड ऊपर बताए गए तरीके से निकालने के लिए कहा। लता ने बोर्ड पर निम्नानुसार $10ab^2$ के गुणनखण्ड की तालिका बनाई और सभी छात्रों से जाँच करने को कहा।

10 के गुणनखण्ड = 1, 2, 5, 10

ab^2 के गुणनखण्ड = 1, a, b, b^2 , ab, ab^2

अतः 10 ab^2 के सभी संभावित गुणनखण्ड

सारणी 8.2

$\times$	1	2	5	10
1	1	2	5	10
a	a	2a	5a	10a
b	b	2b	5b	10b
b^2	b^2	$2b^2$	$5b^2$	$10b^2$
ab	ab	2ab	5ab	10ab
ab^2	ab^2	$2ab^2$	$5ab^2$	$10ab^2$

तालिका में लिखे गये प्रत्येक व्यंजक का पूरा-पूरा भाग $10ab^2$ में जाता है और शून्य बचता है। अब छात्रों को एक तरीका मिल गया जिससे वे सभी एकपदीय बीजीय व्यंजकों के गुणनखण्ड ज्ञात कर सकते थे।



क्रियाकलाप 1.(Activity 1)

आप भी अपनी कॉपी में उपरोक्त सारणी के अनुसार नीचे दिये गये बीजीय व्यंजकों के गुणनखण्ड लिखिए।

$8x$, $4a^2$, $6ab$, xy , $3x^2y$, $6y^2$

समान गुणनखण्ड पहचानें (Identify the similar common factors)

रोहित द्वारा लिखे गए $6ab$ के गुणनखण्ड को शिक्षिका ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा।

$6ab$ के गुणनखण्ड हैं = 1, 2, 3, 6, a, 2a, 3a, 6a, b, 2b, 3b, 6b, ab, 2ab, 3ab, 6ab

राजेश द्वारा लिखे गए $4a^2$ के गुणनखण्ड को शिक्षिका ने $6ab$ के गुणनखण्ड के नीचे लिखा।

$4a^2$ के गुणनखण्ड = 1, 2, 4, a, 2a, a^2 , $2a^2$, $4a^2$

अब शिक्षिका ने पूछा कि क्या दोनों व्यंजकों के गुणनखण्डों में कोई समानता है? रमा ने बताया कि $6ab$ एवं $4a^2$ के गुणनखण्डों की कुल संख्या तो अलग-अलग है परन्तु कुछ गुणनखण्ड दोनों में एक समान हैं। ये उभयनिष्ठ गुणनखण्ड (common factor) 1, 2, a, 2a हैं।

शिक्षिका ने कहा बिल्कुल ठीक और इनमें से सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखण्ड 2a है। जैसा तुम जानते हो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखण्ड ही महत्तम समापवर्तक होता है अतः इसे $6ab$ और $4a^2$ का महत्तम समापवर्तक (Highest Common Factor) कहते हैं।

दो या दो से अधिक एकपदीय बीजीय व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक वह बड़े से बड़ा

व्यंजक है जिसका दिए गए सभी बीजीय व्यंजकों में पूरा-पूरा भाग चला जाता है।

अब शिक्षिका ने $3x y$ एवं $6y^2$ के सभी गुणनखण्डों को ब्लैक बोर्ड पर लिखा तथा प्रवीण से उभयनिष्ठ गुणनखण्डों को छांट कर लिखने कहा।

$$3x y \text{ के गुणनखण्ड} = \textcircled{1}, \textcircled{3}, x, 3x, x^2, 3x^2, \textcircled{y}, \textcircled{3y}, xy, 3xy, x^2y, 3x^2y$$

$$6y^2 \text{ के गुणनखण्ड} = \textcircled{1}, 2, \textcircled{3}, 6, \textcircled{y}, 2y, \textcircled{3y}, 6y, y^2, 2y^2, 3y^2, 6y^2$$

प्रवीण ने उभयनिष्ठ गुणनखण्डों को छांट कर लिखा $= 1, 3, y, 3y$

अब महत्तम समापवर्तक पूछे जाने पर सभी ने पहचान लिया कि महत्तम समापवर्तक $3y$ है।

एक और तरीका (Another method)

यह विधि छात्रों को कुछ बड़ी लग रही थी। रमा ने शिक्षिका से पूछा कि दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक निकालने की क्या कोई संक्षिप्त विधि नहीं है शिक्षिका ने कहा है, जरा इसे देखो :

माना हमें $6x^2y$ एवं $8xy^2$ का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो

सर्वप्रथम गुणांकों (Coefficients) 6 एवं 8 का म.स. $= 2$

x एवं x^2 का म.स. $= x$ (x का न्यूनतम घात वाला पद)

y एवं y^2 का म.स. $= y$ (y का न्यूनतम घात वाला पद)

अतः $6x y$ एवं $8xy$ का म.स. $= 2xy$ (ऊपर निकाले गए सभी म.स. का गुणनफल)

उदाहरण 1. $12s^3t^2u^3$ एवं $16s^4tu^2$ का म.स. ज्ञात कीजिए।

हल²: 12 एवं 16 का म.स. $= 4$

s^3 एवं s^4 का म.स. $= s^3$

t^2 एवं t का म.स. $= t$

u^3 एवं u^2 का म.स. $= u^2$

अतः $12s^3t^2u^3$ एवं $16s^4tu^2$ का म.स. $= 4s^3tu^2$

उदाहरण 2 $20a^2b$ एवं ab^3c का म.स. ज्ञात कीजिए।

हल : यहां बीजीय व्यंजकों के गुणांक क्रमशः 20 एवं 1 है।

20 एवं 1 का म.स. $= 1$

a^2 एवं a का म.स. $= a$

b एवं b^3 का म.स. $= b$

यहाँ c केवल दूसरे पद में है पहले पद में c नहीं है।

अतः $20a^2b$ एवं ab^3c का म.स. = $1 ab = ab$

प्रश्नावली 8.1 (Exercise 8.1)

3

- निम्न व्यंजकों के सभी गुणनखण्डों को लिखिए :-
 - $5t^2$
 - $7x y$
 - $14 l^2m$
 - $39 lmn$
- निम्न व्यंजकों के सभी संभावित गुणनखण्ड लिखकर म.स. ज्ञात कीजिए।
 - $5s, 2s^2$
 - $9m^2, 3t$
 - $6a^2, 8ab$
 - $7m^3, 6m$
- निम्न व्यंजकों का म.स. ज्ञात कीजिए।
 - $6m^2l, 12ml^3$
 - $24a^2bc, 20bc^2$
 - $xy z, 10x^2y$
 - $14x^3y, 21$
 - $22p^2q^2r, 33pq^2r^2$
 - $3xy, 23x^2z$
 - $6pqr, 23xyz$

द्विपदीय व्यंजक के गुणनखण्ड (Factors of binomials)

एकपदीय व्यंजकों के गुणनखण्ड ज्ञात करना तो आपने सीख लिया है। क्या आप अपने अनुभवों के आधार पर किसी द्विपदीय व्यंजक (Binomial) के गुणनखण्ड ज्ञात कर सकते हैं?

जैसे, यदि किसी कक्षा के लड़कों की संख्या के तीन गुने में लड़कियों की संख्या के तीन गुने को जोड़ दिया जाये तो योगफल क्या प्राप्त होगा? क्या यह योगफल लड़के एवं लड़कियों की संख्या के योग के तीन गुने के बराबर होगा? लड़कों एवं लड़कियों की संख्या आप अपनी इच्छानुसार रखकर उत्तर की जाँच कीजिए। माना लड़कों की संख्या 15 है और लड़कियों की संख्या 18 है। लड़कों की संख्या का तीन गुना हुआ 45, इसी तरह से लड़कियों की संख्या का 3 गुना हुआ 54 और यह कुल मिलाकर 99 हुआ। जबकि लड़के और लड़कियों की संख्या जोड़ने पर 33 प्राप्त हुआ। जिसका 3 गुना भी 99 है।

अर्थात् यदि लड़कों की संख्या को x एवं लड़कियों की संख्या को y मान लिया जावे तो लड़कों की संख्या का तीन गुना $3x$ और लड़कियों की संख्या का तीन गुना $3y$ होगा। दोनों का योगफल $3x + 3y$ प्राप्त होगा।

लड़के एवं लड़कियों की संख्या का योग $x + y$ है। इसका तीन गुना $3(x + y)$ प्राप्त होगा।

और $3(x + y) = 3x + 3y$ होता है।

यहाँ $3x$ $3y$ दोनों में 3 उभयनिष्ठ है।

इसी प्रकार आइए $9 + 3y$ पर विचार करें।

यहाँ 9 एवं $3y$ दोनों में गुणनखंड 3 उभयनिष्ठ है।

अतः $9 + 3y = 3 \times 3 + 3 \times y$

$$= 3(3 + y)$$

इस प्रकार ऊपर $3x + 3y$ के गुणनखण्ड 3 ($x + y$) एवं $3x + 3y$ है, परन्तु 3 तथा ($x + y$) ऐसे गुणनखण्ड हैं जिनका गुणनफल $3x + 3y$ के बराबर है। इसी प्रकार $9 + 3y$ के गुणनखण्ड 3 एवं ($3 + y$) एवं $9 + 3y$ है परन्तु 3 तथा ($3 + y$) दो ऐसे गुणनखण्ड हैं जिनका गुणनफल $9 + 3y$ के बराबर है।

इसे भी करके देखें (Do this also)

क्या आप $12 + 18y$ को दो गुणनखण्डों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं?

यहाँ 12 एवं $18y$ के गुणनखण्ड में 2, 3 एवं 6 उभयनिष्ठ हैं।

- 2 उभयनिष्ठ लेने पर $12 + 18y = 2 \times 6 + 2 \times 9y = 2(6 + 9y)$ है। परन्तु यहाँ $6 + 9y$ में से पुनः 3 उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है अतः

$$12 + 18y = 2 \{3(2 + 3y)\} \text{ या}$$

$$12 + 18y = 6(2 + 3y)$$

- $12 + 18y$ में पहले यदि 3 उभयनिष्ठ है तो

$$12 + 18y = 3(4 + 6y) \quad (\text{परन्तु यहाँ } 4 + 6y \text{ में पुनः 2 उभयनिष्ठ है अतः})$$

$$12 + 18y = 3 \{2(2 + 3y)\}$$

$$= 6(2 + 3y)$$

- यदि $12 + 18y$ में 6 को उभयनिष्ठ लेवें तो

$$12 + 18y = 6 \times 2 + 6 \times 3y$$

$$= 6(2 + 3y)$$

यहाँ $12 + 18y$ में 2, 3 एवं 6 उभयनिष्ठ गुणनखण्ड हैं परन्तु 6 सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखण्ड है।



क्रियाकलाप 2. (Activity 2)

नीचे दिए गए द्विपदीय व्यंजकों का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखण्ड निकालकर सारणी में दिए गए उदाहरणों के अनुसार तालिका में पूर्ति कीजिए।

सारणी 8.3

क्र.स.	द्विपदीय व्यंजक	दोनों पदों को अलग-अलग लिखने पर	दोनों पदों का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखण्ड	द्विपदीय व्यंजक को उभयनिष्ठ गुणनखण्ड के गुणक के रूप में लिखने पर
1.	$36x + 27y$	$36x$ और $27y$	9	$9(4x + 3y)$
2.	$33y^2 - 11xy$			
3.	$15xz + 90x^2$			
4.	$8ab + 9ac$			

ऐसे और भी सवाल बनाइए तथा अपने साथियों को हल करने को दें।

गुणनखण्डन (Factorization)

द्विपदीय (Binomial) एवं बहुपदीय व्यंजक (Polynomial) को उभयनिष्ठ गुणनखण्ड के गुणक के रूप में लिखने के लिए, दिए गए द्विपदीय या बहुपदीय व्यंजक के प्रत्येक पद के सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणनखण्ड (म.स.) को कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। इस प्रकार किसी व्यंजक को उसके गुणनखण्डों के गुणनफल के रूप में लिखने को गुणनखण्डन (Factorization) कहते हैं।

जैसे $2ab + 2ac$ में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखण्ड $2a$ है।

$$2ab + 2ac = 2axb + 2axc = 2a(b + c)$$

इस प्रकार $2ab + 2ac$ का गुणनखण्डन करने पर $2a$ व $(b + c)$ प्राप्त होंगे, जिनका गुणनफल $2ab + 2ac$ होगा।

उदाहरण 3. $4x^2y^2 - 18xy$ का गुणनखण्डन कीजिए।

हल : यहां $4x^2y^2 - 18xy$ का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखण्ड $2xy$ है।

$$\begin{aligned} 4x^2y^2 - 18xy &= 2xy \times 2xy - 2xy \times 9 \\ &= 2xy(2xy - 9) \end{aligned}$$

उदाहरण 4. $6ab^2 + 9a^2b^3 + 12a^2b^2$ का गुणनखण्डन कीजिए।

हल : यहां $6ab^2$, $9a^2b^3$ तथा $12a^2b^2$ का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखण्ड $3ab^2$ है।

$$\begin{aligned} 6ab^2 + 9a^2b^3 + 12a^2b^2 &= 3ab^2 \times 2 + 3ab^2 \times 3ab + 3ab^2 \times 4a \\ &= 3ab^2(2 + 3ab + 4a) \end{aligned}$$

बहुपदीय व्यंजकों का गुणनखण्डन (Factorization of polynomials)

रमा द्विपदीय व्यंजकों का गुणनखण्डन करना सीख गई थी। वह सोच रही थी कि उन बीजीय व्यंजकों का गुणनखण्ड किस प्रकार ज्ञात करेंगे जिसमें कई पद हों?

क्या आपके पास रमा के सवाल का जवाब है?

शिक्षिका ने बताया : ऐसे बीजीय व्यंजकों का गुणनखण्डन करने के लिए समूहीकरण की क्रिया अपनाते हैं। व्यंजकों के उपयुक्त समूह बनाकर, उभयनिष्ठ गुणनखण्ड ज्ञात करते हैं। इसके बाद इन्हें गुणनखण्डों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है।

जैसे :— $ax + by + ay + bx$ का गुणनखण्डन कीजिए।

यहाँ a वाले पदों को व b वाले पदों को एक साथ करना उचित रहेगा।

a वाले पदों एवं b वाले पदों को एक साथ लिखने पर

$$= ax + ay + bx + by$$

$$= a(x + y) + b(x + y) \text{ [यहाँ } (x + y) \text{ दोनों पदों में उभयनिष्ठ है।]}$$

$$= (x + y)(a + b)$$

इसी प्रश्न को x वाले पदों एवं y वाले पदों को एक साथ लिखकर भी गुणनखण्डन किया जा सकता है। इसे आप स्वयं हल करके देखिए। क्या दोनों में उत्तर एक ही आया?

उदाहरण 5. $2x^2 - 6y + 4x^2y - 12y^2$ का गुणनखण्डन कीजिए।

हल : $2x^2 - 6y + 4x^2y - 12y^2$ में

$2x^2$ व $4x^2y$ को एक साथ लेने से प्रक्रिया सबसे सरल होगी।

$2x^2 + 4x^2y$ में $2x^2$ उभयनिष्ठ है।

$$(2x^2 + 4x^2y) = 2x^2 (1 + 2y)$$

इसी प्रकार $-6y - 12y^2$ में उभयनिष्ठ $-6y$ लेने पर $-6y - 12y^2 = -6y (1 + 2y)$
 $(1 + 2y)$ दोनों में उभयनिष्ठ हैं।

अतः गुणनखण्ड बने $(1 + 2y) (2x^2 - 6y)$

परन्तु $(2x^2 - 6y)$ के भी गुणनखण्ड हो सकते हैं? इनमें 2 उभयनिष्ठ है। अतः इसके गुणनखण्ड बने 2 तथा $(x^2 - 3y)$

$$\text{अतः } 2x^2 - 6y + 4x^2y - 12y^2 = 2(x^2 - 3y) (1 + 2y)$$

उदाहरण 6. $2xy + y + 4x + 2$ के गुणनखण्डन कीजिए।

हल : $2xy + y + 4x + 2$

$$= y(2x + 1) + 2(2x + 1) \quad [(2x + 1) \text{ दोनों में उभयनिष्ठ है।}]$$

$$= (2x + 1) (y + 2)$$

इसी प्रश्न को पहले पद को तीसरे पद तथा दूसरे पद को चौथे पद के साथ लेकर हल कीजिए।

प्रश्नावली 8.2

प्रश्न 1 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :-

$$(a) \quad x^2 + 5x^3 = \dots\dots\dots (1 + 5x)$$

$$(b) \quad 10a^2 - 12b^2 = 2 (\dots\dots\dots - 6b^2)$$

$$(c) \quad 27ab^2 + 18abc = 9ab (3b + \dots\dots\dots)$$

$$(d) \quad 16xz - 9z^2 = z (\dots\dots\dots - \dots\dots\dots)$$

$$(e) \quad 12ab^2c + 8abc^2 - 10a^2c = 2ac [\dots\dots\dots + \dots\dots\dots - \dots\dots\dots]$$

प्रश्न 2 गुणनखण्डन कीजिए :-

$$(a) \quad 4ax + 6a^2y$$

$$(b) \quad a^5y + ab^3$$

(c) $pq^2r - 2q^2t$

(d) $-5lm^2 - 10l^2mn$

(e) $5m^2 - 5n^2$

प्रश्न 3 समूहीकरण विधि से गुणनखण्डन कीजिए :-

(a) $2x^2y + 6x^2y + 4x + 12y$

(b) $5m^2n - 10mn^2 + 12m - 24n$

(c) $6x^3 + 8x^2 + 9xy + 12y$

(d) $15x^4 + 10x^2y^2 + 12x^2y + 8y^3$

(e) $x(x + 3) + 8(x + 3)$

(f) $3x(x - 4) - 5(x - 4)$

(g) $2m(l - m) + 3(l - m)$

प्रश्न 4 निम्न को हल कीजिए -

(a) $x(1 - 3y^2) = \underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}}$

(b) $-17x^2(3x - 9) = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}$

(c) $2a^2(3a - 4a^2) = \underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}}$

(d) $9m(m - n) = \underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}}$

(e) $9t^2(t - 7t^3) = \underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}}$

हमने सीखा (We Have Learnt)

- यदि एक व्यंजक को दो या अधिक व्यंजकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए तो वे व्यंजक, दिए हुए व्यंजक के गुणनखण्ड कहलाते हैं तथा व्यंजक को इस तरह से व्यक्त करने का तरीका गुणनखण्डन कहलाता है।
- किसी द्विपदीय बीजीय व्यंजकों का गुणनखण्डन पदों के म.स. को उभयनिष्ठ निकालकर किया जाता है।
- बीजीय व्यंजकों का म.स. उन बीजीय व्यंजकों का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक होता है।
- तीन से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजकों का गुणनखण्डन समूहन विधि से करते हैं।





अध्याय — 9

सर्वसमिकाएं

IDENTITIES

सर्वसमिकाएं (Identities)

दो द्विपदीय व्यंजकों के गुणा से सम्बन्धित अभ्यास का हल करते हुए फातिमा ने सोचा कि अगर दोनों द्विपदीय व्यंजक के प्रथम एवं द्वितीय पद अलग अलग न हो कर एक ही हों तब क्या होगा? क्या उन्हें गुणा करने पर कोई नया परिणाम प्राप्त होगा ? जैसे यदि $x+y$ का गुणा $x+y$ के साथ किया जाए—

$$\begin{aligned}(x+y)(x+y) &= x(x+y) + y(x+y) = x^2 + xy + yx + y^2 \\ &= x^2 + xy + xy + y^2 \quad (\because xy = yx) \\ &= x^2 + 2xy + y^2\end{aligned}$$

फातिमा को गुणा करते देख अनु ने भी ऐसा ही गुणा किया—

$$\begin{aligned}(r+s)(r+s) &= r(r+s) + s(r+s) = r^2 + rs + sr + s^2 \\ &= r^2 + rs + rs + s^2 \quad (\because rs = sr) \\ &= r^2 + 2rs + s^2\end{aligned}$$

फातिमा और अनु के परिणाम कुछ मिलते—जुलते हैं। आप भी नीचे दिए गए द्विपदों का गुणा कर देखिए कि क्या आप को भी ऐसे ही परिणाम मिलते हैं ?

(1) $(p+q)(p+q) =$

(2) $(u+r)(u+r) =$

(3) $(m+n)(m+n) =$

(4) $(r+w)(r+w) =$

दो समान द्विपदीय व्यंजकों के गुणा से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? लिखिए।

आप ने देखा कि दो समान द्विपदों का गुणा करने पर प्राप्त गुणन फल = (प्रथम पद)² + 2 (प्रथम पद) (द्वितीय पद) + (द्वितीय पद)² होता है। $(a+b)(a+b) = a^2 + 2ab + b^2$
अर्थात् $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

अतः यह विशेष गुणन सम्बन्ध a एवं b के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। इसे सर्वसमिका कहते हैं।

सर्वसमिका—1 (Identity -1)

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

अर्थात्

$$[(\text{प्रथम पद}) + (\text{द्वितीय पद})]^2 = (\text{प्रथम पद})^2 + 2 (\text{प्रथम पद}) (\text{द्वितीय पद}) + (\text{द्वितीय पद})^2$$

इसे निम्न प्रकार से भी समझा जा सकता है—

×	a	b
a	a^2	ab
b	ab	b^2

$$(a+b)^2 = a^2 + ab + ab + b^2$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

a एवं b की जगह भिन्न-भिन्न संख्याओं को ले कर नियम की सत्यता की जांच कीजिए।

उदाहरण 1. $(3x + 4y)^2$ को सर्वसमिका की सहायता से हल कीजिए।

हल हम जानते हैं कि $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$(3x + 4y)^2$ की तुलना $(a+b)^2$ से करने पर $a = 3x$, $b = 4y$

$$\begin{aligned} \text{अतः } (3x + 4y)^2 &= (3x)^2 + 2(3x)(4y) + (4y)^2 \\ &= 9x^2 + 24xy + 16y^2 \end{aligned}$$

उदाहरण 2. $(2a + 3)^2$ को सर्वसमिका की सहायता से हल कीजिए।

हल हम जानते हैं कि $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

$(2a+3)^2$ से तुलना करने पर $x = 2a$, $y = 3$

$$\begin{aligned} (2a + 3)^2 &= (2a)^2 + 2(2a)(3) + (3)^2 \\ &= 4a^2 + 12a + 9 \end{aligned}$$

उदाहरण 3. $\left(\frac{1}{2}p + 2q\right)^2$ को सर्वसमिका की सहायता से हल कीजिए।

हल $\left(\frac{1}{2}p + 2q\right)^2$ की तुलना $(a + b)^2$ से करने पर $a = \frac{1}{2}p$, $b = 2q$

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2}p + 2q\right)^2 &= \left(\frac{1}{2}p\right)^2 + 2\left(\frac{1}{2}p\right)(2q) + (2q)^2 \quad \left[(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2\right] \\ &= \frac{1}{4}p^2 + 2pq + 4q^2 \end{aligned}$$

उदाहरण 4. 101^2 का मान ज्ञात कीजिए।

हल: यहां $101^2 = (100+1)^2$

अब $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ से तुलना करने पर

$$a = 100 \text{ एवं } b = 1$$

$$\begin{aligned} \text{अतः } 101^2 &= (100+1)^2 = 100^2 + 2(100)(1) + 1^2 \\ &= 10000 + 200 + 1 \\ &= 10201 \end{aligned}$$

अब यदि $a + b$ के स्थान पर $a - b$ लिया जाये तो क्या होगा?

$$(a-b)^2 = (a-b)(a-b)$$

$$\begin{aligned}
 &= a(a-b) - b(a-b) \\
 &= a^2 - ab - ba + b^2 \\
 &= a^2 - 2ab + b^2 \quad (\because ab = ba)
 \end{aligned}$$

सर्वसमिका-2

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

सारणी द्वारा

×	a	-b
a	a^2	$-ab$
-b	$-ba$	$(-b)^2$

अर्थात् $[(\text{प्रथम पद}) - (\text{द्वितीय पद})]^2 = (\text{प्रथम पद})^2 - 2(\text{प्रथम पद})(\text{द्वितीय पद}) + (\text{द्वितीय पद})^2$

क्या $(a-b)$ के स्थान पर $(p-q)$ या $(r-s)$ या कोई और इसी प्रकार के द्विपदीय व्यंजक लेने पर भी ऊपर की सर्वसमिका सत्य होगी? जाँच कीजिए।

उदाहरण 5. $(3x-8y)^2$ सर्वसमिका की सहायता से हल कीजिए।

हल: हम जानते हैं कि $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$(3x-8y)^2$ की तुलना $(a-b)^2$ से करने पर

$$a = 3x, b = 8y$$

$$\begin{aligned}
 (3x-8y)^2 &= (3x)^2 - 2(3x)(8y) + (8y)^2 \\
 &= 9x^2 - 48xy + 64y^2
 \end{aligned}$$

उदाहरण 6. $\left(x - \frac{2}{5}\right)^2$ को सर्वसमिका की सहायता से हल कीजिए।

हल: $\left(x - \frac{2}{5}\right)^2$ की तुलना $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ से करने पर

$$a = x, b = \frac{2}{5}$$

$$\begin{aligned}
 \left(x - \frac{2}{5}\right)^2 &= (x)^2 - 2(x)\left(\frac{2}{5}\right) + \left(\frac{2}{5}\right)^2 \\
 &= x^2 - \frac{4x}{5} + \frac{4}{25}
 \end{aligned}$$

उदाहरण 7. $(2x-3y)^2$ को सर्वसमिका की सहायता से हल कीजिए।

तथा $x = 4$ एवं $y = 2$ के लिए उत्तर की जाँच भी कीजिए।

हल: $(2x-3y)^2$ की तुलना $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ से करने पर

$$a = 2x, b = 3y$$

$$\begin{aligned}
 (2x-3y)^2 &= (2x)^2 - 2(2x)(3y) + (3y)^2 \\
 &= 4x^2 - 12xy + 9y^2
 \end{aligned}$$

जाँच –

बायाँ पक्ष $(2x - 3y)^2 = (2 \times 4 - 3 \times 2)^2 = (8 - 6)^2 = (2)^2 = 4$

दायाँ पक्ष $4x^2 - 12xy + 9y^2 = 4(4)^2 - 12(4)(2) + 9(2)^2$

$$= 64 - 96 + 36 = 100 - 96 = 4$$

बायाँ पक्ष = दायाँ पक्ष

उदाहरण 8. सर्वसमिका के उपयोग से 98^2 का मान ज्ञात कीजिए।

हल:— यहाँ $98^2 = (100-2)^2$

अब $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ से तुलना करने पर $a = 100, b = 2$

$$98^2 = (100-2)^2 = 100^2 - 2 \times 100 \times 2 + 2^2$$

$$= 10000 - 400 + 4$$

$$= 9604$$

सर्वसमिका-3

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

दो द्विपदीय व्यंजकों के प्रथम व द्वितीय व्यंजकों में यदि समान प्रथम पद समान चिन्ह के हों तथा समान द्वितीय पद विपरीत चिन्ह के हों तो क्या होगा? जैसे यदि $(a + b)$ का गुणा $(a - b)$ के साथ किया जाए।

$$(a + b)(a - b) = a(a - b) + b(a - b)$$

$$= a^2 - ab + ab - b^2 \quad (\because ab = ba)$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

अर्थात् (प्रथम पद + द्वितीय पद) (प्रथम पद - द्वितीय पद) = (प्रथम पद)² - (द्वितीय पद)²

सारणी द्वारा:—

×	a	b
a	a^2	ab
-b	-ab	$-b^2$

$$\begin{aligned} (a+b)(a-b) &= a^2 + ab - ab - b^2 \\ &= a^2 - b^2 \end{aligned}$$

अब $(p + q)$ को $(p - q)$ से, $(R + S)$ को $(R - S)$ से गुणा किया जाए तो क्या परिणाम ऊपर जैसे ही आएँगे? जाँच कीजिए—

उदाहरण 9. $(7x + 2y) \times (7x - 2y)$ को सर्वसमिका की सहायता से हल कीजिए।

हल: $(7x+2y)(7x-2y)$ की तुलना $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ से करने पर $a = 7x, b = 2y$

$$\text{अतः } (7x + 2y)(7x - 2y) = (7x)^2 - (2y)^2$$

$$= 49x^2 - 4y^2$$

उदाहरण 10. $\left(\frac{x}{3} + \frac{y}{5}\right)\left(\frac{x}{3} - \frac{y}{5}\right)$ को सर्वसमिका की सहायता से हल कीजिए।

हल $\left(\frac{x}{3} + \frac{y}{5}\right)\left(\frac{x}{3} - \frac{y}{5}\right)$ की तुलना $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ से करने पर $a = \frac{x}{3}$, $b = \frac{y}{5}$

$$\begin{aligned}\left(\frac{x}{3} + \frac{y}{5}\right)\left(\frac{x}{3} - \frac{y}{5}\right) &= \left(\frac{x}{3}\right)^2 - \left(\frac{y}{5}\right)^2 \\ &= \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{25}\end{aligned}$$

उदाहरण 11. सर्वसमिका के प्रयोग से 52×48 का मान ज्ञात कीजिए

हल: $52 \times 48 = (50+2)(50-2)$

$$\begin{aligned}\text{अब } (a + b)(a - b) &= a^2 - b^2 \text{ से तुलना करने पर } a = 50, b = 2 \\ (50+2)(50-2) &= 50^2 - 2^2 \\ &= 2500 - 4 \\ &= 2496\end{aligned}$$

प्रश्नावली 9.1 (Exercise 9.1)

1. उपयुक्त सर्वसमिका के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात कीजिए –

$$(i) \quad (2a + 3)(2a + 3) \quad (ii) \quad \left(\frac{2}{5}m + \frac{3}{4}\right)\left(\frac{2}{5}m + \frac{3}{4}\right)$$

2. उपयुक्त सर्वसमिका का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए–

$$(i) \quad (x - 5)(x - 5) \quad (ii) \quad \left(\frac{3}{2}x - \frac{4}{5}y\right)\left(\frac{3}{2}x - \frac{4}{5}y\right)$$

$$(iii) \quad \left(2a - \frac{1}{2}\right)\left(2a - \frac{1}{2}\right) \quad (iv) \quad (x^2 - y^2)(x^2 - y^2)$$

3. उपयुक्त सर्वसमिका का प्रयोग कर मान निकालिए –

$$(i) \quad (4x + 5)(4x - 5) \quad (ii) \quad \left(\frac{x}{2} + \frac{y}{3}\right)\left(\frac{x}{2} - \frac{y}{3}\right)$$

$$(iii) \quad (-a^2 + b^2)(a^2 + b^2) \quad (iv) \quad (x^3 + y^3)(x^3 - y^3)$$

4. सर्वसमिका का प्रयोग कर हल कीजिए –

$$(i) \quad (2a + 5)^2 \quad (ii) \quad \left(\frac{2}{3}m^2 + \frac{5}{6}n^2\right)^2$$

$$(iii) \quad (-8x^3 + 5y^3)^2$$

5. उपयुक्त सर्वसमिका का उपयोग कर मान ज्ञात कीजिए:—
 (i) $(41)^2$ (ii) $(69)^2$
 (iii) $(97)^2$ (iv) $(84)^2$
6. उपयुक्त सर्वसमिका का उपयोग कर मान ज्ञात कीजिए।
 (i) 105×95 (ii) 92×88
 (iii) 503×497
7. x का मान ज्ञात कीजिए यदि
 (i) $6x = (28)^2 - (22)^2$ (iii) $19x = 3^2 - 16^2$
 (ii) $3x = (17)^2 - (14)^2$ (iv) $43x = 28^2 - 15^2$
8. $(3x - 5y)^2$ को हल कीजिए तथा $x = 4$ एवं $y = 2$ के लिए उत्तर की जाँच कीजिए।
9. $\left(\frac{x}{3} + \frac{y}{4}\right)^2$ को हल कीजिए तथा $x = 9$ एवं $y = 12$ के लिए उत्तर की जाँच कीजिए।

इन्हें भी देखें (Observe these also)

1. $(7-5) \times (7-5) = 2 \times 2 = 4$
 $(5-7) \times (5-7) = (-2) \times (-2) = 4$
2. $(8-4) \times (8-4) = 4 \times 4 = 4 \times 4 = 16$
 $(4-8) \times (4-8) = -4 \times -4 = 16$
- $(x-y)(x-y) = (y-x)(y-x)$ है। इस प्रकार कोई भी दो संख्याएँ लेकर जाँच करें कि क्या $(x-y)^2 = (y-x)^2$ है?

सर्वसमिकाओं (Identities) का उपयोग कर गुणनखण्डन करना (Factorization with the help of identities)

बीजीय व्यंजकों के गुणनफल के अध्याय में आपने सर्व समिकाओं के बारे में पढ़ा है। सर्वसमिकाएं ऐसे कथन होते हैं जो प्रत्येक चरांक के लिए सत्य होते हैं। आप गुणनखण्डन करने के लिए सर्वसमिकाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं।

$$\begin{aligned} \text{(I)} \quad a^2 + 2ab + b^2 &= (a + b)^2 \\ &= (a + b)(a + b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(II)} \quad a^2 - 2ab + b^2 &= (a - b)^2 \\ &= (a - b)(a - b) \end{aligned}$$

$$\text{(III)} \quad a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

आईए, देखें इन सर्वसमिकाओं का गुणनखण्डन करने के लिए किस प्रकार उपयोग किया जाता है।

उदाहरण 7. $9x^2 + 24xy + 16y^2$ का गुणनखण्डन कीजिए।

हल : यहाँ प्रथम पद एवं तृतीय पद क्रमशः $3x$ एवं $4y$ के वर्ग हैं एवं मध्य पद $3x$ एवं $4y$ के गुणनफल के दुगुने के बराबर है।

$$\begin{aligned}\text{अतः} \quad & 9x^2 + 24xy + 16y^2 \\ &= (3x)^2 + 2(3x)(4y) + (4y)^2 \\ &= (3x + 4y)^2 \quad (\text{सर्वसमिका I } a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \text{ के प्रयोग से}) \\ &= (3x + 4y)(3x + 4y)\end{aligned}$$

उदाहरण 8. $p^2 - 4pq + 4q^2$ का गुणनखण्डन कीजिए।

हल : यहाँ प्रथम एवं तृतीय पद क्रमशः p एवं $2q$ के वर्ग हैं और मध्य पद ऋणात्मक है व p एवं $2q$ के गुणनफल के दुगुने के बराबर है।

$$\begin{aligned}\text{अतः} \quad & p^2 - 4pq + 4q^2 \\ &= (p)^2 - 2(p)(2q) + (2q)^2 \quad (\text{सर्वसमिका II } a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2 \text{ के प्रयोग से}) \\ &= (p - 2q)^2 \\ &= (p - 2q)(p - 2q)\end{aligned}$$

उदाहरण 9. $16m^2 - 25n^2$ का गुणनखण्डन कीजिए।

हल : यहाँ प्रथम पद $4m$ तथा द्वितीय पद $5n$ का वर्ग है एवं इनके बीच ऋण चिन्ह है।

$$\begin{aligned}\text{अतः} \quad & 16m^2 - 25n^2 \\ &= (4m)^2 - (5n)^2 \\ &= (4m + 5n)(4m - 5n) \quad (\text{सर्वसमिका III } a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \text{ के प्रयोग से})\end{aligned}$$

सर्वसमिका III का प्रयोग उस स्थिति में करते हैं जब व्यंजक के दो पद हो तथा दोनों पद पूर्ण वर्ग के रूप में हो व उनके मध्य ऋण चिन्ह हो।

उदाहरण 10. $(4x - 3y)^2 - 100$ का गुणनखण्डन कीजिए।

हल : यहाँ प्रथम पद $(4x - 3y)$ का वर्ग है तथा द्वितीय पद 10 का वर्ग है।

$$\begin{aligned}\text{अतः} \quad & (4x - 3y)^2 - 100 \\ &= (4x - 3y)^2 - (10)^2 \\ &= (4x - 3y + 10)(4x - 3y - 10) \quad (\text{सर्वसमिका III } a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \text{ के प्रयोग से})\end{aligned}$$

प्रश्नावली 9.2

प्रश्न 1 सर्वसमिकाओं का उपयोग कर गुणनखण्डन कीजिए :-

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| (a) $4x^2 + 20xy + 25y^2$ | (b) $25a^2 + 70ab + 49b^2$ |
| (c) $9x^2 + 6x + 1$ | (d) $1 + 18a + 81a^2$ |
| (e) $p^2 + p + \frac{1}{4}$ | (f) $36a^2 + 132ab + 121b^2$ |

प्रश्न 2 सर्वसमिकाओं का उपयोग कर गुणनखण्डन कीजिए :-

- (a) $a^2 - 10ab + 25b^2$ (b) $16x^2 - 104x + 169$
 (c) $121x^2 - 88xy + 16y^2$ (d) $x^2 - 30x + 225$
 (e) $36a^2 - 12a + 1$

प्रश्न 3 सर्वसमिकाओं का उपयोग कर गुणनखण्डन कीजिए :-

- (a) $25a^2 - 49b^2$ (b) $9x^2 - 121y^2$
 (c) $64a^2 - 1$ (d) $1 - 16b^2$
 (e) $\frac{16}{25}m^2 - \frac{4}{9}n^2$


प्रश्न 4 सर्वसमिकाओं का उपयोग कर गुणनखण्डन ज्ञात कीजिए :-

- (a) $(x + 4y)^2 - 49$ (b) $100 - (2a + 3b)^2$
 (c) $(4x^2 + 20xy + 25y^2) - 36$ (d) $9x^2 - (4x - 5y)^2$
 (e) $x^2y^2 - 16$

प्रश्न 5 निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : -

- (a) $x^2 - 25y^2 = (x + 5y) (\text{-----})$
 (b) $x^2 + 6x + 9 = (x + \text{---}) (\text{---} + 3)$
 (c) $4x^2 - 28x + 49 = (2x - \text{---}) (2x - \text{---})$
 (d) $(a + b)^2 - 4 = (a + b + 2) (\text{-----})$

प्रश्न 6. राम के पास x मीटर भुजा की वर्गाकार जमीन है। उसने स्कूल के रास्ते के लिए लंबाई और चौड़ाई के समांतर 5-5 मीटर जगह छोड़ दी। अब राम के पास बची जमीन का क्षेत्रफल कितना है ?



- प्रश्न 7. एक मंदिर में जितनी मूर्तियाँ थी, पुजारी उतने ही फूल प्रत्येक मूर्ति पर चढ़ाता था। उस मंदिर में 2 मूर्तियाँ और स्थापित की गईं। मंदिर का पुजारी अभी भी प्रत्येक मूर्ति पर उतने ही फूल चढ़ाता है जितनी मंदिर में मूर्तियाँ हैं, परन्तु अब उसे पहले की तुलना में 24 फूल अधिक लाने पड़ते हैं। बताइए कि मंदिर में पहले कितनी मूर्तियाँ थीं?
- प्रश्न 8. एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल (x^2-25) वर्गमीटर है। यदि इस खेत की लंबाई $(x+5)$ मीटर है तो खेत की चौड़ाई कितनी होगी?
- प्रश्न 9. एक आयताकार आइने की चौड़ाई और लंबाई फीट में नापने पर दो क्रमागत संख्याएँ प्राप्त होती हैं। इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 05 है। आइने की लंबाई और चौड़ाई बताइए।

हमने सीखा (We Have Learnt)


- (i) $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- (ii) $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- (iii) $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
- (iv) बीजीय व्यंजकों के गुणनखंडन में सर्वसमिकाओं का प्रयोग आवश्यकतानुसार करते हैं।



अध्याय –10
बहुभुज
POLYGON



रानी ने स्केल एवं पेंसिल की सहायता से पाँच चित्र बनाए।



चित्र – 10.1

उसने अपनी सहेली शैली से पूछा क्या तुम इन आकृतियों को पहचान रही हो?

शैली ने कहा— पिछली कक्षा में हमने सीखा है कि भुजाओं की संख्या के आधार पर आकृतियों को नाम देते हैं।

जैसे आकृति 10.1(i) में तीन भुजाओं से बनी आकृति त्रिभुज, आकृति 10.1(ii) में चार भुजा से बनी आकृति चतुर्भुज, आकृति 10.1(iii) में पाँच भुजा से बनी आकृति पंचभुज हैं।

मेरी ने रानी से कहा— सही पहचाना परन्तु आकृति 10.1(iv) तथा आकृति 10.1(v) को क्या नाम दोगी?


रानी ने उत्तर दिया आकृति 10.1(iv) को षट्भुज और आकृति 10.1(v) को सप्तभुज कहेंगे।





ये सभी बन्द आकृतियाँ कई भुजाओं से मिलकर बनी है अतः “तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृतियों को बहुभुज कहते हैं।”



क्रियाकलाप 1 (Activity 1)

निम्न आकृतियों को ध्यान से देखिए तथा तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।





चित्र - 10.2

सारणी 10.1 (Table 10.1)

क्र.सं.	चित्र संख्या	आकृति का नाम	शीर्षों की संख्या	भुजाओं की संख्या	कोणों की संख्या
1	10.2 (i)	त्रिभुज	3	3	3
2	10.2 (ii)				
3	10.2 (iii)				
4	10.2 (iv)				
5	10.2 (v)				
6	10.2 (vi)				
7	10.2 (vii)				
8	10.2 (viii)				

क्रियाकलाप (1) से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?

अवलोकन कर उससे निष्कर्ष निकालिए—




अवलोकन पश्चात हम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी भी बहुभुज में शीर्षों की संख्या, भुजाओं की संख्या एवं कोणों की संख्या समान होती है।

इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि बहुभुज (iii) व (vii) दोनों पंचभुज एवं (iv) एवं (viii) दोनों षट्भुज हैं, लेकिन क्या क्रमांक (iii) व (vii) तथा (iv) व (viii) के बहुभुजों में कोई अंतर है?

सोचिए और अपने साथियों एवं शिक्षकों से इस सम्बंध में चर्चा कर निष्कर्ष लिखिए—


चित्र (vii) एवं (viii) के कुछ शीर्ष अंदर की ओर धंसे हुए हैं, परन्तु बाकी चित्रों के सभी शीर्ष बाहर उभरे हुए हैं। इस तरह हमें दो प्रकार के बहुभुज प्राप्त होते हैं—

(1) उत्तल बहुभुज (Convex polygon)— ऐसे बहुभुज जिनके सभी शीर्ष बाहर उभरे हुए हों और प्रत्येक अंतःकोण 180° से कम हों, उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। जैसे—




चित्र - 10.3

- (2) अवतल बहुभुज (concave polygon) — ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा हुआ हो और कम से कम एक अंतः कोण 180° से अधिक हो, अवतल बहुभुज कहलाता है।



चित्र — 10.4

आकृति 10.5 एक अष्टभुज है। इसमें शीर्ष A से अन्य शीर्षों को मिलाकर भुजाओं तथा विकर्णों को पहचानिए तथा सारणी की पूर्ति कीजिए —



चित्र-10.5

सारणी 10.2


क्रमांक	शीर्ष का नाम जहाँ से अन्य शीर्षों को मिलाया गया	रेखाखंडों के नाम	
		भुजाएँ	विकर्ण
1	A	AB, AH	AC, AD, AE, AF, AG
2	B	BC, BA	BD, BE, BF, BG, BH
3	C	-----	-----
4			

इस क्रियाकलाप के आधार पर आप बहुभुज के विकर्ण की परिभाषा लिखिए —



क्रियाकलाप 2 (Activity 2)


नीचे दी गई आकृतियों में किसी एक शीर्ष से विकर्ण खींचकर रिक्त स्थानों में उनकी संख्या लिखिए —



चित्र - 10.6

क्रियाकलाप 3

नीचे कुछ चतुर्भुज दिये गये हैं उनमें एक विकर्ण खींचिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए -




चित्र - 10.7

1. चतुर्भुज कितने त्रिभुजों में बंट गया है?
2. क्या दोनों त्रिभुजों के अंतः कोणों का योग चतुर्भुज के अंतः कोणों के योग के बराबर होगा?
3. त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितने अंश के बराबर है?
4. चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बताइए?

क्रियाकलाप 4

नीचे दिए गये चित्रों में किसी एक बिंदु से विकर्ण खींचे गये हैं।



चित्र - 10.8

चित्रों को ध्यान से देखिए एवं निम्न तालिका को भरिए-

सारणी — 10.3

क्रमांक	बहुभुज के नाम	बहुभुज में भुजाओं की संख्या	बहुभुज में बने कुल त्रिभुजों की संख्या	बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग = त्रिभुजों की संख्या $\times 180^\circ$	अंतःकोणों का योग
1.	चतुर्भुज	04	02 या (4-2)	$2 \times 180^\circ$	360°
2.	पंचभुज	05	03 या (5-2)	$3 \times 180^\circ$	540°
3.	षष्ठभुज				
4.	सप्तभुज				
5.	द्वादशभुज				

उपरोक्त क्रियाकलाप 4 को हल करते वक्त शैली ने कहा कि बहुभुज में त्रिभुज की संख्या भुजाओं की संख्या से 2 कम है।

यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n हो तो बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या $(n-2)$ होगी।

तभी रानी बोली $(n-2)$ त्रिभुज होने पर बहुभुज के अंतः कोणों का योग $= (n-2) \times 180^\circ$ होगा।

अतः **n भुजा वाले बहुभुज में अंतः कोणों का योग $= (n-2) \times 180^\circ$**

उदाहरण 1. एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है तो अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए—

हल: बहुभुज के अंतः कोणों का योग $= (n - 2) \times 180^\circ$ जहाँ n भुजाओं की संख्या है।

$$= (15 - 2) \times 180^\circ$$

$$= 13 \times 180^\circ$$

$$= 2340^\circ$$

नियमित एवं अनियमित बहुभुज (Regular and Irregular polygons)

आप जानते हैं कि जिस त्रिभुज में भुजाएँ बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण बराबर होते हैं। चतुर्भुज में जब प्रत्येक अंतःकोण 90° का होता है एवं प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है तो उस आकृति को क्या कहते हैं? क्या अन्य बहुभुज में भी सभी भुजाएँ एवं कोण बराबर हो सकते हैं?

“जब बहुभुज में सभी भुजाएँ एवं कोण आपस में बराबर होते हैं उसे समबहुभुज या नियमित बहुभुज कहते हैं।”

जिस पंचभुज की सभी भुजाएँ एवं कोण बराबर होते हैं तो उसे समपंचभुज कहते हैं।

“ऐसे बहुभुज जिनकी भुजाओं एवं अंतःकोणों की माप अलग-अलग होती हैं अनियमित बहुभुज कहलाते हैं।”

चतुर्भुजाकार बहुभुजों में वर्ग एक नियमित बहुभुज है शेष बहुभुज अनियमित बहुभुज है।

गुणों के आधार पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज (Different kinds of quadrilateral on the basis of characteristics.)






कक्षा VII में आपने चतुर्भुज की भुजा, बहिष्कोण, सम्मुखकोण, आसन्न कोण तथा अंतःकोणों का योग तथा चतुर्भुज के प्रकार के बारे में अध्ययन किया है।

आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों की पहचान कर लें—



क्रियाकलाप 5

प्रथम उदाहरण के अनुसार सारणी पूर्ण कीजिए—



चित्र – 10.9


सारणी – 10.4

चित्र	समान्तर भुजाओं के नाम	बराबर भुजाओं के नाम	चतुर्भुज का प्रकार
10.9(i)	$AB \parallel CD, BC \parallel AD$	$AB = CD, BC = AD$	समान्तर चतुर्भुज
10.9(ii)			
10.9(iii)			
10.9(iv)			
10.9(v)			




क्रियाकलाप 6


नीचे समान्तर चतुर्भुज के तीन चित्र दिए गए हैं, तालिका में दर्शाये अनुसार मापकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—



(i)



(ii)



(iii)

चित्र — 10.10

सारणी — 10.5

क्र.	समान्तर चतुर्भुज का नाम	भुजाओं की माप (सेमी में)	कोणों की माप (अंश में)
1.	चतुर्भुज ABCD	AB=सेमी BC=...सेमी CD=.....सेमी DA=...सेमी	$\angle A=.....\angle B=.....$ $\angle C=.....\angle D=.....$
2.	चतुर्भुज PQRS	PQ=सेमी QR=...सेमी RS=.....सेमी SP=...सेमी	$\angle P=.....\angle Q=.....$ $\angle R=.....\angle S=.....$
3.	चतुर्भुज EFGH	EF=सेमी FG=...सेमी GH=.....सेमी HE=...सेमी	$\angle E=.....\angle F=.....$ $\angle G=.....\angle H=.....$

सारणी में प्राप्त परिणाम के आधार पर आपने देखा कि समान्तर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं तथा सम्मुख कोणों के माप बराबर है।

इस आधार हम कह सकते हैं कि समान्तर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा व सम्मुख कोणों की माप आपस में बराबर होती है।

अभ्यास—1 (Practice - 1)

- कोई दो समान्तर चतुर्भुज बनाइए तथा सम्मुख भुजाओं एवं कोणों को मापकर लिखिए। क्या सम्मुख भुजा व कोण बराबर है?

उदाहरण 3. ABCD एक समान्तर चतुर्भुज है जिसमें $\angle C=75^\circ$ है तो शेष कोण ज्ञात कीजिए।

हल: दिया है $\angle C=75^\circ$


इसलिए $\angle A=75^\circ$

(क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं।)

चूँकि $\angle A + \angle C + \angle B + \angle D = 360^\circ$ (क्यों?)

$$\Rightarrow 75^\circ + 75^\circ + \angle B + \angle D = 360^\circ$$

$$\Rightarrow 150^\circ + \angle B + \angle D = 360^\circ$$



चित्र—10.11

$$\angle B + \angle D = 360^\circ - 150^\circ$$

$$\angle B + \angle D = 210^\circ$$

$$\angle B + \angle B = 210^\circ [\because \angle D = \angle B]$$

$$\angle B = \frac{210^\circ}{2} \quad \text{या} \quad \angle B = 105^\circ$$

इसी प्रकार $\angle D = 105^\circ$

समान्तर चतुर्भुज में खींचे गए विकर्णों के गुण-



(Characteristics of Diagonals drawn in a parallelogram)

किसी बहुभुज में विकर्ण खींचना आप सीख चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि एक चतुर्भुज में खींचे गए विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं।


आइए समान्तर चतुर्भुज में खींचे गए विकर्णों के गुणों को जाँचें -



क्रियाकलाप 7



चित्र - 10.12



ऊपर दिए गए सभी समान्तर चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे को O पर काटते हैं। नीचे तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए एवं निष्कर्ष निकालिये।

सारणी - 10.6

क्र.	समान्तर चतुर्भुज का नाम	रेखाखण्डों की माप सेमी में	क्या प्रतिच्छेद बिन्दु O विकर्णों का मध्य बिन्दु है?
1.	समान्तर चतुर्भुज ABCD	AO=....सेमी OC=....सेमी OB=....सेमी OD=....सेमी	
2.	समान्तर चतुर्भुज PQRS	OP=....सेमी OR=....सेमी OQ=....सेमी OS=....सेमी	
3.	समान्तर चतुर्भुज EFGH	OE=....सेमी OG=....सेमी OF=....सेमी OH=....सेमी	

निष्कर्ष

ऐसे ही और कई समान्तर चतुर्भुज बनाकर अपने निष्कर्ष की जाँच कीजिए कि समान्तर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।

नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूँढ़िए तथा अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए—

1. क्या प्रत्येक वर्ग एक समान्तर चतुर्भुज है?
2. क्या प्रत्येक आयत एक समान्तर चतुर्भुज है?
3. क्या प्रत्येक समचतुर्भुज एक समान्तर चतुर्भुज है?
4. तो क्या उपरोक्त सभी चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे?


अभ्यास 2

1. एक ऐसा चतुर्भुज बनाइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे।



क्रियाकलाप 8

नीचे आयत व वर्ग के कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में दोनों विकर्णों को मापिए एवं तालिका में रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए—



सारणी-10.7

चित्र क्र	चतुर्भुज का नाम	विकर्णों की माप (सेमी में)	रेखाखंडों की माप (सेमी में)	क्या विकर्ण आपस में बराबर हैं ? (हाँ या नहीं)	क्या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं?(हाँ/नहीं)
10.13 (i)	आयत ABCD	$AC=...BD=...$	$OA=...OC=...$ $OB=...OD=...$		
10.13 (ii)	आयत PQRS	$PR=...QS=...$	$OP=...OR=...$ $OQ=...OS=...$		
10.13 (iii)	वर्ग EFGH	$EG=...FH=...$	$OE=...OG=...$ $OF=...OH=...$		
10.13 (iv)	वर्ग IJKL	$IK=...JL=...$	$OI=...OK=...$ $OJ=...OL=...$		

अतः हम प्रत्येक स्थिति में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आयत एवं वर्ग के विकर्ण की लम्बाई आपस में बराबर होती हैं एवं वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।






अभ्यास-3

आप अपनी कापी में अलग-अलग माप के दो आयत एवं दो वर्ग बनाकर उनके विकर्ण खींचिए एवं उनके गुणों की जाँच कीजिए।



क्रियाकलाप 9

नीचे समचतुर्भुज तथा वर्ग के कुछ चित्र दिए गए हैं इनके विकर्णों को मिलाइए तथा इनके प्रतिच्छेद बिन्दु पर बनने वाले कोणों को मापिए।



चित्र - 10.14

सारणी-10.8

क्र.	चित्र क्रमांक	चतुर्भुज का नाम	विकर्णों के प्रतिच्छेद बिन्दु पर बने कोणों की माप
1.	10.14(i)	समचतुर्भुज ABCD	$\angle AOB = \dots \angle BOC = \dots \angle COD = \dots \angle DOA \dots$
2.	10.14(ii)		
3.	10.14(iii)		
4.	10.14(iv)		
5.	10.14(v)		

विकर्णों के प्रतिच्छेद बिन्दु पर बनने वाले कोणों का मान कितना है?

इस प्रकार आप पाते हैं कि समचतुर्भुज तथा वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।

सारणी-10.9

क्रं	चतुर्भुज के प्रकार	भुजाएँ	कोण	विकर्ण
1.	समान्तर चतुर्भुज	सम्मुख भुजाएँ समान्तर व बराबर होती हैं।	सम्मुख कोण बराबर होते हैं।	विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद बिन्दु पर समद्विभाजित करते हैं।
2.	आयत	सम्मुख भुजाएँ समान्तर व बराबर होती हैं।	सम्मुख कोण बराबर होते हैं (प्रत्येक कोण 90° होता है।)	विकर्ण बराबर एवं एक दूसरे को प्रतिच्छेद बिन्दु पर समद्विविभाजित करते हैं।
3.	वर्ग	सभी भुजाएँ बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएँ समान्तर होती हैं।	सम्मुख कोण बराबर होते हैं (प्रत्येक कोण 90° का होता है।)	विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तथा विकर्ण आपस में बराबर होते हैं
4.	समचतुर्भुज	सभी भुजाएँ बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएँ समान्तर होती हैं।	सम्मुख कोण बराबर होते हैं।	विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।

प्रश्नावली-10 (Exercise -10)

- प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनमें एक सही है सही उत्तर चनुकर लिखिए—
 - दोनों विकर्ण बराबर होते हैं—
 - समान्तर चतुर्भुज
 - समचतुर्भुज
 - आयत
 - समलंब चतुर्भुज
 - किस चतुर्भुज में सभी कोण आपस में बराबर होते हैं।
 - समलंब चतुर्भुज
 - सम चतुर्भुज
 - समान्तर चतुर्भुज
 - आयत
 - समान्तर चतुर्भुज का एक कोण यदि 60° का हो तो उसके सम्मुख कोण का मान होगा।
 - 60°
 - 120°
 - 90°
 - 180°

(द) किसी समान्तर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की लम्बाई क्रमशः 8 सेमी व 6 सेमी हो तो उसका परिमाप होगा।


(i) 14 सेमी (ii) 28 सेमी (iii) 56 सेमी (iv) 60 सेमी

2. निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

1. ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर होते हैं तथा प्रतिच्छेद बिन्दु पर समकोण बनाते हैं, उस चतुर्भुज को ————— कहते हैं।
2. वह चतुर्भुज जिसमें केवल एक सम्मुख भुजा समान्तर हो ————— चतुर्भुज कहलाता है।
3. किसी बहुभुज में यदि 6 शीर्ष हो तो उसमें भुजाओं की संख्या ————— होगी।
4. यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n हो तो किसी एक शीर्ष से सभी विपरीत शीर्षों को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या ————— होगी।
3. एक वर्गाकार कागज के चारो शीर्षों को कैंची से काटा गया है प्राप्त आकृति कौन सा बहुभुज क्षेत्र बनाती है? अपने साथियों से चर्चा कीजिए।
4. एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है तो उसके अंतः कोणों का योग कितना होगा।
5. एक समान्तर चतुर्भुज का एक कोण 120° हो तो अन्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए।
6. एक समान्तर चतुर्भुज के दो कोणों का अनुपात 4:5 है समान्तर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए।
7. किसी समान्तर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएँ 3:4 के अनुपात में है यदि समान्तर चतुर्भुज का परिमाप 84 सेमी हो तो उसकी भुजाएँ ज्ञात कीजिए।
8. इनमें कौन से कथन सही नहीं हैं उन्हें सुधारकर लिखिए
 - (i) सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं।
 - (ii) आयत के विकर्ण बराबर होते हैं।
 - (iii) सभी आयत समान्तर चतुर्भुज नहीं होते।
 - (iv) समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।
 - (v) सभी वर्ग आयत होते हैं।

बहुभुजों में समरूपता (Symmetry in polygons)

चतुर्भुजाकार आकृतियों से तो आप भलीभाँति परिचित हो चुके हैं। कक्षा 7वीं में आपने यह सीखा था कि किसी आकृति को यदि इस प्रकार से दो भागों में मोड़ा जा सके कि मोड़ने पर दोनों भाग एक-दूसरे को पूरी तरह से ढँक ले तो जिस रेखा के सापेक्ष इस आकृति को मोड़ा जाता है उस रेखा को सममिति की रेखा कहते हैं। जैसे – एक वर्ग काटिए उस वर्ग को नीचे चित्र में दी गई टूटी हुई रेखाओं के सापेक्ष मोड़कर आप चार सममित रेखाएँ प्राप्त कर सकते हैं।




चित्र क्र. 10.

इसी प्रकार आप भी नीचे दी गई आकृतियों के समान आकार का कागज काटकर प्रत्येक आकृति के लिए सममित रेखाएँ प्राप्त कीजिए एवं जिन आकृतियों में संभव हो उन आकृतियों में पुस्तक में ही पेंसिल द्वारा खींची गई टूटी हुई रेखाओं से दर्शाइए तथा रिक्त स्थानों पर सममित रेखाओं की संख्याएँ भी लिखिए।



आयत



समचतुर्भुज



समलम्ब



समान्तर चतुर्भुज



दो समान भुजाओं वाली समलम्ब


समान्तर चतुर्भुज जो न वर्ग है न आयत और न ही समचतुर्भुज में कोई भी सममित रेखा नहीं है फिर भी देखने से ऐसा लगता है कि इनमें एक प्रकार का संतुलन है। आइए, इसे ढूँढ़ें—

एक कागज को बीच से दो बराबर भागों में मोड़िए तथा ऊपरी भाग पर एक समान्तर चतुर्भुज बनाइए। अब दोनों कागजों को इस प्रकार काटें कि दो समान आकार के समान्तर चतुर्भुज प्राप्त हो।


दोनों समान्तर चतुर्भुज में विकर्ण खींचकर उनका कटन बिन्दु प्राप्त कीजिए।

कटन बिन्दु पर एक पिन लगाकर ऊपर वाले समांतर चतुर्भुज को नीचे वाले समान्तर चतुर्भुज


के ऊपर घुमाइए तथा यह देखिए कि किन-किन स्थितियों में केन्द्र पर घुमाने से ऊपर का समान्तर चतुर्भुज नीचे के समान्तर चतुर्भुज को पूरी तरह ढँक लेता है ?




इस प्रकार आप देखते हैं कि पहले 180° के कोण पर एवं पुनः 360° के कोण पर ऊपर वाले समान्तर चतुर्भुज को घुमाने पर ऊपर वाला समान्तर चतुर्भुज नीचे वाले समान्तर चतुर्भुज पूरी तरह ढँक लेता है। इस प्रकार की सममिति को घूर्णन सममिति कहते हैं तथा जिस बिन्दु के सापेक्ष घुमाते हैं उसे घूर्णन केन्द्र कहते हैं। घूर्णन केन्द्र के सापेक्ष एक पूरा चक्कर लगाने पर एक आकृति अपने आप को जितनी बार ढँक लेती है उसे घूर्णन का क्रम कहते हैं। निम्न आकृतियों का घूर्णन क्रम ज्ञात कीजिए –




क्रियाकलाप : नीचे दी गई आकृतियों में बहुभुज को पहचानिये तथा उनके घूर्णन का क्रम एवं सममिति अक्षों की संख्या ज्ञात कीजिए एवं सारणी में भरिए –




चित्र क्र. 10.




चित्र क्र. 10.




चित्र क्र. 10.



चित्र क्र. 10.



चित्र क्र. 10.



चित्र क्र. 10.

चित्र क्र.	बहुभुज है या नहीं	घूर्णन का क्रम	सममित अक्षों की संख्याएँ

क्या घूर्णन क्रम का सममित अक्षों की संख्या से कोई संबंध है ?

इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं ?

अभ्यास-4

- अपने दैनिक जीवन में घूर्णन सममिति कहां-कहां दिखती है ? कोई पांच उदाहरण लिखिए।
- क्या आप और किसी प्रकार की सममिति के बारे में सोच सकते हैं ? सोचिए एवं अपने साथियों से चर्चा कीजिए।

प्रश्नावली 10.1

- एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 80° , 110° , 120° हैं तो चौथा कोण कितने अंश का होगा?
- यदि किसी चतुर्भुज के तीन कोण समान हैं और चौथा कोण 75° का है तो बताइए समान कोण कितने अंश के हैं?
- समान्तर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 2 : 3 है तो कोणों के मान क्या होंगे?

4. किसी चतुर्भुज का एक कोण समकोण है और अन्य कोणों का अनुपात $2 : 3 : 4$ है तो उन कोणों के मान क्या होंगे?
5. एक चतुर्भुज के चार कोणों का अनुपात $1 : 2 : 3 : 4$ है तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए।
6. एक समान्तर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्रमशः x और $x + 20$ हैं तो प्रत्येक कोण का मान बताइए।

हमने सीखा (We have learnt)

1. तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है।
2. बहुभुज के सभी भुजाओं की लम्बाई एवं सभी कोण बराबर हों तो उसे सम बहुभुज क्षेत्र या नियमित बहुभुज क्षेत्र कहते हैं।
3. जिन बहुभुज में भुजाओं की लम्बाई भिन्न-भिन्न होती है उसे अनियमित बहुभुज क्षेत्र कहते हैं।
4. यदि किसी बहुभुज क्षेत्र में भुजाओं की संख्या n है तो एक शीर्ष से सभी विपरीत शीर्षों को मिलाने पर क्षेत्र $(n-2)$ त्रिभुजों में बँट जाता है।
5. किसी बहुभुज क्षेत्र के सभी अंतःकोणों का योग $(n-2) \times 180^\circ$ होता है।
6. समान्तर चतुर्भुज, आयत, वर्ग एवं समचतुर्भुज के विकर्ण प्रतिच्छेद बिन्दु पर समद्विविभाजित होते हैं।
7. वर्ग एवं आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं।
8. वर्ग एवं समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विविभाजित होते हैं।
9. वह बहुभुज क्षेत्र जिसका प्रत्येक कोण 180° से कम हो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं।
10. वह बहुभुज क्षेत्र जिसमें कम से कम एक अंतःकोण 180° से अधिक हो अवतल बहुभुज क्षेत्र कहलाता है।



अध्याय-11

चतुर्भुज की रचना

CONSTRUCTION OF QUADRILATERAL



कमला, दिये गये मापों के आधार पर त्रिभुज की रचना करना जान चुकी है। वह चतुर्भुज के बारे में भी जानती है, उसके मन में चतुर्भुज की रचना करने की इच्छा हुई। वह सोचने लगी कि क्या चार भुजाएं ज्ञात होने पर चतुर्भुज बनाया जा सकता है?

कमला झाड़ू की चार सीकें क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी और 13 सेमी लम्बाई माप की लेकर चतुर्भुज बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन चतुर्भुज नहीं बना पा रही है। क्या आप इन सीकों को चतुर्भुज का आकार दे सकते हैं?

यदि चतुर्भुज नहीं बन सकता तो क्यों? कारण सोचिए।

अब आप भी चतुर्भुज की भुजाओं के लिए कोई भी चार माप सोचिए तथा सोचे गए मापों के समान माप की चार सीकें लीजिए तथा सीकों से चतुर्भुज बनाइए।

नीचे कुछ बच्चों द्वारा सोचे गए माप एवं निष्कर्ष लिखे गए हैं इनके आगे आपके द्वारा सोची गई मापों को लिखिए तथा निष्कर्ष निकालिए।

सारणी 11.1 (Table 11.1)

क्र.सं.	नाम	भुजाओं की माप (सेमी. में)				निष्कर्ष
		पहली	दूसरी	तीसरी	चौथी	
1.	मयंक	3	4	5	6	चतुर्भुज बनता है
2.	नीरज	3	3	4	10	चतुर्भुज नहीं बनता है
3.	नम्रता	2	4	5	7	चतुर्भुज बनता है
4.	रजिया	3	5	6	15	चतुर्भुज नहीं बनता है
5.	गुरप्रीत	4	6	7	8	चतुर्भुज बनता है
6.	-----	-----	-----	-----	-----	-----

तालिका को ध्यान पूर्वक देखिए और सोचिए कि नीरज एवं रजिया के मापों से चतुर्भुज क्यों नहीं बन रहे हैं।

चतुर्भुज बनने की शर्तें (Conditions for forming a quadrilateral)

चतुर्भुज की रचना तभी संभव है, जब इनकी तीन भुजाओं का योग चौथी (सबसे बड़ी) भुजा से अधिक हो।

हमीदा ने पाया कि भुजाओं के मध्य झुकाव में परिवर्तन करने पर चतुर्भुज की आकृति बदल रही है और ऐसे बहुत से चतुर्भुज बन सकते हैं।

तब तो चतुर्भुज की चार भुजाएं ज्ञात होने पर भी एक विशिष्ट चतुर्भुज नहीं बनाया जा सकता। ऐसा क्यों?

आइये, इसे एक क्रियाकलाप की सहायता से समझते हैं :-

क्रियाकलाप 1. (Activity 1)

चार उपयुक्त लम्बाइयों की लकड़ी की पट्टियाँ लीजिए, इन्हें पिन की सहायता से जोड़कर चतुर्भुज बना लीजिए।

अब इन चतुर्भुज के आमने सामने के कोनों को दबाइये। क्या कोनों को दबाने से चतुर्भुज की आकृति बदल रही है?


इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इन्हीं चार भुजाओं से अनेक चतुर्भुज बन रहे हैं। अब एक और पट्टी लीजिए और इसे दो सम्मुख कोणों में लगाकर विकर्ण का रूप दीजिए।

अब चतुर्भुज की आकृति को बदलने का प्रयास कीजिए। क्या कोनों को दबाकर चतुर्भुज की आकृति बदली जा सकती है? आप पायेंगे कि विकर्ण लगा देने से चतुर्भुज की आकृति नहीं बदली जा सकती।


इस प्रकार चार भुजाएं और एक विकर्ण की सहायता से एक विशिष्ट चतुर्भुज बनाया जा सकता है।

अनु सोच रही थी कि चार भुजाओं से प्राप्त चतुर्भुज के कोनों को दबाने पर कई चतुर्भुजों की आकृतियाँ प्राप्त होती है। परन्तु यदि किसी कोण को स्थिर कर दिया जाए तो दो भुजाएँ स्थिर हो जाएगी और चतुर्भुज भी एक ही प्राप्त होगा।

आइए, एक चतुर्भुज बनाने की कुछ और परिस्थितियों पर विचार करें।



चित्र 11.1




चित्र 11.2


क्रियाकलाप 2. (Activity 2)

उपयुक्त माप वाले एक त्रिभुज की रचना करते हैं – रचना के पश्चात् हमें त्रिभुज के तीन शीर्ष तो मिल जाते हैं। चूंकि चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, इसलिए इस त्रिभुज को चतुर्भुज का स्वरूप देने में एक और शीर्ष की जरूरत होगी। सोचिए कि एक और शीर्ष के लिए कितने मापों की आवश्यकता हो सकती है?

निश्चित रूप से चौथे शीर्ष के लिए दो मापों की आवश्यकता है।



चित्र 11.3



चित्र 11.4

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम पाँच अवयव आवश्यक होते हैं।

हम यहाँ चतुर्भुज की रचना सम्बन्धी निम्न सरल स्थितियों पर अध्ययन करेंगे :

- I. यदि किसी चतुर्भुज की चार भुजाएं व एक विकर्ण दिया हो।
- II. यदि किसी चतुर्भुज की तीन भुजाएं व दो विकर्ण दिये हों।
- III. यदि किसी चतुर्भुज की चार भुजाएं व एक कोण दिया हो।
- IV. यदि किसी चतुर्भुज की तीन भुजाएं व दो अन्तःकोण दिये हों।
- V. यदि किसी चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं व तीन कोण दिये हों।
- VI. विशेष प्रकार के चतुर्भुज की रचना।


हम चाप क्यों काटते हैं?

क्रियाकलाप 3.

6 सेमी लंबा एक रेखाखण्ड $\overline{AB}$ खींचते हैं। अब हमें एक ऐसा बिन्दु C प्राप्त करना है जो A से 3.7 सेमी व B से 4.2 सेमी दूरी पर हो।

क्या आप स्केल की सहायता से ऐसे बिन्दु निश्चित कर पायेंगे?

आप पायेंगे कि स्केल की सहायता से एक निश्चित बिन्दु प्राप्त करना मुश्किल होगा।



चित्र 11.5

आइये A को केन्द्र मानकर 3.7 सेमी त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं। (अब आप चाप के विभिन्न बिन्दुओं से बिन्दु A की दूरी नापिये, क्या ये बराबर हैं?)

चाप के प्रत्येक बिन्दु से A की दूरी बराबर है क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएँ हैं और एक वृत्त की सभी त्रिज्याएँ बराबर होती हैं। इस प्रकार A से 3.7 सेमी की दूरी पर कई बिन्दु हो सकते हैं।

इसी प्रकार बिन्दु B को केन्द्र मान कर 4.2 सेमी त्रिज्या का एक अन्य चाप खींचते हैं। इस चाप के भी प्रत्येक बिन्दु से B बिन्दु की दूरी बराबर है। इस तरह B से भी 4.2 सेमी की दूरी पर कई बिन्दु हो सकते हैं।

दोनों चापों का कटान बिन्दु C ही A से 3.7 सेमी व B से 4.2 सेमी दूरी पर है। इस प्रकार चाप काटकर दो बिन्दुओं से निश्चित दूरी पर एक बिन्दु का निर्धारण करना आसान होता है।


I. चतुर्भुज की रचना जबकि उसकी चारों भुजाएँ एवं एक विकर्ण दिया हो –

I. Construction of a quadrilateral when four sides and one diagonal are given -

उदाहरण 1.

चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें $AB = 5$ सेमी, $BC = 4$ सेमी, $CD = 4.5$ सेमी, $AD = 3.5$ सेमी तथा $AC = 6$ सेमी।


हल: सर्वप्रथम बिना नापे, दिये गये प्रश्न को ध्यान में रखते हुए कच्चा चित्र (Rough diagram) बनाते हैं और कौनसी भुजा किस लम्बाई की बनानी है सम्बन्धित भुजा के साथ लिख देते हैं।



चित्र 11.6


रचना के पद:

1. सर्वप्रथम $AB = 5$ सेमी का एक रेखाखण्ड खींचिए।




चित्र 11.7(i)

2. बिन्दु A को केन्द्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या का चाप ऊपर की ओर काटिए।




चित्र 11.7(ii)

3. अब बिन्दु B को केन्द्र मानकर 4 सेमी त्रिज्या का चाप, दूसरे चरण में बनाए गए चाप पर काटिए। इस प्रकार कटान बिन्दु C प्राप्त होगा।




चित्र 11.7(iii)

4. बिन्दु A व बिन्दु B को बिन्दु C से स्केल (पटरी) की सहायता से मिलाइए।




चित्र 11.7(iv)

5. अब बिन्दु A व बिन्दु C को केन्द्र मानकर परकार की सहायता से क्रमशः 3.5 सेमी व 4.5 सेमी का चाप काटिए। कटान बिन्दु को D से नामांकित कीजिए।




6. बिन्दु D को बिन्दु A व बिन्दु C से पटरी की सहायता से मिलाइए।




इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ।

उदाहरण 2. चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें $PQ = 3$ सेमी, $QR = 4$ सेमी, $RS = 3.5$ सेमी, $PS = 4.2$ सेमी और $QS = 5$ सेमी हो।



चित्र 11.8




रचना के पद

1. सर्वप्रथम $PQ = 3$ सेमी का रेखाखण्ड खींचिए।
2. बिन्दु Q को केन्द्र मानकर 5 सेमी त्रिज्या का एक चाप काटिए।
3. अब बिन्दु P को केन्द्र मानकर 4.2 सेमी त्रिज्या का चाप चरण 2 में बनाए गये चाप पर काटिए। जहाँ ये चाप काटते हैं, उसे S द्वारा नामांकित करते हैं।
4. बिन्दु S को बिन्दु P तथा बिन्दु Q से पटरी की सहायता से मिलाइए।
5. बिन्दु Q व बिन्दु S को केन्द्र मानकर परकार की सहायता से क्रमशः 4 सेमी व 3.5 सेमी त्रिज्या का चाप काटिए। जहाँ वे एक दूसरे को काटते हैं, उस बिन्दु को R से नामांकित कीजिए।
6. बिन्दु R को बिन्दु S व बिन्दु Q से मिलाइए। इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज $PQRS$ प्राप्त हुआ।

उदाहरण 3. समान्तर चतुर्भुज $ABCD$ की रचना कीजिए जिसमें $AB = 3.5$ सेमी, $BC = 5$ सेमी तथा विकर्ण $AC = 8$ सेमी।

हल:


सर्वप्रथम दिए गए मापों को ध्यान में रखकर कच्चा चित्र बनाइए। क्या आप इन दिए गए मानों से समान्तर चतुर्भुज बना सकते हैं? नहीं तो क्यों?



कच्चा चित्र

चित्र 11.9

हम जानते हैं कि समान्तर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं।



अभीष्ट चित्र चित्र 11.10

रचना:

1. सर्वप्रथम $AB = 3.5$ सेमी का एक रेखाखण्ड खींचिए।
2. बिन्दु A से 8 सेमी त्रिज्या का चाप काटिए।
3. बिन्दु B से 5 सेमी त्रिज्या का चाप चरण 2 के चाप पर काटिए। जहाँ ये चाप कटते हैं वह C बिन्दु है।
4. बिन्दु C को बिन्दु A व बिन्दु B से पटरी की सहायता से मिलाइए।
5. बिन्दु C व बिन्दु A से क्रमशः 5 सेमी व 3.5 सेमी का चाप काटिए, जहाँ ये चाप कटें, उसे D से नामांकित कीजिए।
6. बिन्दु D को बिन्दु A व बिन्दु C से मिलाइए। इस प्रकार ABCD एक समान्तर चतुर्भुज प्राप्त हुआ।

अभ्यास 1 (Practice 1)

इन्हें भी बनाएं (यदि संभव हो तो) –

1. एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें $AB = 4$ सेमी तथा $AC = 7$ सेमी
2. समान्तर चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें $PQ = 6$ सेमी, $QR = 8$ सेमी तथा $PR = 10$ सेमी हो।

प्रश्नावली 11.1 (Exercise 11.1)


1. चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें $AB = 4$ सेमी, $BC = 3.1$ सेमी, $CD = 3$ सेमी, $AD = 4.2$ सेमी और $AC = 5$ सेमी हो। विकर्ण BD को नापिए।
2. चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए, जिसमें $PQ = 3$ सेमी, $QR = QS = 5$ सेमी, $PS = 4$ सेमी और $SR = 4$ सेमी हो। RP को नापिए।
3. आयत MNOP की रचना कीजिए जिसमें $MN = 3$ सेमी, $NO = 4$ सेमी तथा $MO = 5$ सेमी हो।

II. चतुर्भुज की तीन भुजाएँ व दो विकर्ण दिये गये हों

II Quadrilateral with three given sides and two diagonal:


उदाहरण 4. चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें $AB = 4$ सेमी, $AD = 3.5$ सेमी, $DC = 5$ सेमी, विकर्ण $AC = 7$ सेमी और $BD = 6$ सेमी हो।

हल: प्रश्न को ध्यान में रखकर कच्चा चित्र बनाइए एवं उसमें दिए गए मापों को सम्बन्धित भुजा के साथ लिखिए।




रचना:

1. सर्वप्रथम $AB = 4$ सेमी का एक रेखाखण्ड खींचिए।





चित्र 11.12(i)

2. बिन्दु B को केन्द्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या का एक चाप काटिए।




चित्र 11.12(ii)

3. बिन्दु A को केन्द्र मानकर 3.5 सेमी का चाप चरण 2 में बनाए गए चाप पर काटिए। जहाँ ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं, उसे बिन्दु D से नामांकित कीजिए।




चित्र 11.12(iii)

4. बिन्दु D को पटरी की सहायता से A व B से मिलाइए।



चित्र 11.12(iv)

5. बिन्दु D व बिन्दु A से परकार की सहायता से क्रमशः 5 सेमी व 7 सेमी का चाप काटिए। जहाँ ये दोनों चाप कटते हैं उसे बिन्दु C से नामांकित कीजिए। बिन्दु C को क्रमशः बिन्दु B, D व A से मिलाइए।



चित्र 11.12(v)

अभीष्ट चित्र

इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ।

अभ्यास 2

इन्हें भी बनाएं (Solve these)

- आयत ABCD की रचना कीजिए जिसमें $AB = 5$ सेमी तथा $AC = 8$ सेमी।
(संकेत — आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।)

प्रश्नावली 11.2

- एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें $AB = 4$ सेमी, $BC = 3$ सेमी, $AD = 3.5$ सेमी, विकर्ण $AC = 5$ सेमी और $BD = 4$ सेमी हो। CD भुजा को नापिए।
- चतुर्भुज PQRS बनाइए जिसमें $PQ = 4.2$ सेमी, $QR = 3.6$ सेमी, $PS = 4.5$ सेमी, विकर्ण $PR = 6$ सेमी तथा $QS = 5.7$ सेमी हो।
- चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें $AB = 3.5$ सेमी, $BC = 3.1$ सेमी, $CD = 2.9$ सेमी, विकर्ण $AC = 4.9$ सेमी और $BD = 4.6$ सेमी हो।
- आयत PQRS की रचना कीजिए $PQ = 4.5$ सेमी तथा विकर्ण $PR = 6.5$ सेमी हो।


III. चतुर्भुज की रचना करना जब चार भुजाएँ व एक कोण दिया हो

III. Construction of a quadrilateral, when four sides and one angle are given.

उदाहरण 5. चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें $AB = 4.5$ सेमी, $BC = 3.5$ सेमी, $CD = 3.8$ सेमी, $AD = 4$ सेमी और $\angle A = 57^\circ$ हो।


हल:

दिए गए प्रश्न को ध्यान में रखकर कच्चा चित्र बनाइए और सम्बन्धित भुजा के नीचे माप लिखिए।




रचना:

1. $AB = 4.5$ सेमी का एक रेखाखण्ड खींचिए।




चित्र 11.14 (i)

2. बिन्दु A पर चाँदों की सहायता से $\angle BAX = 57^\circ$ का कोण बनाइए।




चित्र 11.14 (ii)

3. परकार की सहायता से 4 सेमी त्रिज्या का चाप लेकर बिन्दु A से किरण XA पर काटिए। जहाँ चाप कटता है उस बिन्दु को D नाम दीजिए।




चित्र 11.14 (iii)

4. बिन्दु D तथा बिन्दु B से परकार की सहायता से क्रमशः 3.8 सेमी व 3.5 सेमी त्रिज्या के चाप काटिए। प्रतिच्छेद बिन्दु को C से नामांकित कीजिए।



चित्र 11.14 (iv)

5. बिन्दु C को बिन्दु B व बिन्दु D से पटरी की सहायता से मिलाइए।




चित्र 11.14 (v)

अभीष्ट चित्र

इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ।

उदाहरण 6. एक समान्तर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें $AB = 5$ सेमी, $BC = 4$ सेमी तथा $\angle B = 110^\circ$ हो

हल: प्रश्न को ध्यान में रखकर एक समान्तर चतुर्भुज ABCD का कच्चा चित्र बनाइये। जिसमें $AB = 5$ सेमी, $BC = 4$ सेमी तथा $\angle B = 110^\circ$ नामांकित कीजिए।




चित्र 11.15(i)


कच्चा चित्र A

यहाँ पर दो भुजा व एक कोण दिया है जबकि किसी भी चतुर्भुज को बनाने के लिए पाँच अवयवों की आवश्यकता होती है।

चूँकि समान्तर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसलिए चार भुजाएं और एक कोण का मान हमें ज्ञात हो सकता है।



चित्र 11.15(ii) कच्चा चित्र B



चित्र 11.16

रचना के पद:

1. सर्वप्रथम $AB = 5$ सेमी का एक रेखाखण्ड खींचिए।
 2. फिर बिन्दु B पर चाँदे की सहायता से $\angle ABX = 110^\circ$ का कोण बनाइए।
 3. परकार से 4 सेमी त्रिज्या का चाप बिन्दु B से किरण BX पर काटिए। जिस बिन्दु पर चाप कटा उसे C बिन्दु से नामांकित कीजिए।
 4. बिन्दु A व बिन्दु C से क्रमशः 4 सेमी व 5 सेमी त्रिज्या के चाप काटिए। जहाँ ये चाप कटें, उसे D बिन्दु से नामांकित कीजिए।
 5. D को A व C से मिलाइए।
- इस प्रकार ABCD अभीष्ट समान्तर चतुर्भुज की रचना हुई।

अभ्यास 3

इन्हें भी बनाएं (Solve these)

1. समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें $AB = 5$ सेमी तथा $\angle A = 70^\circ$ हो।
2. आयत PQRS की रचना कीजिए जिसमें $PQ = 4$ सेमी तथा $QR = 3$ सेमी हो।
3. वर्ग LMNO की रचना कीजिए जिसमें $LM = 2.8$ सेमी हो।

प्रश्नावली 11.3


1. चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें $AB = 5.4$ सेमी, $BC = 4.8$ सेमी, $CD = AD = 5$ सेमी और $\angle A = 120^\circ$ हो।
2. चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें $AB = 3$ सेमी, $BC = 4$ सेमी, $CD = 3.5$ सेमी, $DA = 4.2$ सेमी तथा $\angle A = 60^\circ$ हो।
3. समान्तर चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें $PQ = 5.4$ सेमी, $QR = 3.8$ सेमी, $\angle P = 75^\circ$ हो।
4. समचतुर्भुज STUV की रचना कीजिए जिसमें $ST = 4$ सेमी एवं $\angle S = 60^\circ$ हो।

IV. चतुर्भुज की रचना जबकि तीन भुजाएँ एवं दो अन्तर्गत कोण दिए हो।

IV. Construction of quadrilateral when three sides and two internal angle are given -

उदाहरण 7. चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें $AB = 3.6$ सेमी, $BC = 4$ सेमी, $CD = 4.5$ सेमी, $\angle B = 60^\circ$ व $\angle C = 90^\circ$ हो।

हल: प्रश्न को ध्यान में रखकर एक कच्चा चित्र बनाइए। इस पर भुजाएँ व कोण की दी गई जानकारी के अनुसार अंकित कीजिए।




चित्र 11.17



रचना :

1. सर्वप्रथम $AB = 3.6$ सेमी का एक रेखाखण्ड खींचिए।
2. बिन्दु B पर परकार की सहायता से $\angle ABX = 60^\circ$ का कोण बनाइए।
3. $\overrightarrow{BX}$ पर बिन्दु B से 4 सेमी त्रिज्या का चाप काटिए। जहाँ ये चाप कटता है उसे C से नामांकित कीजिए।



चित्र 11.18

4. बिन्दु C पर परकार की सहायता से $\angle BCY = 90^\circ$ का कोण बनाइए।
5. बिन्दु C से 4.5 सेमी का चाप लेकर CY पर काटिए, जहाँ ये चाप कटता है उसे D से नामांकित कीजिए।
6. D को A से मिलाइए।
इस प्रकार ABCD अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ।

प्रश्नावली 11.4

1. एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें $AB = 4.5$ सेमी, $BC = 3.5$ सेमी, $AD = 5$ सेमी, $\angle A = 60^\circ$ और $\angle B = 110^\circ$ हो। भुजा CD को नापिये।
2. चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए, जिसमें $PQ = 3.5$ सेमी, $QR = 2.5$ सेमी, $RS = 4.1$ सेमी, $\angle Q = 75^\circ$ और $\angle R = 120^\circ$ हो, भुजा PS को नापिये।
3. एक चतुर्भुज EFGH की रचना कीजिए जिसमें $EF = 3$ सेमी, $HE = 5$ सेमी, $FG = 7$ सेमी, $\angle E = 90^\circ$ और $\angle H = 120^\circ$ हो, भुजा GH को नापिए।

V. चतुर्भुज की रचना जबकि इसकी संलग्न दो भुजाएँ व तीन कोण दिये हों


V. Construction of a quadrilateral when two adjacent sides and three angle are given.

उदाहरण 8. चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें $AB = 5$ सेमी, $BC = 4.5$ सेमी, $\angle A = 65^\circ$, $\angle B = 120^\circ$ और $\angle C = 75^\circ$


हल: प्रश्न में दी गई नाप के अनुसार कच्चा चित्र बनाइये।
इस पर भुजाएँ व कोण, दी गई जानकारी के अनुसार लिखिए।

रचना के पद

1. सर्वप्रथम रेखाखण्ड $\overline{AB} = 5$ सेमी बनाते हैं।
2. बिन्दु A पर चाँदों की सहायता से $\angle BAX = 65^\circ$ बनाते हैं।
3. बिन्दु B पर परकार अथवा चाँदा की सहायता से $\angle ABY = 120^\circ$ बनाते हैं।
4. बिन्दु B को केन्द्र मानकर किरण $\overline{BY}$ में 4.5 सेमी त्रिज्या का चाप काटते हैं। कटान बिन्दु C प्राप्त हुआ।
5. बिन्दु C पर परकार की सहायता से $\angle BCZ = 75^\circ$ बनाते हुये किरण CZ खींचते हैं जो किरण AX को बिन्दु D पर काटती है।



चित्र 11.19 कच्चा चित्र



चित्र 12.20

इस प्रकार प्राप्त चतुर्भुज ABCD वांछित चतुर्भुज है।


उदाहरण 9. चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें $AB = 4$ सेमी, $BC = 3.6$ सेमी, $\angle A = 60^\circ$, $\angle C = 90^\circ$ और $\angle D = 100^\circ$

हल: सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाकर प्रश्न में दिए गए नाप को सम्बन्धित भुजा व कोण पर लिखिए।

कच्चा चित्र से स्पष्ट है कि जब तक हमें $\angle B$ का मान ज्ञात न हो, केवल दो संलग्न भुजाओं से ही चतुर्भुज ABCD की रचना असंभव है।

हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360° होता है।


$$\begin{aligned}\text{अतः चौथा कोण } \angle B &= 360^\circ - (60^\circ + 100^\circ + 90^\circ) \\ &= 360^\circ - 250^\circ \\ &= 110^\circ\end{aligned}$$



चित्र 11.21

रचना के पद

1. सर्वप्रथम रेखाखण्ड $AB = 4$ सेमी बनाते हैं।
2. बिन्दु A पर परकार की सहायता से $\angle BAX = 60^\circ$ बनाते हैं।
3. बिन्दु B पर $\angle ABY = 110^\circ$ बनाते हैं।
4. बिन्दु B को केन्द्र मानकर $\overrightarrow{BY}$ में 3.6 सेमी त्रिज्या का चाप काटते हैं और कटान बिन्दु C प्राप्त करते हैं।
5. बिन्दु C पर परकार की सहायता से $\angle BCZ = 90^\circ$ बनाते हुये किरण $\overrightarrow{CZ}$ खींचते हैं जो किरण $\overrightarrow{AX}$ को बिन्दु D पर काटती है।



चित्र 11.22

इस प्रकार प्राप्त चतुर्भुज ABCD ही वांछित चतुर्भुज है।

हमने विभिन्न स्थितियों में चतुर्भुज की रचना करना सीखा, जिसमें चतुर्भुज की पाँच मापें दी गई थीं। यदि चतुर्भुज की एक भुजा व चार कोण दिए जायें (इसमें भी चतुर्भुज के पाँच अवयव दिये हैं)। तो क्या ऐसी स्थिति में भी एक चतुर्भुज की रचना की जा सकती है? बनाने का प्रयास कीजिए।

हमीदा ने दी गई भुजा के समान माप का रेखाखण्ड खींचा तथा रेखाखण्ड के दोनों सिरों पर दिए गए माप के बराबर कोण बनाये। इस प्रकार उसे चतुर्भुज की आधार वाली भुजा तथा आधार के साथ बनने वाली दो भुजाएं (रेखाखण्ड) प्राप्त हुईं। अब हमीदा के पास प्रश्न यह था कि


वह चौथी भुजा बनाने के लिए कोण किस बिन्दु पर बनाए?

क्या आप बता सकते हैं कि किरण BX के किस बिन्दु पर $\angle C$ बनेगा?

या किरण $\overrightarrow{AY}$ के किस बिन्दु पर $\angle D$ बनेगा?

सोचिए और अपने शिक्षक तथा साथियों से चर्चा कीजिए।

आपने चर्चा एवं क्रियाकलाप से यह पाया होगा कि किरण $\overrightarrow{BX}$ के किसी भी बिन्दु पर यदि $\angle C$ बनाया जाए या किरण $\overrightarrow{AY}$ के किसी भी बिन्दु पर $\angle D$ बनाया जाए तो चतुर्भुज बनता है। इस प्रकार अनेक चतुर्भुज बन सकते हैं परन्तु एक अद्वितीय नहीं।



चित्र 11.23

प्रश्नावली 11.5

1. एक चतुर्भुज ABCD बनाइये जिसमें $AB = 3.5$ सेमी, $BC = 4$ सेमी, $\angle A = 105^\circ$, $\angle B = 90^\circ$ एवं $\angle C = 75^\circ$ हो।
2. चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए, जिसमें $PQ = 4.5$ सेमी, $QR = 5$ सेमी, $\angle P = 100^\circ$, $\angle R = 75^\circ$ और $\angle S = 110^\circ$ हो।
3. चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें $AB = 6$ सेमी, $BC = 3.5$ सेमी, $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 110^\circ$ और $\angle D = 90^\circ$ हो, भुजा CD को नापिये।

VI. विशेष प्रकार के चतुर्भुज की रचना

VI. Special type of quadrilateral and their construction

A- समान्तर चतुर्भुज की रचना जब एक भुजा व दोनों विकर्ण दिये हों

A- **Construction of a parallelogram when one side and two diagonal are given.**

उदाहरण 10. समान्तर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें $AB = 5$ सेमी, $AC = 5.6$ सेमी तथा $BD = 7.6$ सेमी।


हल : प्रश्न को ध्यान में रखकर कच्चा चित्र बनाइए और दी गई भुजाओं के नाप उनके साथ लिखिए।

क्या आप इस समान्तर चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं?


हम जानते हैं कि समान्तर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे

को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात् $OA = OC = \frac{5.6}{2} = 2.8$

सेमी तथा $OB = OD = \frac{7.6}{2} = 3.8$ सेमी




चित्र 11.24



चित्र 11.25 कच्चा चित्र

रचना:

1. सर्वप्रथम $AB = 5$ सेमी का एक रेखाखण्ड खींचिए।





चित्र 11.26 (i)

2. बिन्दु A से 2.8 सेमी त्रिज्या का चाप काटिए।




चित्र 11.26 (ii)

3. अब B बिन्दु से 3.8 सेमी त्रिज्या का चाप, चरण 2 में काटे गये चाप पर काटिए। जहाँ ये दोनों चाप कटते हैं वह O बिन्दु होगा।




चित्र 11.26(iii)

4. बिन्दु A तथा बिन्दु B को O से मिलाते हुए क्रमशः X व Y तक बढ़ाइए।




चित्र 11.26(iv)

5. बिन्दु O से $\overline{OX}$ तथा $\overline{OY}$ पर क्रमशः 2.8 सेमी तथा 3.8 सेमी त्रिज्या के चाप काटिए।
चापों के कटान बिन्दु को क्रमशः बिन्दु C व बिन्दु D से नामांकित कीजिए।



चित्र 11.26(v)

6. बिन्दु C को बिन्दु B से, बिन्दु D को बिन्दु A से और बिन्दु C को बिन्दु D से मिलाइए।



चित्र 11.26(vii) अभीष्ट चतुर्भुज




इस प्रकार अभीष्ट समान्तर चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ।

B. समचतुर्भुज की रचना कीजिए जबकि उसके दोनों विकर्ण दिए हों

B. Construct a Rhombus when both the diagonals are given:-

उदाहरण 11. समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसके विकर्ण $AC = 6$ सेमी तथा $BD = 8$ सेमी हों।

हल : सर्वप्रथम प्रश्न को ध्यान में रखकर एक कच्चा चित्र ABCD बनाइए।




चित्र 11.27 कच्चा चित्र

क्या आप बता सकते हैं कि इस समचतुर्भुज को कैसे बनाएंगे।

हमने चतुर्भुज के गुण में पढ़ा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस आधार पर हम यहाँ सम चतुर्भुज की रचना करेंगे।


रचना :

1. सर्वप्रथम $AC = 6$ सेमी का रेखाखण्ड खींचिए।




चित्र 11.28(i)

2. रेखाखण्ड AC का समद्विभाजन कीजिए। AC की समद्विभाजक रेखा XY इसे O पर काटती है। यह बिन्दु O विकर्णों का समद्विभाजक बिन्दु है।




चित्र 11.28(ii)

3. बिन्दु O से $OD = OB = \frac{8}{2} = 4$ सेमी त्रिज्या का चाप ऊपर व नीचे दोनों तरफ काटिए।
तथा ऊपर एवं नीचे क्रमशः B एवं D से नामांकित कीजिए



चित्र 11.28(iii)

4. बिन्दु B व बिन्दु D को बिन्दु A व बिन्दु C दोनों से मिलाइए।



चित्र 11.28(iv)

इस प्रकार अभीष्ट समचतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ।



प्रश्नावली 11.6

1. एक वर्ग ABCD की रचना कीजिए जिसका विकर्ण $AC = 7$ सेमी हो।
2. समान्तर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें $AB = 4$ सेमी, विकर्ण $AC = 6.2$ सेमी तथा विकर्ण $BD = 8.4$ सेमी हो।
3. समचतुर्भुज EFGH की रचना कीजिए जिसमें विकर्ण $EG = 7$ सेमी, विकर्ण $FH = 8.4$ सेमी हो।
4. वर्ग PQRS की रचना कीजिए जिसमें विकर्ण $PR = 5$ सेमी हो।

हमने सीखा (We have learnt)

1. एक विशिष्ट चतुर्भुज की रचना के लिए चतुर्भुज के कम से कम पाँच अवयवों की माप ज्ञात होना आवश्यक है, जिनमें अधिकतम तीन कोण हों।
2. चतुर्भुज की रचना के पूर्व कच्चा रेखाचित्र बनाकर अवयवों की मापों को अंकित कर देना उपयोगी रहता है।
3. किसी अद्वितीय चतुर्भुज की रचना की जा सकती है यदि चतुर्भुज की :
(i) चार भुजाएँ व एक विकर्ण दिया हो।

- (ii) तीन भुजाएँ व दो विकर्ण दिये हों।
 - (iii) चार भुजाएँ व एक कोण दिया हो।
 - (iv) तीन भुजाएँ व दो अंतर्गत कोण दिये हों।
 - (v) दो आसन्न भुजाएं व तीन कोण दिये हों।
4. यदि चतुर्भुज की एक भुजा व चार कोण दिये हों तो एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना नहीं की जा सकती।
5. चतुर्भुज की रचना तभी संभव है यदि उसकी माप निम्न शर्त को संतुष्ट करे :
- (i) चतुर्भुज की किन्हीं तीन भुजाओं का योग चौथी भुजा से अधिक हो।
 - (ii) चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360° हो।

अध्याय-12

समीकरण

EQUATION



पिछली कक्षा में आप निम्न प्रकार के समीकरणों को हल कर चुके हैं। आइये, कुछ और सरल समीकरणों को हल करें।

क्र.सं.	समीकरण	समीकरण का हल
1.	$3x + 9 = 12$	$x = 1$
2.	$3x + 5 = 8$	-----
3.	$5x + 9 = 2x + 12$	-----
4.	$6x + 18 = 24$	-----
5.	$x + 3 = 4$	-----

ऊपर के समीकरणों को हल करते हुए शैली ने अनु से कहा कि सभी समीकरणों के हल $x = 1$ प्राप्त हो रहे हैं। समीकरण तो अनेक हैं, लेकिन सभी समीकरणों के हल एक ही है, ऐसा क्यों?

इन समीकरणों को ध्यान से देखिए। आप पाते हैं कि पहले समीकरण से ही दूसरा समीकरण बना है, पहले समीकरण के दोनों पक्षों में 4 घटाने पर दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ है। अतः दोनों समीकरणों का हल एक ही है। इसी प्रकार, पहले समीकरण के दोनों पक्षों में $2x$ जोड़ने पर तीसरा समीकरण प्राप्त हुआ।

पहले समीकरण में 2 का गुणा तथा 3 का भाग देने पर क्रमशः चौथा और पाँचवाँ समीकरण प्राप्त हुआ है। तभी रहीम ने कहा – चूँकि प्रत्येक बार समान संख्या से एक ही प्रकार की संक्रिया दोनों पक्षों में की जा रही है, इसलिए उसका हल नहीं बदल रहा है।

अतः

- (i) किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने या घटाने पर,
- (ii) किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में समान शून्येत्तर (जो शून्य न हो) संख्या का गुणा या भाग करने पर, समीकरण के हल में कोई अन्तर नहीं आता।

किसी समीकरण के दोनों पक्षों में शून्य से गुणा करने अथवा शून्य से भाग देने पर क्या होगा? सोचिए, अपने साथियों एवं अध्यापक से चर्चा कीजिए।

क्रियाकलाप—1. (Activity -1)

अब आप भी नीचे दी गई सारणी में निर्देशानुसार नया समीकरण बनाइये।

सारणी 12.1 (Table 12.1)

क्र.सं.	समीकरण	दोनों पक्षों में की जाने वाली संक्रियाएं	नया समीकरण
1.	$5x + 6 = 11$	5 जोड़ने पर	$5x + 11 = 16$
2.	$17x - 8 = 22$	$4x$ घटाने पर	-----
3.	$4x - 5 = 2x + 9$	6 जोड़ने पर	-----
4.	$3x + 2 = 5$	2 गुणा करने पर	-----
5.	$6x + 15 = 9$	3 से भाग देने पर	-----
6.	$2x - 7 = 11$	$3x$ जोड़ने पर	-----

आप पिछली कक्षा में निम्न प्रकार के समीकरण भी हल कर चुके हैं —

जैसे, $\frac{x}{7} = 3$ को हल करने के लिए बाएँ पक्ष के हर से 7 हटाना होगा, इस हेतु समीकरण के दोनों पक्षों में 7 का गुणा करते हैं—

$$\text{अर्थात् } \frac{x}{7} \times 7 = 3 \times 7$$

$$\Rightarrow x = 21$$

अब यदि समीकरण $\frac{7}{x} = 1$ हो, तो आप इसे कैसे हल करेंगे?

यहाँ भी समीकरण के हर से x हटाने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों में x का गुणा करना होगा। इस प्रकार, बीजीय हर वाली समीकरण से हर को विलोपित किया जाता है।

नीचे सारणी में दिए गए निर्देशों के अनुसार समीकरणों को हल कीजिए—

सारणी 12.2

क्र.सं.	समीकरण	समीकरण के एक पक्ष को अंश/हर के रूप में लिखने पर	दोनों पक्षों में हर को गुणा करने पर	समीकरण को रेखिय रूप में लिखने पर	चर एवं अचर का पक्षान्तर करने पर	हल
1.	$\frac{8x+5}{2x+7} - 3 = 0$	$\frac{8x+5}{2x+7} = 3$	$\frac{(8x+5)(2x+7)}{2x+7} = 3(2x+7)$	$8x + 5 = 6x + 21$	$8x - 6x = 21 - 5$	$x = 8$
2.	$\frac{9x}{x+5} = 4$					
3.	$\frac{2y+9}{3y+10} - 3 = 0$					
4.	$\frac{3(x-3)}{x+4} = 2$					

वास्तव में इस प्रकार के प्रश्न $\frac{ax+b}{cx+d} = k$ के रूप में हैं। जहाँ a, b, c, d एवं k पूर्णांक हैं एवं x चर राशि है तथा $cx + d \neq 0$

$\frac{ax+b}{cx+d} = k$ प्रकार के समीकरणों का हल—

समीकरण $\frac{6x+2}{4x+1} = 2$ भी एकचरीय समीकरण है। इस समीकरण के हर में भी चर राशि है। व्यापक समीकरण $\frac{ax+b}{cx+d} = k$ से तुलना करने पर $a = 6, b = 2, c = 4, d = 1$ एवं $k = 2$ है।

इस प्रकार के समीकरणों को हल करना आप सीख चुके हैं। आइए, कुछ और समीकरणों को हल करें —

उदाहरण 1. समीकरण $\frac{2x+5}{3x+1} = \frac{3}{11}$ को हल कीजिए।

हल: दिये गये समीकरण $\frac{2x+5}{3x+1} = \frac{3}{11}$

समीकरण के दोनों पक्षों में $(3x+1)$ से गुणा करने पर,

$$\frac{2x+5}{3x+1} \times (3x+1) = \frac{3}{11} \times (3x+1)$$

$$\Rightarrow 2x + 5 = \frac{3}{11}(3x+1) \quad (\text{चरण 1})$$

दायें पक्ष के हर से 11 विलोपित करने हेतु समीकरण के दोनों पक्षों में 11 का गुणा करने पर,

$$11 \times (2x + 5) = \frac{3}{11}(3x+1) \times 11$$

$$\Rightarrow 11(2x + 5) = 3(3x + 1) \quad (\text{चरण 2})$$

$$\Rightarrow 22x + 55 = 9x + 3 \quad (\text{कोष्ठक हल करने पर})$$

$$\Rightarrow 22x - 9x = 3 - 55$$

$$\Rightarrow 13x = -52$$

$$\Rightarrow x = \frac{-52}{13}$$

$$\Rightarrow x = -4$$

$$\begin{aligned}
 \text{जाँच: बायाँ पक्ष} &= \frac{2x+5}{3x+1} \\
 &= \frac{2(-4)+5}{3(-4)+1} \\
 &= \frac{-8+5}{-12+1} \\
 &= \frac{-3}{-11} \\
 &= \frac{3}{11} \\
 &= \text{दायाँ पक्ष}
 \end{aligned}$$

अतः प्राप्त हल $x = -4$ ही दिये गये समीकरण का अभीष्ट हल है।

उपरोक्त उदाहरण में आप देख रहे हैं कि बाएँ पक्ष का हर $(3x+1)$ चरण, (1) में वहाँ से विलोपित होकर दाएँ पक्ष के अंश से गुणा हो जाता है। इसी प्रकार, दाएँ पक्ष का हर 11 चरण, (2) से विलोपित होकर बाएँ पक्ष के अंश से गुणा हो जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को वज्रगुणन कहते हैं।

इस प्रकार के प्रश्नों को वज्रगुणन या तिर्यक गुणन का उपयोग करके भी हल किया जा सकता है।

उदाहरण 2. समीकरण $\frac{5-7y}{2+4y} = \frac{-8}{7}$ को हल कीजिए।

हल: दिये गये समीकरण—

$$\frac{5-7y}{2+4y} = \frac{-8}{7}$$

वज्र गुणा या तिर्यक गुणा करने पर,

$$7 \times (5-7y) = -8 \times (2+4y)$$

$$\text{या } 35 - 49y = -16 - 32y$$

$$\text{या } -49y + 32y = -16 - 35 \quad (\text{पक्षान्तर करने पर})$$

$$\text{या } -17y = -51$$

$$\text{या } y = \frac{-51}{-17}$$

$$y = 3$$

उत्तर की जाँच आप स्वयं कीजिए।

$$\frac{5-7y}{2+4y} \times \frac{7}{7} = \frac{-8}{7} \times \frac{2+4y}{2+4y}$$

(वज्र गुणन या तिर्यक गुणा)

उदाहरण 3. समीकरण $\frac{y - (7 - 8y)}{9y - (3 + 4y)} = \frac{11}{7}$ को हल कीजिए।

हल: दिये गये समीकरण

$$\frac{y - (7 - 8y)}{9y - (3 + 4y)} = \frac{11}{7}$$

या $\frac{y - 7 + 8y}{9y - 3 - 4y} = \frac{11}{7}$ (कोष्ठक हल करने पर)

या $\frac{9y - 7}{5y - 3} = \frac{11}{7}$

$\frac{9y - 7}{5y - 3} \times = \frac{11}{7}$ (वज्रगुणन करने पर)

या $7 \times (9y - 7) = 11 \times (5y - 3)$
 $63y - 49 = 55y - 33$ (कोष्ठक हल करने पर)

या $63y - 55y = -33 + 49$ (पक्षान्तर करने पर)

या $8y = 16$

या $y = \frac{16}{8}$

$\Rightarrow y = 2$

उत्तर की जाँच आप स्वयं कीजिए।

उदाहरण 4. समीकरण—

$$\frac{x + 0.5}{0.3x} = 20 \text{ हल कीजिए।}$$

हल: दिये गए समीकरण—

$$\frac{x + 0.5}{0.3x} = \frac{20}{1}$$

$\frac{x + 0.5}{0.3x} \times = \frac{20}{1}$

वज्र गुणन करने पर

$$1 \times (x + 0.5) = 20 \times 0.3x$$

या $x + 0.5 = 6x$

$$\text{या } 6x = x + 0.5$$

$$\text{या } 6x - x = 0.5 \quad (\text{पक्षान्तर करने पर})$$

$$\text{या } 5x = 0.5$$

$$5x = \frac{5}{10}$$

$$\text{या } x = \frac{5}{10} \times \frac{1}{5} \quad (\text{गुणा 5 का पक्षान्तरण करने पर})$$

$$\text{या } x = \frac{1}{10}$$

$$\text{या } x = 0.1$$

अतः दिये गये समीकरण का अभीष्ट हल $x = 0.1$ है।

प्रश्नावली 12.1 (Exercise 12.1)

निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए।

$$(1) \quad \frac{4x+18}{5x} = 2$$

$$(2) \quad \frac{5x+2}{2x+3} = \frac{7}{5}$$

$$(3) \quad \frac{7m+6}{4m+2} = 2$$

$$(4) \quad \frac{x-3}{x+2} = \frac{-3}{7}$$

$$(5) \quad \frac{2y-5}{3y+1} = \frac{3}{13}$$

$$(6) \quad \frac{8-3y}{5y+2} = \frac{1}{6}$$

$$(7) \quad \frac{17-2k}{k-5} = -3$$

$$(8) \quad \frac{4x-(x+7)}{3x-(5x-9)} = \frac{2}{3}$$

$$(9) \quad \frac{1.5x+0.3}{3x} = \frac{3}{10}$$

दैनिक जीवन में समीकरण के अनुप्रयोग (Application of Equations in daily life)

हमारे दैनिक जीवन में भी कई समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं में ज्ञात, अज्ञात राशि या संख्याओं में कुछ सम्बन्ध होते हैं। इन सम्बन्धों को समीकरण बनाकर आसानी से हल कर सकते हैं। समीकरण हल करने के महत्वपूर्ण चरण निम्न हैं :—

1. प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ज्ञात एवं अज्ञात राशि की पहचान करते हैं।
2. अज्ञात राशियों को x, y, z आदि अक्षरों से निरूपित करते हैं।
3. शाब्दिक समस्या के कथनों को गणितीय कथन में परिवर्तित कर समीकरण बनाते हैं।
4. समीकरण को हल करके अज्ञात राशि का मान ज्ञात करते हैं।
आइये, उपरोक्त प्रक्रिया को उदाहरणों से समझें।

उदाहरण 5. दो संख्याओं का योग 35 है एवं दोनों संख्याओं का अनुपात 1 : 4 है। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए।

हल: माना कि पहली संख्या x है।

प्रथम शर्तानुसार,

चूँकि दोनों संख्याओं का योग = 35

$$\Rightarrow x + \text{दूसरी संख्या} = 35$$

$$\Rightarrow \text{दूसरी संख्या} = 35 - x$$

द्वितीय शर्तानुसार,

संख्याओं का अनुपात = 1 : 4

$$\text{या } \frac{x}{35-x} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{x}{35-x} \times \frac{4}{4} = \frac{1}{4}$$

(तिर्यक गुणन)

$$\text{या } 4x = 35 - x$$

$$\text{या } 4x + x = 35$$

(x का पक्षान्तर करने पर)

$$\text{या } 5x = 35$$

$$\text{या } x = \frac{35}{5}$$

(5 का पक्षान्तर करने पर)

$$\text{या } x = 7$$

अतः एक संख्या = 7

एवं दूसरी संख्या = $35 - 7 = 28$

जाँच :

$$1. \text{ दोनों संख्याओं का योग } = 7 + 28 = 35$$

$$2. \text{ दोनों संख्याओं का अनुपात } = \frac{7}{28} = \frac{1}{4}$$

अतः हमारा हल सही है।

उदाहरण 6.

एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 4 अधिक है। अंश में 6 जोड़ने एवं हर में 3 घटाने पर संख्या $\frac{3}{2}$ हो जाती है। वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए।

हल: माना कि अंश x है

तो हर = $x + 4$

$$\text{अतः परिमेय संख्या} = \frac{\text{अंश}}{\text{हर}} = \frac{x}{x+4}$$

अंश में 6 जोड़ने पर $= x + 6$

हर में 3 घटाने पर $= (x + 4) - 3 = x + 1$

$$\therefore \text{नई परिमेय संख्या} = \frac{x+6}{x+1}$$

शर्तानुसार, नई संख्या $\frac{3}{2}$ हो जाती है।

$$\frac{x+6}{x+1} = \frac{3}{2}$$

तिर्यक गुणा करने पर

$$\frac{x+6}{x+1} \times \frac{2}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{या} & 2(x+6) & = 3(x+1) \\ & 2x+12 & = 3x+3 \\ \text{या} & 2x-3x & = 3-12 \\ & -x & = -9 \\ & x & = 9 \end{array}$$

$$\text{अतः अभीष्ट परिमेय संख्या} = \frac{x}{x+4} = \frac{9}{9+4} = \frac{9}{13}$$

जाँच

1. $13 - 9 = 4$ अर्थात् हर, उसके अंश से 4 अधिक है।
2. 6 जोड़ने पर अंश $= 9 + 6 = 15$
3 घटाने पर हर $= 13 - 3 = 10$

$$\text{नई संख्या} = \frac{15}{10} = \frac{3}{2}$$

अतः हमारा हल सही है।

उदाहरण 7. दो अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। अंकों को उलटने से प्राप्त नवीन संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए।

हल : माना कि इकाई का अंक x है,

तो प्रश्नानुसार, इकाई अंक + दहाई अंक $= 12$

$$\Rightarrow x + \text{दहाई का अंक} = 12$$

$$\Rightarrow \text{दहाई का अंक} = 12 - x$$

$$\begin{aligned} \text{अतः मूल संख्या} &= 10 \times (\text{दहाई का अंक}) + \text{इकाई का अंक} \\ &= 10 \times (12 - x) + x && [\text{स्थानीयमान के अनुसार}] \\ &= 120 - 10x + x \\ &= 120 - 9x \end{aligned}$$

अब अंकों को उलटने पर इकाई अंक, दहाई एवं दहाई अंक, इकाई अंक बन जायेगा।

अतः इकाई अंक $= 12 - x$

एवं दहाई अंक $= x$

$$\begin{aligned}\text{तब नवीन संख्या} &= 10 \times x + (12 - x) \\ &= 10x + 12 - x \\ &= 9x + 12\end{aligned}$$

शर्तानुसार, नवीन संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है।

अर्थात् नवीन संख्या $=$ मूल संख्या $+ 18$

$$9x + 12 = 120 - 9x + 18$$

$$9x + 12 = 138 - 9x$$

$$9x + 9x = 138 - 12 \quad (\text{पक्षान्तर करने पर})$$

$$18x = 126$$

$$x = \frac{126}{18} \text{ या } x = 7$$

$$\begin{aligned}\text{अतः मूल संख्या} &= 120 - 9x \\ &= 120 - 9 \times 7 \\ &= 120 - 63 = 57\end{aligned}$$

जाँच: स्वयं करके देखिए।

उदाहरण 8. दो संख्याओं में $3 : 5$ का अनुपात है। प्रत्येक में से 4 घटाने पर यह अनुपात $5 : 9$ हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए।

हल: माना कि पहली संख्या $= 3x$

एवं दूसरी संख्या $= 5x$

पहली संख्या में से 4 घटाने पर $= 3x - 4$ एवं

दूसरी संख्या में से 4 घटाने पर $= 5x - 4$

शर्तानुसार, प्रत्येक संख्या में से 4 घटाने पर उनका अनुपात $= \frac{5}{9}$

$$\Rightarrow \frac{3x-4}{5x-4} = \frac{5}{9}$$

$$\frac{3x-4}{5x-4} \times \frac{9}{9} = \frac{5}{9} \quad (\text{वज्र गुणा करने पर})$$

$$9 \times (3x - 4) = 5(5x - 4)$$

$$\Rightarrow 27x - 36 = 25x - 20 \quad (\text{कोष्ठक हल करने पर})$$

$$\Rightarrow 27x - 25x = -20 + 36 \quad (\text{पक्षान्तर करने पर})$$

$$\Rightarrow 2x = 16$$

$$\Rightarrow x = \frac{16}{2} \text{ या } x = 8$$

$$\text{अतः पहली संख्या} = 3 \times 8 = 24$$

$$\text{एवं दूसरी संख्या} = 5 \times 8 = 40$$

$$\text{जाँच : 1. दोनों संख्याओं का अनुपात} = \frac{24}{40} = \frac{3}{5}$$

$$2. \text{ प्रत्येक में से 4 घटाने पर अनुपात} = \frac{24-4}{40-4} = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}$$

अतः हमारा हल सही है।

उदाहरण 9. पिता की वर्तमान आयु, पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात 19 : 39 हो जायेगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

हल: माना कि पुत्र की वर्तमान आयु = x वर्ष

तो पिता की वर्तमान आयु = $(x + 20)$ वर्ष

3 वर्ष बाद पुत्र की आयु = $(x + 3)$ वर्ष

3 वर्ष बाद पिता की आयु = $x + 20 + 3 = (x + 23)$ वर्ष

प्रश्नानुसार, 3 वर्ष बाद पुत्र तथा पिता की आयु का अनुपात = 19 : 39

$$\Rightarrow (x + 3) : (x + 23) = 19 : 39$$

$$\Rightarrow \frac{x+3}{x+23} \times = \frac{19}{39} \quad (\text{तिर्यक गुणा करने पर})$$

$$\Rightarrow 39(x + 3) = 19(x + 23)$$

$$\Rightarrow 39x + 117 = 19x + 437 \quad (\text{कोष्ठक हटाने पर})$$

$$\Rightarrow 39x - 19x = 437 - 117 \quad (\text{पक्षान्तर करने पर})$$

$$\Rightarrow 20x = 320$$

$$\Rightarrow x = \frac{320}{20} \quad (\text{दोनों पक्षों में 20 से भाग देने पर})$$

$$x = 16$$

अतः पुत्र की वर्तमान आयु = 16 वर्ष

एवं पिता की आयु = $x + 20$

$$= 16 + 20 = 36 \text{ वर्ष}$$

जाँच :

3 वर्ष बाद पुत्र की आयु = $16 + 3 = 19$ वर्ष

तथा 3 वर्ष बाद पिता की आयु = $36 + 3 = 39$ वर्ष

3 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात = 19 : 39

अतः हमारा उत्तर सही है।



प्रश्नावली 12.2

1. दो संख्याओं का योग 42 है एवं यदि दूसरी संख्या पहली की दुगुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए।
2. नीरज के पास मयंक से 3 गुने आम थे। यदि मयंक को 8 आम एवं नीरज को 6 आम और दिए जाए, तो मयंक और नीरज के आम का अनुपात 1 : 2 हो जाता है। बताइए दोनों के पास कितने-कितने आम थे।
3. दो समबाहु त्रिभुजों में से पहले त्रिभुज की भुजा, दूसरे त्रिभुज की भुजा से 3 सेमी अधिक है एवं दोनों त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात 5 : 2 है, तो त्रिभुजों की भुजाएं ज्ञात कीजिए।
4. दो अंकीय संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का तीन गुना है। यदि अंकों को उलट दिया जाए, तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए।
5. दो अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। अंकों को उलटने पर नई संख्या, मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए।
6. एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 2 अधिक है, यदि अंश 4 गुना कर दिया जाये और हर में 8 जोड़ दिया जाये तो नवीन संख्या $\frac{4}{3}$ हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए।
7. अनुराग और आकांक्षा की आयु का अनुपात 7 : 5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु 5 : 4 के अनुपात में हो जाती है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
8. मनीषा की मां की आयु, मनीषा की आयु की तिगुनी है। चार वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु से ढाई गुनी हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

हमने सीखा (We have learnt)

1. समीकरण के मान में कोई अन्तर नहीं आता, यदि समीकरण के दोनों पक्षों में –
 - (i) समान संख्या जोड़ दें।
 - (ii) समान संख्या घटा दें।
 - (iii) समान शून्येत्तर संख्या का गुणा कर दें।
 - (iv) समान शून्येत्तर संख्या का भाग दें।
2. $\frac{ax+b}{cx+d} = k$ जहाँ समीकरण में a, b, c, d एवं k पूर्णांक तथा $cx + d \neq 0$ हो, तो समीकरण एक चरीय समीकरण होता है।
3. $\frac{ax+b}{cx+d} = k$ जैसी समीकरणों को हल करने में वज्रगुणन विधि उपयोगी रहती है।
4. किसी शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए अज्ञात राशि को किसी चर से व्यक्त करते हैं एवं प्रश्नानुसार इसे बीजीय समीकरण में बदलकर समीकरण हल करते हैं।



अध्याय—13

प्रतिशतता के अनुप्रयोग

APPLICATION OF PERCENTAGE

भूमिका (Introduction)

हमने देखा था कि ब्याज की गणना करने में हमें यह पता होना चाहिए कि ब्याज की दर क्या है। सामान्यतः यह दर एक वर्ष में कुल राशि 100 रु. पर लगने वाले ब्याज के बराबर मानी जाती है। पूर्व में ब्याज दर व प्रतिशत पर हमने कई सवाल किए थे। हमने लाभ—हानि को भी ज्ञात किया था और क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में इसकी (दर की) गणना भी की थी। जितनी ज्यादा दर उतना अधिक लाभ/हानि अथवा ब्याज।

इन सबको दोहराने के लिए चलिए कुछ सवाल हल कर लें और कुछ बातें पुनः याद कर लें। इन सवालों को हल करके देखिए —

1. एक विद्यार्थी के 600 में से 396 अंक आए। बताइए उसे कितने प्रतिशत अंक मिले।
2. एक स्कूल में वर्ष 2004 में 80% छात्र उत्तीर्ण हुए। यदि 12 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो कुल छात्रों की संख्या बताइए।
3. रजनी ने 3500 रुपये में 8 कैलकुलेटर बेचे यदि उसे 500 रुपये का लाभ हुआ है तो प्रति कैलकुलेटर उसका लाभ प्रतिशत बताएं।
यह भी बताएँ कि उसका प्रति कैलकुलेटर क्रय मूल्य क्या था।
4. जमीला ने 50 कार्ड शीट 400 रु. की खरीदी। उसने 100 रु. के रंग, ब्रश आदि भी खरीद कर कार्ड शीट पर चित्र बनाए। इनमें से प्रत्येक कार्ड शीट से उसने 12 कार्ड बनाए और उन्हें 2-2 रु. में बेचा। उसे कितना लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत भी निकालें।
सलमा बोली— जमीला को लाभ नहीं हानि हुई है आप इसे कैसे समझाएंगे कि वास्तव में सही क्या है?
5. एक व्यापारी ने 50 किलो धान 1000 रु. में खरीदा और उसे साफ करवा कर एक—एक किलोग्राम की थैलियाँ बनवाई। इसमें उसको 200 रु. का खर्च हुआ। बाज़ार में बड़ी मात्रा में धान आने से दाम कम हो गए और उसके पैकेट 21 रु. किलो में ही बिक पाए। उसे लाभ हुआ या हानि, दर भी निकालें।
6. मोहन ने दो वर्ष बाद उधार धन लौटाते समय 500 रु. ब्याज दिया। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो उसने कितना धन उधार लिया था।
7. रीता ने 5000 रु. उधार दिए। दो वर्ष बाद 12% वार्षिक दर से ब्याज मिलने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी।

8. मोहन ने किसी सेठ को 4 वर्ष बाद 3024 रु. लौटाए। यदि ब्याज की दर 11% वार्षिक है तो बताइए कि उसने कितनी राशि उधार ली थी।

कक्षा छठवीं और सातवीं में हमने इस प्रकार की कई समस्याओं का हल ढूँढ़ा है। आइए, ऐसी ही एक नई समस्या का हल ढूँढ़ने का प्रयास करें।

चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest)

अखिलेश ने घर के किसी उत्सव के लिए 10,000 रु. बैंक से उधार लिए। उसे 10% वार्षिक दर से उस पर ब्याज देना था। उस साल उसकी आय कम हुई तो वह बैंक गया। उसने कहा— मैं इस वर्ष 11,000 रु. देने के बदले अगले वर्ष 12,000 रु. लौटा दूंगा। इस पर उसे बताया गया कि उसे 12,100 रु. लौटाने होंगे। अखिलेश ने कहा, ये 100 रु. अतिरिक्त क्यों ले रहे हैं, 12000 रुपये ही लीजिए।

इस पर बैंक अधिकारी ने बताया हम आपसे कोई अतिरिक्त रुपये नहीं ले रहे हैं। यह तो इस साल नहीं चुकाए गए ब्याज पर ब्याज है। अर्थात् 10,000 रु. पर एक साल में ब्याज हुआ 1000 रु.। चूंकि आपने ब्याज नहीं चुकाया तो अगले साल का कुल मूलधन 10,000 + 1000 याने 11,000 रु. हो गया। दूसरे वर्ष में हम 11,000 रु. पर ब्याज निकालेंगे। अखिलेश बोला और अगर मैं इस साल भी नहीं दे पाया तो फिर क्या ब्याज 12,100 रुपये पर निकालेंगे। पर यह कुछ अलग ही तरीका है। उसे बैंक वालों ने समझाया कि सामान्य तौर पर हम साधारण ब्याज की बात करते हैं जिसमें ब्याज मूलधन में नहीं जुड़ता, किन्तु स्वाभाविक तौर पर उधार देने वाला हमेशा ब्याज पर भी ब्याज लेता है। इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं।

अखिलेश को कितनी रकम देनी पड़ेगी उसके लिए यह तालिका देखें और इसी प्रकार दो अन्य मूलधनों के लिए तालिका की पूर्ति करें।

तालिका 13.1



क्रमांक	मूलधन	दर	पहले वर्ष		दूसरा वर्ष		तीसरा वर्ष	
			ब्याज	मिश्रधन	ब्याज	मिश्रधन	ब्याज	मिश्रधन
1.	10,000	10%	1000	11000	1100	12100	1210	13310
2.	80,000	5%						
3.	5,000	10%						

स्पष्ट है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अधिक होता है।

आइये, अब कुछ सवाल करें।

उदाहरण 1. 1500 रु. पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मिश्रधन भी ज्ञात कीजिए।

$$\begin{aligned}
 \text{प्रश्नानुसार पहले वर्ष के लिए} \quad P &= 1500 \text{ रु.} \\
 R &= 6\% \\
 T &= 1 \text{ वर्ष} \\
 \text{पहले वर्ष का ब्याज} &= \frac{P \times R \times T}{100} \\
 &= \frac{1500 \times 6 \times 1}{100} \\
 &= 90 \text{ रु.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{प्रथम वर्ष के अन्त में मिश्रधन} &= \text{मूलधन} + \text{ब्याज} \\
 &= 1500 + 90 \\
 &= 1590 \text{ रु.}
 \end{aligned}$$

प्रथम वर्ष के अन्त में मिश्रधन ही दूसरे वर्ष के लिए मूलधन होता है।

$$\begin{aligned}
 \text{अतः दूसरे वर्ष के लिए मूलधन} \quad P &= 1590 \text{ रु.} \\
 R &= 6\% \\
 T &= 1 \text{ वर्ष}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{दूसरे वर्ष के लिए ब्याज} &= \frac{P \times R \times T}{100} \\
 &= \frac{1590 \times 6 \times 1}{100} \\
 &= \frac{159 \times 6}{10} = 95.40 \text{ रु.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{चक्रवृद्धि ब्याज} &= \text{पहले वर्ष का ब्याज} + \text{दूसरे वर्ष का ब्याज} \\
 &= 90.00 + 95.40 \\
 &= 185.40 \text{ रु.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{मिश्रधन} &= \text{मूलधन} + \text{चक्र. ब्याज} \\
 &= 1500 + 185.40 \text{ रु.} \\
 &= 1685.40 \text{ रु.}
 \end{aligned}$$

इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए प्रत्येक वर्ष ब्याज की गणना करनी पड़ती है।

उदाहरण 2. 4000 रु. पर दो वर्ष के लिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन ज्ञात कीजिए।

हल: यहाँ मूलधन (P) = 4000 रु.

$$\text{दर} \quad (R) = 8\% \text{ या } \frac{8}{100}$$

समय (T) = 2 वर्ष

पहले एक वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है।

$$\begin{aligned}\text{पहले वर्ष का ब्याज} &= \frac{P \times R \times T}{100} \\ &= \frac{4000 \times 8 \times 1}{100} = 320 \text{ रु.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{प्रथम वर्ष के अन्त में मिश्रधन} &= \text{मूलधन} + \text{ब्याज} \\ &= 4000 + 320 \\ &= 4320 \text{ रु.}\end{aligned}$$

यही दूसरे वर्ष के लिए मूलधन होगा।

$$\begin{aligned}\text{दूसरे वर्ष का ब्याज} &= \frac{P \times R \times T}{100} \\ &= \frac{4320 \times 8 \times 1}{100} = 345.60 \text{ रु.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{दूसरे वर्ष के अन्त में मिश्रधन} &= \text{दूसरे वर्ष का मूलधन} + \text{ब्याज} \\ &= 4320 + 345.60 \text{ रु.} \\ &= 4665.60 \text{ रु.}\end{aligned}$$

प्रश्नावली 13.1 (Exercise 13.1)

प्र.1. चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।

- (i) 4000 रु. पर 2 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से।
- (ii) 6000 रु. पर 3 वर्ष के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से।
- (iii) 6250 रु. पर 2 वर्ष के लिए 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से।

प्र.2. मिश्रधन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष की जाती है।

- (i) 7500 रु. पर 2 वर्ष के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से।
- (ii) 2500 रु. पर 2 वर्ष के लिए 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से।
- (iii) 5120 रु. पर 2 वर्ष के लिए $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से।

प्र.3. एक किसान डीजल पंप लेने के लिए ग्रामीण बैंक से 5500 रु. 4% वार्षिक, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज लिया। वार्षिक गणना पर ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष पश्चात् किसान, बैंक को कितना रुपया देगा?

4. अनुराधा ने किसी संस्था में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8000 रु. जमा किए 3 वर्षों के बाद उसको मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए।

तिमाही एवं छःमाही गणना पर चक्रवृद्धि ब्याज

(Compound Interest on quarterly and half yearly calculations)

बैंकों में और कई अन्य कार्यों में ब्याज की गणना वार्षिक न होकर छः माही और कभी-कभी तिमाही होती है। इसका मतलब हुआ कि हर छः अथवा तीन माह में मूलधन बदलता जाता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझें —

उदाहरण 3. सकीना ने 4000 रु. बैंक में जमा करवाए। बैंक 5% वार्षिक दर से ब्याज देता है और ब्याज की गणना हर 6 माह में करता है। तो एक साल बाद उसके खाते में कितना पैसा होगा?

हल: यदि इस सवाल में ब्याज की गणना वार्षिक की जाए तो सकीना को साल भर में $\frac{4000 \times 5 \times 1}{100}$ अर्थात् 200 रु. ब्याज मिलता और उसके खाते में 4200 रु. हो जाते।

चूंकि ब्याज की गणना 6 महीने में होती है इसलिए हमें 6 महीने तक का ब्याज निकाल कर मूलधन में जोड़ना होगा।

$$6 \text{ महीने का ब्याज} = \frac{4000 \times 5}{100} \times \frac{6}{12} = 100 \text{ रु. [6 महीने को } \frac{6}{12} \text{ वर्ष भी लिख सकते हैं।]}$$

अतः 6 महीने के बाद के लिए मूलधन 4100 रु.

$$6 \text{ महीने से 12 महीने तक के लिए ब्याज} = \frac{4100 \times 5}{100} \times \frac{6}{12} = 102.50 \text{ रु.}$$

$$\text{अर्थात् साल भर बाद खाते में राशि} = 4000 + 100 + 102.50$$

$$\text{या } 4100 + 102.50 = 4202.50$$

जाहिर है कि 6 माह में गणना से 2 रु. 50 पैसा अतिरिक्त ब्याज मिला।

ब्याज की गणना जितने कम समय में होगी उतनी जल्दी ब्याज पर ब्याज लगना शुरू होगा और बकाया अथवा जमा राशि बढ़ती जाएगी।

प्रश्नावली 13.2

- प्र.1. एक बैंक घरेलू बचत खाते पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है यदि ब्याज प्रत्येक 6 माह में मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो नरेश को बैंक में 1600 रु. जमा करने पर एक वर्ष पश्चात् कितना ब्याज मिलेगा?
- प्र.2. अनामिका किसी वित्त कम्पनी में 24000 रु. 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से $1\frac{1}{2}$ वर्ष के लिए जमा कराता है। यदि ब्याज की गणना प्रति छः माही हो, तो परिपक्वता पर उसे

कल कितनी राशि प्राप्त होगी?

- प्र.3. 7500 रु. की राशि पर 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अन्तर ज्ञात कीजिए, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रत्येक छः महीने में होती है।
- प्र.4. 8000 रु. की राशि पर 5% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की गणना प्रति छः माही की जाती है।

चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र (Formula for Compound Interest)

जाहिर है कि जैसे-जैसे वर्ष बढ़ते जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए गणना लम्बी होती जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि इसके लिए एक सूत्र बना लें।

हम मूलधन के लिए P_1 (Principal amount) लिखते हैं। प्रतिमाह ब्याज की दर के लिए R (Rate) और समय के लिए T (Time) लिखते हैं।

अगर ब्याज की गणना वार्षिक होता है तो दूसरे वर्ष का मूलधन P_2 , प्रथम वर्ष के मूलधन P_1 और प्रथम वर्ष के ब्याज (I_1) का योग होगा।

अर्थात् दूसरे वर्ष के लिए मूलधन $P_2 = P_1 + I_1$

साथ ही पहले वर्ष का ब्याज $I_1 = \frac{P_1 \times R}{100}$ (यहाँ समय $T = 1$ वर्ष है)

इसका मतलब हुआ कि $P_2 = P_1 + I_1 = P_1 + \frac{P_1 \times R}{100} = P_1 \left(1 + \frac{R}{100}\right)$

$$\begin{aligned} \text{दूसरे वर्ष का ब्याज } I_2 &= \frac{P_2 \times R \times T}{100} \\ &= \frac{P_2 \times R}{100} \quad (\text{यहाँ समय } T = 1 \text{ वर्ष है।}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{तीसरे वर्ष का मूलधन} = P_2 + I_2 &= P_1 \left(1 + \frac{R}{100}\right) + P_2 \frac{R}{100} \\ &= P_1 \left(1 + \frac{R}{100}\right) + P_1 \left(1 + \frac{R}{100}\right) \frac{R}{100} \\ &= P_1 \left(1 + \frac{R}{100}\right) \left(1 + \frac{R}{100}\right) = P_1 \left(1 + \frac{R}{100}\right)^2 \end{aligned}$$

इसी तरह आगे बढ़ने पर हम आगे के वर्षों के लिए मूलधन और ब्याज निकाल सकते हैं।

अतः तीसरे वर्ष के अन्त में मिश्रधन = चौथे वर्ष का मूलधन (P_4) = $P_1 \left(1 + \frac{R}{100}\right)^3$

चौथे वर्ष के अन्त में मिश्रधन = $P_1 \left(1 + \frac{R}{100}\right)^4$

और इसी तरह से आगे।

इसका अर्थ यह हुआ कि यदि 't' वर्ष के बाद का मिश्रधन (Amount) मालूम करना है तो

वह होगा $P_1 \left(1 + \frac{R}{100}\right)^t$ जहाँ शुरु का मूलधन P_1 है,

अतः 't' वर्षों में अर्जित कुल ब्याज = t वर्ष के बाद का मिश्रधन - प्रारम्भिक मूलधन

$$= P_1 \left(1 + \frac{R}{100}\right)^t - P_1$$

$$'t' \text{ वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज (C.I.)} = P_1 \left[\left(1 + \frac{R}{100}\right)^t - 1 \right]$$

उदाहरण 4. 800 रु. का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।

हल: प्रश्नानुसार, मूलधन (P) = 800 रु.

दर (R) = 10% वार्षिक

समय (t) = 2 वर्ष

यहाँ ब्याज की गणना वार्षिक है।

$$\begin{aligned} \text{अतः चक्रवृद्धि ब्याज C.I.} &= P \left[\left(1 + \frac{R}{100}\right)^t - 1 \right] \\ &= 800 \times \left[\left(1 + \frac{10}{100}\right)^2 - 1 \right] = 800 \times \left[\left(1 + \frac{1}{10}\right)^2 - 1 \right] \\ &= 800 \times \left[\left(\frac{11}{10}\right)^2 - 1 \right] = 800 \times \left[\frac{121}{100} - 1 \right] \\ &= 800 \times \frac{21}{100} = 168 \text{ रु.} \end{aligned}$$

उदाहरण 5. यदि ऋतु विश्वास ने मकान बनवाने के लिए 80000 रु. की राशि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी भवन निर्माण सहकारी समिति से उधार ली, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितनी राशि लौटानी होगी? यह भी बताइये कि वह ब्याज की कितनी राशि देगी ?

हल: प्रश्नानुसार, मूलधन (P) = 80000 रु.

दर (R) = 15% वार्षिक

समय (t) = 3 वर्ष

$$\begin{aligned}
\text{अतः चक्रवृद्धि मिश्रधन } A &= P \left(1 + \frac{R}{100} \right)^t \\
&= 80000 \times \left(1 + \frac{15}{100} \right)^3 \\
&= 80000 \times \left(1 + \frac{3}{20} \right)^3 = 80000 \times \left(\frac{23}{20} \right)^3 \\
&= 80000 \times \frac{23}{20} \times \frac{23}{20} \times \frac{23}{20} = 80000 \times \frac{12167}{8000} \\
&= 121670 \text{ रु.}
\end{aligned}$$

ऋतु को 3 वर्ष बाद 121670 रु. लौटाने होंगे।

$$\begin{aligned}
\text{अब चक्रवृद्धि ब्याज} &= \text{मिश्रधन (A)} - \text{मूलधन (P)} \\
&= 121670 - 80000 \\
&= 41670 \text{ रु.}
\end{aligned}$$

उपरोक्त उदाहरणों में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की गई है, किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि सदैव चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वर्षवार की जाए। प्रायः सभी बैंक ब्याज की गणना वर्ष में दो बार अर्थात् प्रति छः माही करते हैं। कुछ बैंकिंग संस्थाएँ ब्याज की गणना तिमाही भी करती हैं और उसे मूलधन में शामिल करती रहती हैं। स्मरणीय तथ्य यह है कि जब दर से समयावधि का कोई उल्लेख नहीं हो तो उसे वार्षिक ही समझा जाता है।

अतः यदि ब्याज प्रति छः माही लगाया जाता है तो समय को दुगुना तथा दर को आधा करके सूत्र की सहायता से चक्रवृद्धि ब्याज एवं चक्रवृद्धि मिश्रधन की गणना की जाती है।

आइए, उदाहरण द्वारा इसे समझें –

उदाहरण 6. उर्वशी ने 2000 रु. 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। यदि ब्याज की गणना प्रति छः माही की जाती हो तो $1\frac{1}{2}$ वर्ष बाद उसे कितनी रकम चुकानी होगी? ब्याज की राशि भी बताइये?

$$\begin{aligned}
\text{हल: प्रश्नानुसार मूलधन (P)} &= 2000 \text{ रु.} \\
\text{दर (R)} &= 20\% \text{ वार्षिक} = 10\% \text{ छः माही} \\
\text{समय (t)} &= 1\frac{1}{2} \text{ वर्ष} = 3 \text{ छः माही}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{अतः चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्रधन } A &= p \left(1 + \frac{R}{100} \right)^t \\
 &= 2000 \times \left(1 + \frac{10}{100} \right)^3 = 2000 \times \left(1 + \frac{1}{10} \right)^3 \\
 &= 2000 \times \left(\frac{11}{10} \right)^3 = 2000 \times \frac{1331}{1000} \\
 &= 2662 \text{ रु.}
 \end{aligned}$$

$$\text{ब्याज की राशि} = 2662 - 2000 = 662 \text{ रु.}$$

उदाहरण 7. वह धन ज्ञात कीजिए जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 13310 रुपये हो जाता है।

हल: प्रश्नानुसार $A = 13310$ रु.

$$R = 10\%$$

$$T = 3 \text{ वर्ष}$$

$$A = P \times \left(1 + \frac{R}{100} \right)^T$$

$$13310 = P \times \left(1 + \frac{10}{100} \right)^3$$

$$\text{या } 13310 = P \times \left(\frac{11}{10} \right)^3$$

$$\text{या } 13310 = P \times \frac{11 \times 11 \times 11}{10 \times 10 \times 10}$$

$$\text{या } P = \frac{\overset{10}{\cancel{13310}} \times 10 \times 10 \times 10}{\overset{110}{\cancel{11}} \times \overset{1210}{\cancel{11}} \times \overset{13310}{\cancel{11}}} = 10000 \text{ रु.}$$

अतः वह धन 10,000 रुपये है।



प्रश्नावली 13.3

प्र.1. चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कीजिए।

(i) मूलधन = 6000 रु., समय = 3 वर्ष, दर = 10% वार्षिक

- (ii) मूलधन = 1600 रु., समय = 2 वर्ष, दर = 5% वार्षिक
 (iii) मूलधन = 8500 रु., समय = 2 वर्ष, दर = 15% वार्षिक
 (iv) मूलधन = 20000 रु., समय = 3 वर्ष, दर = 5% वार्षिक
- प्र.2. सलमा ने महिला समिति से 625 रु. सिलाई मशीन खरीदने के लिए उधार लिए। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो एवं वार्षिक गणना की जाए तो 2 वर्ष बाद सलमा समिति को कितनी रकम वापस करेगी?
- प्र.3. वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5832 रु. हो जाता है।
- प्र.4. कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रु. 2 वर्ष में 5290 रु. हो जाता है।
- प्र.5. किस दर से 1800 रु. का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 378 रु. हो जाता है यदि ब्याज वार्षिक लगाया जाता है।
- प्र.6. 3200 रु. पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अन्तर ज्ञात कीजिए।

प्रतिशतता का एक और अनुप्रयोग, बट्टा (Another application of percentage discount)

रेहाना अपनी माँ के साथ अपना कम्पास बॉक्स खरीदने गई। उसने कम्पास बॉक्स देख लिया तो माँ ने पूछा कितने का है। दुकानदार ने कहा 50 रु. का है। आपसे 46 रु. ही लूंगा। माँ ने कहा थोड़ी और ज्यादा छूट दो। थोड़ी देर बातचीत करने पर 42 रु. में कम्पास बॉक्स रेहाना को मिल गया।

रेहाना को तो बॉक्स मिल गया किन्तु क्या आपको छूट या बट्टा समझ में आया? छूट या बट्टा वस्तु के निर्धारित मूल्य (अंकित मूल्य) पर होता है और इसे देकर वस्तु को निर्धारित मूल्य से कम पर बेचना होता है।

बट्टा अथवा छूट = अंकित मूल्य – विक्रय मूल्य

Discount or Rebate = fixed rate - selling price

कई बार तो दुकानदार बड़ी खरीदी करने पर काफी बट्टा देते हैं। कई बार वह एक निर्धारित दर से बट्टा देते हैं। बट्टे की दर प्रतिशत सदैव अंकित मूल्य पर ही ज्ञात की जाती है।

उदाहरण 8. एक पुस्तक का अंकित मूल्य 40 रु. है तथा वह 12% छूट पर उपलब्ध है। पुस्तक पर बट्टा एवं विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

हल : अंकित मूल्य = 40 रुपये, बट्टे (छूट) की दर = 12%
 चूंकि 100 रु. अंकित मूल्य पर बट्टा है = 12 रु.

$$\therefore 1 \text{ रु. अंकित मूल्य पर बट्टा होगा} = \frac{12}{100} \text{ रु.}$$

$$\therefore 40 \text{ रु. अंकित मूल्य पर बट्टा होगा} = \frac{12}{100} \times 400 = \frac{48}{10} \text{ रु.}$$

$$\therefore \text{बट्टा} = 4.80 \text{ रु.}$$

$$\begin{aligned} \text{विक्रय मूल्य} &= 40.00 \text{ रु.} - 4.80 \text{ रु.} \\ &= 35.20 \text{ रु.} \end{aligned}$$

उदाहरण 9. एक मेज का अंकित मूल्य 1250 रु. है, उसे एक ग्राहक को 1100 रु. में बेचा गया। मेज़ पर दिये गये बट्टे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

हल :

$$\text{अंकित मूल्य} = 1250 \text{ रु.}$$

$$\text{विक्रय मूल्य} = 1100 \text{ रु.}$$

$$\text{बट्टा} = 1250 - 1100 = 150 \text{ रु.}$$

$$1250 \text{ रु. पर बट्टा है} = 150 \text{ रु.}$$

$$1 \text{ रु. पर बट्टा होगा} = \frac{150}{1250}$$

$$100 \text{ रु. पर बट्टा} = \frac{150 \times 100}{1250} = \frac{1500}{125} = \frac{1500 \div 125}{125 \div 125} = \frac{12}{1} = 12\%$$

$$\text{बट्टा प्रतिशत} = 12\%$$

उदाहरण 10. अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद एक कमीज़ 442 रु. में बेची गई। कमीज़ का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।

हल :

$$\text{मान लीजिए अंकित मूल्य} = x \text{ रु.}$$

$$\text{बट्टा} = x \text{ रु. का } 15\% = x \times \frac{15}{100} \text{ रु.} = \frac{3x}{20} \text{ रु.}$$

$$\text{विक्रय मूल्य} = \text{अंकित मूल्य} - \text{बट्टा}$$

$$442 = x - \frac{3x}{20}$$

$$442 = \frac{20x - 3x}{20}$$

$$442 = \frac{17x}{20}$$

$$\frac{442 \times 20}{17} = x$$

$$x = 520$$

कमीज़ का अंकित मूल्य = 520 रु.

क्रियाकलाप 1 (Activity 1)

अब नीचे की तालिका देखिए और उसके रिक्त स्थान भरिये :

तालिका 3

क्र. सं.	छात्र का नाम	खरीदी गयी पुस्तक का नाम	अंकित मूल्य	बट्टा	विक्रय मूल्य	बट्टे की दर %
1.	रोहित	शब्द कोश	50 रु.	10 रु.	40 रु.	$\frac{10 \times 100}{50} = 20\%$
2.	अल्पना	अंक गणित के खेल	60 रु.	-----	45 रु.	$\frac{--- \times 100}{60} = 25\%$
3.	अबीदा	बच्चों के लिए गीत	45 रु.	30 रु.	-----	-----
4.	हेलेन	शीघ्र गणित	60 रु.	12 रु.	48 रु.	-----
5.	महेश	कहानी की किताब	-----	7.20 रु.	-----	----- = 5%
6.	अहमद	रामानुजन	72 रु.	-----	-----	----- = 10%
7.	-----	-----	-----	-----	-----	-----
8.	-----	-----	-----	-----	-----	-----

उदाहरण 11. एक दुकानदार अपने ग्राहकों को गर्मी के दिनों में स्वेटर पर ऑफ सीजन 10% छूट (Discount) देता है, फिर भी उसे 12.5% लाभ होता है। दुकानदार ने स्वेटर को कितने रु. में खरीदा होगा जिसका अंकित मूल्य 500 रु. है।

हल :

अंकित मूल्य = 500 रु.

बट्टे की दर = 10%

दिया गया बट्टा = $\frac{500 \times 10}{100} = 50$ रु.

स्वेटर का विक्रय मूल्य = (500 - 50) रु. = 450 रु.

दुकानदार का लाभ % = 12.5 रु.

क्रयमूल्य = $\frac{450 \times 100}{100 + 12.5} = \frac{450 \times 100}{112.5} = 400$ रु. $\left[\because \text{क्रयमूल्य} = \frac{\text{विक्रयमूल्य} \times 100}{100 + \text{लाभ \%}} \right]$

स्वेटर का क्रय मूल्य = 400 रु.

कर (Tax)

कर के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा। कर कई तरह के होते हैं आयकर, बिक्री कर, कृषि राजस्व कर, मनोरंजन कर आदि। कुछ कर केन्द्र सरकार इकट्ठा करती है और कुछ राज्य सरकारें इकट्ठा करती हैं। कुछ कर की राशि नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत को भी जाती है। कर क्यों लगाया जाता है, इस एकत्रित राशि का क्या-क्या उपयोग होता है, यह सब हम सामाजिक अध्ययन में पढ़ेंगे।

उदाहरण 12. किसान रामदीन के पास 25 एकड़ खेत है। यदि भूमि कर की दर प्रति एकड़ 15 रु. वार्षिक है तो रामदीन प्रति वर्ष कितना भूमि कर देगा?

हल: एक एकड़ खेत पर 15 रु. कर लगता है।

$$\begin{aligned}\text{अतः 25 एकड़ खेत पर} &= 25 \times 15 \text{ रु.} \\ &= 375 \text{ रु.}\end{aligned}$$

रामदीन प्रतिवर्ष 375 रुपये भूमिकर देगा।

उदाहरण 13. एक मोटर साइकिल का मूल्य 42000 रुपया है इस पर 4% वेट (VAT) (Value added Tax) (मूल्य वर्द्धित कर) लगता है, उस मोटर साइकिल पर कितने रुपये वेट लगेगा?

हल:

चूंकि 100 रु. पर 4 रुपये वेट लगता है।

$$\begin{aligned}\therefore 1 \text{ रु. पर} &= \frac{4}{100} \text{ रु.} \\ \therefore 42000 \text{ रुपये पर} &= \frac{4}{100} \times 42000 \text{ रु.} \\ &= 1680 \text{ रु. वेट लगेगा।}\end{aligned}$$

उस मोटर साइकिल पर 1680 रुपये वेट लगेगा।

उदाहरण 14. एक शहर में 5242 मकान हैं यदि प्रति मकान 2 रु. मकान कर तथा 20 रु. जल कर प्रतिवर्ष जमा होता है तो कर के रूप में उस शहर में जमा होने वाला धन ज्ञात कीजिए।

हल: प्रश्नानुसार, मकान कर = 2 रु. प्रति मकान प्रति वर्ष, जलकर = 20 रु. प्रति मकान प्रति वर्ष

$$\begin{aligned}\text{कुल मकान कर} &= \text{कुल मकान} \times \text{प्रति मकान कर} \\ &= 5242 \times 2 \text{ रु.} \\ &= 10484 \text{ रु.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{तथा जलकर} &= \text{कुल मकान} \times \text{प्रति मकान जल कर} \\ &= 5242 \times 20 \text{ रु.} \\ &= 104840 \text{ रु.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{कुल जमा धन} &= 10484 + 104840 \text{ रु.} \\ &= 115324 \text{ रु.}\end{aligned}$$

उदाहरण 15. एक दुकानदार ने 6 महीने की बिक्री के बाद 4500 रु. वेट के रूप में जमा किया। यदि वेट की दर 4% हो तो यह बताइए कि उसने कितनी मूल राशि का सामान बेचा।

हल: प्रश्नानुसार, वेट की दर = 4%

जब 4 रु. वेट है तो सामान की मूल राशि = 100 रु.

$$\therefore 1 \text{ रु. वेट होने पर सामान की मूल राशि} = \frac{100}{4} \text{ रु.}$$

$$4500 \text{ रु. वेट होने पर सामान की मूल राशि} = \frac{100}{4} \times 4500 = 1,12,500 \text{ रु.}$$

उदाहरण 16. रजिया दवाई खरीदने गई। उसने 625 रु. के अंकित मूल्य की दवाई खरीदी और उस पर 12 रु. 50 पैसे अतिरिक्त कर दिया। अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत क्या थी?

हल: 625 रु. पर लगने वाला अतिरिक्त कर = 12.50 रु.

$$\therefore 1 \text{ रु. पर लगने वाला अतिरिक्त कर} = \frac{12.50}{625}$$

$$\begin{aligned} 100 \text{ रु. पर लगने वाला अतिरिक्त कर} &= \frac{12.50}{625} \times \frac{100}{1} \\ &= \frac{1250}{625} \times \frac{100}{100} \\ &= 2\% \end{aligned}$$

उदाहरण 17.

सुरेश ने कुछ सामान खरीदा। उसने दुकानदार को 4% कर सहित 780 रु. दिए। तो खरीदे गए सामान का मूल दाम बताओ।

हल: यहाँ माना सामान का मूल दाम = 100 रुपये

तथा कर की दर = 4%

अतः दुकानदार को दिया गया मूल्य = $100 + 4 = 104$ रु.

104 रु. दिए तो मूल दाम = 100

$$\begin{aligned} 780 \text{ रु. दिए तो मूल दाम} &= \frac{780 \times 100}{104} \\ &= 750 \text{ रु.} \end{aligned}$$

अब तो आपने देख लिया होगा कि ये सवाल भी ऐकिक नियम और प्रतिशतता के अनुप्रयोग ही हैं। ध्यान सिर्फ यह रखना है कि मूल राशि कितनी है, कर की मात्रा और दर कितनी—कितनी हैं और इनमें से कौन—सी सवाल में दी गई है और कौन सी मालूम करनी है। उदाहरण 13 में मूल दाम और वेट कर की दर दी हुई है, इसमें कर पता करना है। उदाहरण 15 में कर की दी गई राशि और दर दी गई है हमें मूल राशि पता करनी है और उदाहरण 16 में अंकित मूल्य और कर दिया गया है हमें कर की दर निकालनी है।

प्रश्नावली 13.4

- प्र.1. सर्जियस ने एक साइकल खरीदी जिसका मूल्य 1750 रु. है। यदि सायकल पर बिक्री कर की दर 4% है तो सर्जियस को साइकल के लिए कितने रुपये देने पड़ेंगे?
- प्र.2. महानदी किनारे स्थित ग्राम पंचायत गिधपुरी रेत निकासी के लिए 20 रु. प्रति घन मीटर टैक्स लेती है। यदि एक ट्रैक्टर में 5 घन मीटर रेत आती है तो नदी से 12 ट्रैक्टर रेत निकालने पर पंचायत को कितना टैक्स मिलेगा?
- प्र.3. अंजली ने एक दुकान से 500 रु. मूल्य के इत्र तथा 800 रु. मूल्य के गहने खरीदे। यदि इत्र पर बिक्री कर 16% तथा गहनों पर बिक्री कर 8% है तो अंजली कुल कितने रुपये दुकानदार को अदा करेगी?
- प्र.4. किसान 4 रु. प्रति एकड़ भू-राजस्व सरकार को देता है। यदि रामदीन के पास 85 एकड़ कृषि भूमि है, तो वह भू-राजस्व के रूप में कितने रुपये अदा करेगा?
- प्र.5. नगर निगम सुन्दरपुर ने आवासीय भूखण्डों के लिए विकास शुल्क 8 रु. प्रति वर्ग फुट तय किया। यदि भानुप्रकाश के भूखण्ड की माप 50 फीट × 30 फीट हो तो उसे कितना विकास शुल्क देना होगा?
- प्र.6. दिनेश ट्रक से 37500 रु. का अनाज बाहर से मंगाता है। यदि अनाज के मूल्य पर 2.5% प्रवेश कर लगता है तो दिनेश कुल कितना प्रवेश कर अदा करेगा?
- प्र.7. यदि ग्राम पंचायत अड़सेना प्रति मकान 25 रु. गृह कर लगाती है और पंचायत के अन्तर्गत 216 मकान हैं तो गृहकर से पंचायत को कितनी आय होगी?
- प्र.8. भारत सरकार ट्रैक्टरों पर लागत मूल्य का 11% उत्पाद कर लगाती है। यदि कारखाने में 1 ट्रैक्टर की उत्पादन लागत 120000 रु. है तो प्रति ट्रैक्टर उत्पाद कर की राशि ज्ञात कीजिए।

हमने सीखा (We have learnt)

1. जब किसी निश्चित अवधि के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़कर फिर ब्याज की गणना की जाती है तो ऐसे ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं।

2. चक्रवृद्धि ब्याज $C.I. = P \left[\left(1 + \frac{R}{100} \right)^T - 1 \right]$

3. चक्रवृद्धि मिश्रधन $A = P \times \left(1 + \frac{R}{100} \right)^T$




4. जब ब्याज की गणना अर्द्धवार्षिक हो तो समय वार्षिक समय का दुगुना तथा दर वार्षिक दर की आधी हो जाती है।
5. बट्टे की गणना अंकित मूल्य पर की जाती है।
6. किसी वस्तु की बिक्री पर लगने वाला कर बिक्री कर कहलाता है।
7. यदि विक्रय मूल्य एवं लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात हो तो

$$\text{क्रय मूल्य} = \frac{\text{विक्रय मूल्य} \times 100}{100 + \text{लाभ \%}} = \frac{\text{विक्रय मूल्य} \times 100}{100 - \text{हानि \%}}$$

अध्याय-14
क्षेत्रमिति-1
MENSURATION-1




आकांक्षा और रानु ने मोटे कागज को काटकर विभिन्न मापों के आयत व समान्तर चतुर्भुज बना लिये जो नीचे दिये अनुसार थे—




रानु ने आकांक्षा से इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा, आकांक्षा ने आयताकार टुकड़ों की लम्बाई तथा चौड़ाई का गुणा करके क्षेत्रफल निकाल लिया। (आयत का क्षेत्रफल = लं. $\times$ चौ.) लेकिन वह समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाई, क्योंकि वह समान्तर चतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई के बारे में निश्चय नहीं कर सकी। रानु ने कहा— यदि हम इन समान्तर चतुर्भुज वाली आकृति को काटकर आयत में बदल लें, तो इनका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है।


इसके लिए उन्होंने निम्न क्रियाकलाप किया—



एक समान्तर चतुर्भुज वाली आकृति को लेकर ABCD से नामांकित किया एवं भुजा AB को आधार मानकर एक शीर्ष लंब BL खींचा। त्रिभुजाकार टुकड़े BLC को काटकर अलग किया। (चित्र 14.2(ii)) त्रिभुजाकार आकृति को उठाकर रानू ने उसी आकृति से जोड़ने का प्रयास किया, तो चित्र-14.2(iii) के अनुसार आकृति प्राप्त हुई।



उसके पश्चात् आकांक्षा ने पूरी तरह जोड़कर आकृति-14.3(iv) को प्राप्त किया।



इस तरह आयत का चित्र प्राप्त हुआ। आकांक्षा ने कहा— आकृति-14.2(i) तथा आकृति-14.2(iv)

का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि आकृति-14.2(iv) आकृति-14.2(i) का परिवर्तित रूप है।

आयत ABLL' का क्षेत्रफल = $AB \times BL$ = समान्तर चतुर्भुज ABCD का आधार $\times$ ऊँचाई

अतः समान्तर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल = आधार $\times$ ऊँचाई, प्राप्त हुआ। इस तरह उन्होंने समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया।

अतः

$$(1) \text{ समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल} = \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$$

$$(2) \text{ समान्तर चतुर्भुज का आधार} = \frac{\text{क्षेत्रफल}}{\text{ऊँचाई}}$$

$$(3) \text{ समान्तर चतुर्भुज का ऊँचाई} = \frac{\text{क्षेत्रफल}}{\text{आधार}}$$

उदाहरण 1. आधार 15 सेमी तथा ऊँचाई 5 सेमी वाले समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

$$\begin{aligned} \text{हल: आधार} &= 15 \text{ सेमी तथा ऊँचाई} &&= 5 \text{ सेमी} \\ \text{समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल} &&&= \text{आधार} \times \text{ऊँचाई} \\ &&&= 15 \text{ सेमी} \times 5 \text{ सेमी} \\ &&&= 75 \text{ वर्ग सेमी} \end{aligned}$$

उदाहरण 2. उस समान्तर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 240 वर्ग सेमी तथा ऊँचाई 8 सेमी है।

$$\text{हल: हम जानते हैं कि समान्तर चतुर्भुज का आधार} = \frac{\text{क्षेत्रफल}}{\text{ऊँचाई}}$$

$$\text{क्षेत्रफल} = 240 \text{ वर्ग सेमी, ऊँचाई} = 8 \text{ सेमी}$$

$$\begin{aligned} \text{अतः आधार} &= \frac{240}{8} \frac{\text{सेमी}^2}{\text{सेमी}} \\ &= 30 \text{ सेमी} \end{aligned}$$

प्रश्नावली 14.1 (Exercise 14.1)


प्र.1 उस समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार और शीर्षलंब निम्नलिखित हैं।

$$(i) \text{ आधार} = 15 \text{ सेमी.}, \text{ शीर्ष लंब} = 10 \text{ सेमी}$$

- (ii) आधार = 90 सेमी, शीर्ष लंब = 8 सेमी
 (iii) आधार = 120 सेमी, शीर्ष लंब = 15 सेमी
- प्र.2 उस समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका आधार 26.5 सेमी तथा शीर्ष लंब 7 सेमी है।
- प्र.3 उस समान्तर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल 390 वर्ग सेमी तथा शीर्ष लंब 26 सेमी हो।
- प्र.4 उस समान्तर चतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर और आधार 60 मीटर है।

आइए, अब निम्न क्रियाकलाप करते हैं—


1. ABC एक त्रिभुज बनाइए तथा बिन्दु A से BC लम्बाई का तथा बिन्दु C से AB लम्बाई का चाप B के विपरीत ओर काटिए एवं दोनों चापों के कटान बिन्दु से A व C को मिलाइए तथा D से नामांकित कीजिए। इस प्रकार ABCD एक समान्तर चतुर्भुज प्राप्त होती है क्योंकि $AB=DC$ तथा $AD=BC$ है।



चित्र-14.3

क्रियाकलाप (Activity)

एक मोटे आयताकार कागज ABCD को विकर्ण AC पर कैंची से काटिए।



चित्र -14.4

इस तरह, दो $\triangle ABC$ और $\triangle ADC$ बन गए। $\triangle ABC$ और $\triangle ADC$ को एक-दूसरे पर रखिए। क्या वे एक-दूसरे को पूरी तरह ढँक लेते हैं? आप पायेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं और उनके क्षेत्रफल भी बराबर हैं।

$\therefore \triangle ABC$ का क्षे. + $\triangle ADC$ का क्षे. = आयत ABCD का क्षे.

$\Rightarrow \Delta ABC$ का क्षेत्र. + ΔABC का क्षेत्र. = आयत ABCD का क्षेत्र.

$\Rightarrow 2 \Delta ABC$ का क्षेत्र. = आयत ABCD का क्षेत्र. [$\because \Delta ABC$ का क्षेत्र. = ΔADC का क्षेत्र.]

$\Rightarrow 2 (\Delta ABC \text{ का क्षेत्र.}) = AB \times BC$

$$\Delta ABC \text{ का क्षेत्र.} = \frac{1}{2} \times AB \times BC$$


अभ्यास (Practice)

गत्ते पर एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। उसे काटकर अलग कीजिए। एक विकर्ण पर उसे फिर काटिए। तब दो त्रिभुज मिलेंगे। क्या उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं? एक-दूसरे पर रखकर देखिए।

त्रिभुज का क्षेत्रफल (Area of a Triangle)

हम समान माप के दो त्रिभुजों को आपस में जोड़कर समान्तर चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। एक विकर्ण खींचने पर समान्तर चतुर्भुज में समान माप के दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC खींचने पर प्राप्त ΔABC और ΔADC सर्वांगसम हैं। उनके क्षेत्रफल भी बराबर हैं।

अतः समान्तर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल = ΔABC का क्षेत्रफल + ΔADC का क्षेत्रफल



चित्र-14.5

$$= 2 (\Delta ABC \text{ का क्षेत्रफल})$$

$$\therefore \Delta ABC \text{ का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \text{ समान्तर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल}$$

$$= \frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई} = \frac{1}{2} \times BC \times AL$$

$$\text{अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल } A = \frac{1}{2} \times b \times h$$

जहाँ b = त्रिभुज का आधार और h = त्रिभुज की ऊँचाई

याद रखें- दो समान्तर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी आधार व ऊँचाई के समान्तर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है।

उदाहरण 3. आधार 28 सेमी तथा ऊँचाई 6 सेमी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल: प्रश्नानुसार त्रिभुज का आधार $b = 28$ सेमी.

एवं ऊँचाई $h = 6$ सेमी

$$\begin{aligned}
 \text{अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल } A &= \frac{1}{2} \times b \times h \\
 &= \frac{1}{2} \times 28 \times 6 \\
 &= 84 \text{ सेमी}^2
 \end{aligned}$$

उदाहरण 4. 80 सेमी आधार और 0.08 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की उंचाई ज्ञात कीजिए।

हल: प्रश्नानुसार, त्रिभुज का आधार $b = 80$ सेमी. एवं क्षेत्रफल $= 0.08$ मी²

यहाँ आधार सेमी. में दिया है अतः क्षेत्रफल को सेमी. में बदलने पर

$$\begin{aligned}
 1 \text{ मीटर}^2 &= 1 \text{ मीटर} \times 1 \text{ मीटर} \\
 &= 100 \text{ सेमी} \times 100 \text{ सेमी} \quad (\because 1 \text{ मीटर} = 100 \text{ सेमी}) \\
 &= 10000 \text{ सेमी}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{अतः } 0.08 \text{ मीटर}^2 &= 0.08 \times 10000 \text{ सेमी}^2 \\
 &= 800 \text{ सेमी}^2
 \end{aligned}$$

$$\text{अब त्रिभुज का क्षेत्रफल } A = \frac{1}{2} \times b \times h \text{ से}$$

$$\begin{aligned}
 \text{त्रिभुज की उंचाई} &= h = \frac{2A}{b} = \frac{2 \times 800}{80} \\
 \Rightarrow h &= 20 \text{ सेमी}
 \end{aligned}$$

प्रश्नावली-14.2 (Exercise -14.2)

- प्र.1 आधार 12 सेमी और संगत ऊँचाई 7 सेमी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- प्र.2 आधार 25 सेमी और शीर्ष लम्ब 1.5 सेमी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- प्र.3 आधार 6.5 सेमी और क्षेत्रफल 26 सेमी² वाले त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए।
- प्र.4 आधार 120 डेमी और ऊँचाई 75 डेमी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

समचतुर्भुज का क्षेत्रफल (Area of a Rhombus)

समचतुर्भुज समान्तर चतुर्भुज का ही एक रूप है अतः यदि उसका आधार तथा ऊँचाई ज्ञात हो तो क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है।

यदि आधार b तथा ऊँचाई h हो तो


$$\text{क्षेत्रफल } A = b \times h$$

ABCD एक समचतुर्भुज है d_1 तथा d_2 इसके विकर्ण हैं चूँकि ये एक-दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं अतः प्राप्त चार समकोण त्रिभुजों की लंबवत् भुजाएं $\frac{d_1}{2}$ तथा $\frac{d_2}{2}$ होंगी।

समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = $4 \times$ एक समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल

$$= 4 \times \frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$$

$$= 4 \times \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} d_1 \right) \times \left(\frac{1}{2} d_2 \right)$$




चित्र-14.7

अतः **समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} d_1 d_2$ सेमी²**

समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times$ पहला विकर्ण $\times$ दूसरा विकर्ण

समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल (Area of a Trapezium)



चित्र-14.8

एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएँ एक-दूसरे के समान्तर होती हैं। चित्र-14.8 में ABCD एक समलंब चतुर्भुज दिखाया गया है। भुजा AB भुजा DC के समान्तर है। दो समान्तर भुजाओं की लम्बवत् दूरी को AM तथा CL से दर्शाया गया है।

यदि हम इस त्रिभुज का विकर्ण AC खींचे इससे समलंब चतुर्भुज दो त्रिभुज ABC तथा ACD प्राप्त होते हैं।

अतः समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल = ΔABC का क्षेत्रफल + ΔACD का क्षेत्रफल

$$\text{समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} AB \times CL + \frac{1}{2} DC \times AM$$

चूँकि CL तथा AM समलंब चतुर्भुज की ऊँचाई है अतः यह बराबर होगी। माना कि यह h के बराबर है।

$$\text{समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} AB \times h + \frac{1}{2} DC \times h$$

यदि $AB = b_1$ एवं $DC = b_2$ है तो

$$\text{समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} b_1 \times h + \frac{1}{2} b_2 \times h$$

$$= \frac{1}{2} (b_1 + b_2) \times h$$

$$= \frac{1}{2} \times (\text{समांतर भुजाओं का योग}) \times \text{उनके बीच की दूरी}$$

$$\text{समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times (\text{समांतर भुजाओं का योग}) \times \text{ऊँचाई}$$

या

$$\text{समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times (b_1 + b_2) \times h$$

उदाहरण 6. एक समचतुर्भुज की एक भुजा 7 सेमी तथा ऊँचाई 3.2 सेमी है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो।

हल: प्रश्नानुसार आधार = 7 सेमी, ऊँचाई = 3.2 सेमी

$$\text{समचतुर्भुज का क्षेत्रफल} = \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$$

$$\text{क्षेत्रफल} = 7 \times 3.2 \text{ वर्ग सेमी}$$

$$= 22.4 \text{ वर्ग सेमी}$$

उदाहरण 7. एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 10 सेमी व दूसरा विकर्ण 12 सेमी है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल: समचतुर्भुज का पहला विकर्ण = 10 सेमी, दूसरा विकर्ण = 12 सेमी

यदि विकर्ण दिये हों तो समचतुर्भुज का

$$\text{क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times (\text{एक विकर्ण}) \times (\text{दूसरा विकर्ण})$$

$$= \frac{1}{2} \times 10 \times 12$$

$$= 60 \text{ वर्ग सेमी}$$

उदाहरण 8. एक समलंब चतुर्भुज की समान्तर भुजाएँ 25 मीटर व 20 मीटर हैं व भुजाओं के बीच की दूरी 8 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल: प्रश्नानुसार $b_1 = 25$ मी, $b_2 = 20$ मी, $h = 8$ मी

$$\text{समलंब का क्षेत्रफल } A = \frac{1}{2} \times h \times (b_1 + b_2)$$

$$A = \frac{1}{2} \times 8 \times (25 + 20)$$

$$A = \frac{1}{2} \times 8 \times (45)$$

$$A = 180 \text{ वर्ग मी}$$

उत्तर

उदाहरण 9. एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 140 सेमी^2 है, यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 25 सेमी तथा ऊँचाई 7 सेमी है तो दूसरी समान्तर भुजा ज्ञात कीजिए।

हल: प्रश्नानुसार $A = 140 \text{ सेमी}^2$, $b_1 = 25 \text{ सेमी}$

$$h = 7 \text{ सेमी}$$

समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र A है तो

$$A = \frac{1}{2} \times h \times (b_1 + b_2)$$


$$\text{अतः } 140 = \frac{1}{2} \times 7 \times (25 + b_2)$$

$$\frac{2 \times 140}{7} = 25 + b_2$$

$$40 = 25 + b_2$$

$$b_2 = 40 - 25$$

$$\text{दूसरी भुजा } b_2 = 15 \text{ सेमी.}$$



चित्र—14.9

प्रश्नावली-14.3 (Exercise -14.3)

- प्र.1 एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 24 सेमी व 10 सेमी हैं।
- प्र.2 एक समचतुर्भुज की एक भुजा 7.5 सेमी और शीर्ष लंब 4 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- प्र.3 एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 मी व 8 मी हैं। इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- प्र.4 आधार 30 सेमी और 24.4 सेमी वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि शीर्ष लंब 1.5 सेमी है।
- प्र.5 एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 वर्ग सेमी तथा ऊंचाई 7 सेमी है, समान्तर भुजाओं में से यदि एक दूसरी से 6 सेमी अधिक है तो दोनों समान्तर भुजाएं ज्ञात करो।

आयताकार पथ का क्षेत्रफल (Area of a Rectangular path)



चित्र-14.10

किसी विद्यालय के चारों ओर बना बरामदा, खेत के चारों ओर का रास्ता, खेल के मैदान का रास्ता आदि का क्षेत्रफल ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है, इस स्थिति में हम क्या करते हैं। चित्र-14.10 एक आयताकार खेत है जिसके चारों ओर रास्ता बना हुआ है। यदि हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे?

स्पष्ट है कि इसमें हमें दो आयत मिल रहे हैं अतः बड़े आयत के क्षेत्रफल में छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे।

आयताकार पथ का क्षेत्रफल = बड़े आयत का क्षेत्रफल - छोटे आयत का क्षेत्रफल

Area of the rectangular path = Area of the bigger rectangle - Area of smaller rectangle

उदाहरण 10. एक आयताकार खेत जिसकी लम्बाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 65 मीटर है इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल: चित्र से स्पष्ट है कि रास्ते का क्षेत्रफल = आयत ABCD का क्षेत्रफल - आयत EFGH का क्षेत्रफल होगा।


अतः रास्ते का क्षेत्रफल = $(AB \times BC) - (EF \times FG)$

यहाँ $AB = AE + EF + FB$

$AB = 5 + 90 + 5$

$AB = 100$ मीटर

इसी तरह $BC = 5 + 65 + 5$



चित्र-14.11

$$= 75 \text{ मीटर}$$

$$\begin{aligned}\text{अतः रास्ते का क्षेत्रफल} &= (AB \times BC) - (EF \times FG) \\ &= 100 \times 75 - 90 \times 65 \\ &= 7500 - 5850 \\ &= 1650 \text{ वर्ग मीटर}\end{aligned}$$

उदाहरण 11. एक दीवार जिसकी लम्बाई 15.5 मीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर है इसमें 3 मीटर $\times$ 1.5 मीटर माप के दो दरवाजे तथा 2 मीटर $\times$ 1 मीटर माप की दो खिड़कियाँ लगी हैं इसे 5 रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगवाने (पोताई) का खर्च ज्ञात कीजिए।

हल: हमें पहले पोताई योग्य दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।

अतः पोताई योग्य दीवार का क्षेत्रफल = दीवार का संपूर्ण क्षेत्रफल – (2 दरवाजों + 2 खिड़कियों का क्षेत्रफल)

$$\begin{aligned}\text{दीवार का क्षेत्रफल} &= \text{लम्बाई} \times \text{चौड़ाई} \\ &= 15.5 \times 9 \\ &= 139.5 \text{ वर्ग मीटर}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}1 \text{ दरवाजे का क्षेत्रफल} &= \text{लम्बाई} \times \text{चौड़ाई} \\ &= 3 \times 1.5 \\ &= 4.5 \text{ वर्ग मीटर}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2 \text{ दरवाजों का क्षेत्रफल} &= 4.5 \times 2 \\ &= 9.0 \text{ वर्ग मीटर}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}1 \text{ खिड़की का क्षेत्रफल} &= \text{लम्बाई} \times \text{चौड़ाई} \\ &= 2 \times 1 \\ &= 2 \text{ वर्ग मीटर}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2 \text{ खिड़कियों का क्षेत्रफल} &= 2 \times 2 \\ &= 4 \text{ वर्ग मीटर}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{अतः पोताई योग्य दीवार का क्षे.} &= 139.5 - (9.0 + 4) \\ &= 139.5 - 13.0 \\ &= 126.5 \text{ वर्गमीटर}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}5 \text{ रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से पोताई का खर्च} &= 126.5 \times 5 \\ &= 632.50 \text{ रु.}\end{aligned}$$

उदाहरण 12. एक आयताकार क्षेत्र की लम्बाई व चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर व 24 मीटर है। इसके बीचों बीच इसकी लम्बाई के समान्तर 2 मीटर चौड़ा तथा चौड़ाई के समान्तर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।


हल: लम्बाई के समान्तर रास्ते का क्षेत्रफल = $35 \times 2 = 70$ वर्ग मीटर

$$\begin{aligned} \text{चौड़ाई के समान्तर रास्ते का क्षेत्रफल} &= 24 \times 1 \\ &= 24 \text{ वर्ग मीटर} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{छायांकित भाग का क्षेत्रफल} &= 2 \times 1 \\ &= 2 \text{ वर्ग मीटर} \end{aligned}$$

(छायांकित भाग दोनों रास्तों में आया है अतः उसे एक बार घटाएंगे)

$$\begin{aligned} \text{रास्ते का क्षेत्रफल} &= 70 + 24 - 2 \\ &= 94 - 2 \\ &= 92 \text{ वर्ग मीटर} \end{aligned}$$



चित्र-14.12

प्रश्नावली-14.4 (Exercise -14.4)


- प्र.1 एक 25 सेमी लंबी तथा 10 सेमी चौड़े चित्र के बाहर चारों ओर 2 सेमी चौड़ाई की पट्टी बनी है। पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- प्र.2 एक आयताकार खेल का मैदान 35 मी $\times$ 25 मी माप का है। इसके बीचों-बीच लम्बाई के समान्तर 3 मीटर चौड़ा तथा चौड़ाई के समान्तर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- प्र.3 एक बास्केटबॉल का मैदान 28 मीटर लम्बा तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ी समतल दर्शक दीर्घा बनानी है। दीर्घा का क्षेत्रफल तथा दर्शक दीर्घा को बनाने का खर्च 5.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए।

वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल (Area of a circular path)

पिछली कक्षाओं में हमने वृत्त के बारे में जाना है। यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है तो परिधि $C = 2\pi r$

तथा क्षेत्रफल = πr^2 होता है।

जहां π एक नियतांक है जिसका मान लगभग $\frac{22}{7}$ या 3.14 होता है।



चित्र-14.13

उदाहरण 13. साईकिल के पहिए की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेमी है।

हल: साईकिल का पहिया वृत्ताकार होता है

अतः पहिए की परिधि $= 2\pi r$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 21 \text{ सेमी} = 132 \text{ सेमी}$$

पहिए का क्षेत्रफल $= \pi r^2$

$$\begin{aligned} &= \frac{22}{7} \times (21)^2 \\ &= \frac{22}{7} \times 21 \times 21 \\ &= \frac{22}{7} \times 21^3 \times 21 \\ &= 1386 \text{ वर्ग सेमी} \end{aligned}$$

सकेन्द्री वृत्त

चित्र-14.14 में दो सकेन्द्री दिए गए हैं। यदि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। स्पष्ट है कि हम बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे।

अतः **वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल = बड़े वृत्त का क्षेत्रफल - छोटे वृत्त का क्षेत्रफल**

Area of a circular path = Area of bigger circle - Area of smaller circle

उदाहरण 14. एक वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या 200 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई का तट (मार्ग) बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।


हल: वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल = बड़े वृत्त का क्षेत्रफल - छोटे वृत्त का क्षेत्रफल

छोटे वृत्त की त्रिज्या $r = 200$ मीटर


बड़े वृत्त की त्रिज्या $R = 200 + 7 = 207$ मीटर

वृत्ताकार तालाब का तट का क्षेत्रफल $= \pi R^2 - \pi r^2$

$$= \pi[(207)^2 - (200)^2]$$



चित्र-14.14



चित्र-14.15

$$\begin{aligned}
 &= \frac{22}{7}(207+200)(207-200) \quad [\because (a^2 - b^2) = (a+b)(a - b)] \\
 &= \frac{22}{7}(407)(7) \\
 &= 22(407) \text{ वर्ग मीटर} \\
 &= 8954 \text{ वर्ग मीटर}
 \end{aligned}$$

प्रश्नावली 14.5 (Exercise 14.5)

- प्र.1 दो सकेन्द्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेमी व 12 सेमी हैं दोनों वृत्तों के बीच बनने वाले वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- प्र.2 एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है। इस वृत्त के बाहर 2 मीटर चौड़ाई का मार्ग है। उस मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा।
- प्र.3 एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान की त्रिज्या 60 मीटर है। मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी दर्शक दीर्घा बनानी है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

ग्राफ पर बने समलम्ब चतुर्भुजों का वर्ग गिड की सहायता से अनुमानित क्षेत्रफल निकालना तथा सूत्र से क्षेत्रफल निकालकर उसका सत्यापन करना।

To find the Approximate Area of the Trapezium given on graph paper with the help of square grid method and verify the result with the formula method –

चित्र क्रमांक 14.16 के लिए—

वर्ग गिड द्वारा समलम्ब चतुर्भुज के अनुमानित क्षेत्रफल की गणना


समलम्ब चतुर्भुज ABCD में

पूरे वर्ग तथा आधे से बड़े वर्गों की संख्या = 16

ठीक आधे वर्गों की संख्या = 1



$$\begin{aligned}
 \text{समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल} &= \text{पूरे वर्गों की संख्या} + \frac{1}{2} \text{ आधे वर्गों की संख्या} \\
 &= 16 + \frac{1}{2} \times 1 \\
 &= 16 + \frac{1}{2} = 16 + .5 = 16.5 \text{ वर्ग सेमी.}
 \end{aligned}$$



चित्र-14.16

सूत्र द्वारा

समलम्ब चतुर्भुज ABCD में

समान्तर भुजाएँ AB = 7 सेमी.

व CD = 4 सेमी.


चतुर्भुज की ऊँचाई DE = 3 सेमी.

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल} &= \frac{1}{2} (\text{समान्तर भुजाओं का योग}) \times \text{ऊँचाई} \\
 &= \frac{1}{2} (AB + CD) \times DE \\
 &= \frac{1}{2} (7 + 4) \times 3 \\
 &= \frac{1}{2} \times 11 \times 3 \\
 &= \frac{33}{2} \\
 &= 16.5 \text{ वर्ग सेमी.}
 \end{aligned}$$

स्पष्ट है कि

वर्ग ग्रिड द्वारा ज्ञात समलम्ब चतुर्भुज ABCD का अनुमानित क्षेत्रफल

$$= \text{सूत्र द्वारा ज्ञात समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल}$$



चित्र-14.17

ग्राफ पर बने बहुभुज का वर्ग ग्रिड की सहायता से अनुमानित क्षेत्रफल निकालना तथा सूत्र से क्षेत्रफल निकालकर उसका सत्यापन करना

चित्र क्रमांक 14.17 के लिए

वर्ग ग्रिड द्वारा बहुभुज का अनुमानित क्षेत्रफल-

बहुभुज ABCDEFA में

$$\begin{aligned}
 \text{पूरे तथा आधे से बड़े वर्गों की संख्या} &= 29 \\
 \text{ठीक आधे वर्गों की संख्या} &= 2 \\
 \text{ठीक पूरे वर्गों की संख्या} &= 29 + \frac{1}{2} \times 2 \\
 &= 29 + 1 \\
 &= 30
 \end{aligned}$$

अतः बहुभुज ABCDEFA का क्षेत्रफल = 30 वर्ग सेमी.

सूत्र द्वारा बहुभुज के क्षेत्रफल की गणना-

$$\begin{aligned}
 \text{बहुभुज ABCDEFA का क्षेत्रफल} &= \Delta AGB \text{ का क्षेत्रफल} + \text{समलम्ब चतुर्भुज BGIC} \\
 &\text{का क्षेत्रफल} + \Delta CID \text{ का क्षेत्रफल} + \Delta DHE \text{ का} \\
 &\text{क्षेत्रफल} + \text{आयत HEFG का क्षेत्रफल} + \Delta GFA \\
 &\text{का क्षेत्रफल}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} BG \times GA + \frac{1}{2} (BG + CI) \times GI + \frac{1}{2} CI \times ID \\
&\quad + \frac{1}{2} HE \times HD + HE \times HG + \frac{1}{2} GF \times AG \\
&= \frac{1}{2} \times 2 \times 2 + \frac{1}{2} (2+3) \times 4 + \frac{1}{2} \times 3 \times 2 + \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \\
&\quad + 3 \times 2 + \frac{1}{2} \times 3 \times 2 \\
&= 2 + (5 \times 2) + 3 + (3 \times 2) + 6 + 3 \\
&= 2 + 10 + 3 + 6 + 6 + 3 \\
&= 30 \text{ वर्ग सेमी.}
\end{aligned}$$



स्पष्ट है कि

वर्ग ग्रिड द्वारा ज्ञात बहुभुज का अनुमानित क्षेत्रफल = सूत्र द्वारा ज्ञात बहुभुज का क्षेत्रफल।

हमने सीखा (We have learnt)

1. समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल = आधार $\times$ ऊँचाई
2. समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो समान त्रिभुजों में बाँटते हैं।
3. त्रिभुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2}$ आधार $\times$ ऊँचाई
4. समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल = $\frac{\sqrt{3}}{4}$ (भुजा)²
5. समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = आधार $\times$ ऊँचाई
या
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times$ पहला विकर्ण $\times$ दूसरा विकर्ण
= $\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$
6. समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times$ ऊँचाई $\times$ (समांतर भुजाओं का योग)
= $\frac{1}{2} \times (b_1 + b_2) \times h$
7. वृत्त का क्षेत्रफल = $\pi \times (\text{त्रिज्या})^2$
= πr^2 (जहाँ $\pi = \text{नियतांक} = \frac{22}{7} = 3.14$ लगभग)
8. वृत्त की परिधि = $2 \times \pi \times \text{त्रिज्या}$
= $2\pi r$


अध्याय-15

क्षेत्रमिति – 3


MENSURATION - 3



आप नल का पाइप, लकड़ी का रोलर, पेन का रिफिल, ट्यूब लाइट, टार्च की बैटरी, कुआँ जैसी चीज़ों को प्रतिदिन देखते हैं, इन आकृतियों के क्या नाम हैं? इनमें क्या-क्या समानताएँ हैं? निम्न आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखिये एवं उनका एक समूह बनाइये –



लूडो




चॉक का डिब्बा




पुलिया का पाइप




गेंद



लोहे का तार



डमरू



भूमि समतल करने वाला रोलर

चित्र 15.1

ऊपर दिये गये चित्रों में से समान आकृतियों को आपने किन-किन आधारों पर पहचाना? अपने साथियों से चर्चा कीजिए।

आप पाते हैं कि पाइप, रोलर जैसी आकृतियों में से प्रत्येक में दो वृत्ताकार सतहें हैं, जो


परस्पर समान्तर एवं बराबर हैं तथा तीसरी सतह वक्राकार है। ऐसी आकृतियों को बेलनाकार आकृतियाँ कहते हैं।

आइए, अब हम एक बेलन पर चर्चा करें —

दिये गये चित्र में एक बेलन की आकृति को दर्शाया गया है। बेलन में दो वृत्ताकार सिरे हैं, जो परस्पर समान्तर एवं सर्वांगसम हैं। ये वृत्ताकार सिरे बेलन का शीर्ष एवं आधार कहलाते हैं। बेलन का शेष पृष्ठीय भाग अर्थात् दोनों वृत्ताकार सिरों को मिलाने वाला बेलनाकार पृष्ठ बेलन का वक्राकार भाग या वक्र पृष्ठ कहलाता है।

बेलन के आधार या शीर्ष की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या होती है जिसे अक्षर 'r' से व्यक्त करते हैं।

बेलन के आधार एवं शीर्ष के केन्द्रों को मिलाने वाल रेखाखण्ड OO' उनके बीच की लम्बवत् दूरी होती है। यही लम्बवत् दूरी बेलन की ऊँचाई होती है जिसे अक्षर 'h' द्वारा दर्शाते हैं।



चित्र 15.2

बेलन का आयतन (Volume of cylinder)

कक्षा-7 में आपने घनाभाकार आकृतियों का आयतन निकालना सीख लिया है। क्या आप बता सकते हैं कि घनाभ का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं?

मोनिका : घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए उसकी लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई का आपस में गुणा करते हैं। अर्थात् **घनाभ का आयतन = लम्बाई × चौड़ाई × ऊँचाई**

$$(Volume\ of\ cuboid = length \times breadth \times height)$$

सुनील : परन्तु लं.×चौ. घनाभ के आधार के क्षेत्रफल के बराबर है।

तो क्या हम कह सकते हैं कि **घनाभ का आयतन = आधार का क्षेत्रफल × ऊँचाई**

$$(Volume\ of\ cuboid = Area\ of\ base \times height)$$

क्या बेलन के आयतन को भी इसी प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? अपने साथियों एवं शिक्षक से चर्चा करें।

आप पायेंगे कि यह सूत्र बेलन के आयतन के लिए भी सत्य है।

$$\text{अर्थात् बेलन का आयतन} = \text{बेलन के आधार का क्षेत्रफल} \times \text{ऊँचाई}$$

$$Volume\ of\ cylinder = Area\ of\ base\ of\ cylinder \times height$$

माना बेलन के आधार की त्रिज्या r है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा?


चूँकि बेलन का आधार वृत्ताकार है, इसलिए आधार का क्षेत्रफल = r^2

अब यदि बेलन की ऊँचाई h हो तो

बेलन का आयतन $(V) = \text{आधार का क्षेत्रफल} \times \text{ऊँचाई}$

$$= \pi r^2 \times h$$

$$= \pi r^2 h$$



बेलन का आयतन $(V) = \pi r^2 h$ घन इकाई

volume of cylinder $(V) = \pi r^2 h$ cubic unit


चित्र 15.3



क्रियाकलाप 1. (Activity 1)

नीचे दी गई मापों के आधार पर ज्ञात करके तालिका पूर्ण कीजिए –

क्रमांक	बेलन की आकृति	ऊँचाई या लम्बाई (h)	त्रिज्या (r)	आयतन (v)
1		-----	-----	-----
2		-----	-----	-----

**उदाहरण 1.**

एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेमी. तथा ऊँचाई 15 सेमी. है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए।

हल : प्रश्नानुसार,

बेलन के आधार का व्यास = 14 सेमी.

बेलन के आधार की त्रिज्या (r) = $\frac{14}{2} = 7$ सेमी.

तथा बेलन की ऊँचाई (h) = 15 सेमी.

$\therefore$ बेलन का आयतन (V) = $\pi r^2 h$

$$= \frac{22}{7} \times (7)^2 \times 15$$

$$= \frac{22}{\cancel{7}^1} \times \cancel{7}^1 \times 7 \times 15$$

$$= 22 \times 7 \times 15$$

$$= 2310 \text{ सेमी}^3 \text{ या घन सेमी}$$

अतः उस बेलन का आयतन 2310 सेमी³ है।

उदाहरण 2.


3.5 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार कुआँ 20 मीटर गहराई तक खोदा गया है। खुदाई से प्राप्त मिट्टी का आयतन ज्ञात कीजिये।

हल : प्रश्नानुसार,

बेलनाकार कुएँ की त्रिज्या $r = 3.5$ मीटर

कुएँ की ऊँचाई $h = 20$ मीटर

खुदाई से प्राप्त मिट्टी का आयतन = कुएँ का आयतन
 $= \pi r^2 h$



चित्र 15.4

$$\begin{aligned}
 \text{मिट्टी का आयतन} &= \frac{22}{7} \times (3.5)^2 \times 20 \\
 &= \frac{22}{\cancel{7}_1} \times \cancel{3.5}^{0.5} \times 3.5 \times 20 \\
 &= 22 \times 0.5 \times 3.5 \times 20 \\
 &= 770 \text{ सेमी}^3
 \end{aligned}$$


उदाहरण 3.

22 मीटर × 10 मीटर आयताकार लोहे की चादर को लम्बाई के अनुदिश मोड़कर (दोनों सिरों को एक दूसरे पर चढ़ाये बिना) एक बेलनाकार पाइप बनाया गया है। पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए।



22 मीटर

10 मीटर



10 मीटर

चित्र 15.5

हल:

चूँकि लोहे की चादर को लम्बाई के अनुदिश मोड़ा गया है, अतः प्राप्त पाइप की ऊँचाई 10 मीटर होगी।

बेलनाकार पाइप की ऊँचाई $h = 10$ मीटर

यदि चादर को मोड़ने से बने पाइप की त्रिज्या r मीटर हो, तो

आयताकार चादर की लम्बाई = पाइप के आधार की परिधि

(Length of rectangular sheet = circumference of the base of pipe)

$$22 = 2\pi r$$

$$22 = 2 \times \frac{22}{7} \times r$$

$$\frac{22 \times 7}{2 \times 22} = r$$

$$r = \frac{7}{2} \text{ मीटर}$$

अतः पाइप का आयतन $= \pi r^2 h$

$$= \frac{22}{7} \times \left(\frac{7}{2}\right)^2 \times 10$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{11}{\cancel{22}} \times \frac{\cancel{7}}{\cancel{2}} \times \frac{7}{2} \times 10 \\
 &= 385 \text{ घन मीटर}
 \end{aligned}$$

उदाहरण 4.

एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी और ऊँचाई 8 सेमी हो तो उसका आयतन कितना होगा?

हल: प्रश्नानुसार,

बेलन के आधार का क्षेत्रफल = 154 सेमी²

बेलन की ऊँचाई = 8 सेमी

बेलन का आयतन = आधार का क्षेत्रफल × ऊँचाई
 $= 154 \text{ सेमी}^2 \times 8 \text{ सेमी}$
 $= 1232 \text{ सेमी}^3$



प्रश्नावली 15.1 (Exercise 15.1)

प्र.1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए —

- (i) बेलन के आधार का आकार होता है।
- (ii) बेलन के आयतन का सूत्र है।
- (iii) बेलन की त्रिज्या व ऊँचाई प्रत्येक 7 सेमी.की है तो बेलन का आयतन होगा।

प्र.2. एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेमी² है। यदि उसकी ऊँचाई 15 सेमी हो तो उसका आयतन कितना होगा?

प्र.3. बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसकी माप निम्नांकित हों —

- (i) त्रिज्या = 12 सेमी, ऊँचाई = 14 सेमी.
- (ii) त्रिज्या = 2.8 सेमी, ऊँचाई = 5 सेमी.
- (iii) व्यास = 20 मीटर, ऊँचाई = 21 मीटर


प्र.4. यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाये तो प्राप्त नये बेलन का आयतन एवं पहले वाले बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा?

प्र.5. एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 2.8 मीटर और ऊँचाई 3.5 मीटर है। उस टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए।

प्र.6. 1.4 सेमी. व्यास वाली तथा 90 सेमी. लम्बी लोहे की एक ठोस छड़ बनवाने के लिए कितने लोहे की आवश्यकता पड़ेगी?

बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल (Surface Area of Cylinder)


टिन का एक बन्द बेलनाकार डिब्बा लीजिए। बताइये कि इस डिब्बे का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किन-किन भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा?




टिन का डिब्बा (चित्र 15.6)

बेलनाकार डिब्बे में कुल तीन पृष्ठ हैं जिनमें से दो पृष्ठ वृत्ताकार (आधार व शीर्ष) तथा तीसरा पृष्ठ वक्राकार भाग है। आधार और शीर्ष दोनों वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर होगा। यदि वृत्तीय पृष्ठों की त्रिज्या r हो तो प्रत्येक वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल $= \pi r^2$ होगा।

अब प्रश्न उठता है कि तीसरे पृष्ठ अर्थात् वक्राकार भाग का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त किया जाये? चर्चा कीजिए।



चित्र 15.7



चित्र 15.8

वक्राकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसमें एक रेखाखण्ड PP' अंकित कर लेते हैं (चित्र 15.7)। अब डिब्बे के वक्राकार भाग को PP' (लम्बाई) के अनुदिश काटकर फैला देते हैं, जिससे हमें एक आयताकार पट्टी चित्र 15.8 की भाँति प्राप्त होती है। प्राप्त आयताकार पट्टी की लम्बाई, वक्राकार भाग की परिधि के बराबर होगी एवं चौड़ाई वक्राकार भाग की ऊँचाई के बराबर होगी। साथ ही आयताकार पट्टी एवं वक्राकार भाग के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे।

चूँकि वक्राकार भाग की त्रिज्या r है, इसलिए उसकी परिधि $= 2\pi r$

अब यदि वक्राकार भाग की (डिब्बे की) ऊँचाई h हो, तो

वक्राकार भाग का क्षेत्रफल

$=$ आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल

$=$ पट्टी की लम्बाई $\times$ चौड़ाई

= वक्राकार भाग की परिधि $\times$ ऊँचाई

$$= 2\pi r \times h = 2\pi rh$$

बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल	$= 2\pi rh$
--------------------------------	-------------

Area of curved surface of cylinder	$= 2\pi rh$
------------------------------------	-------------

अतः बेलनाकार डिब्बे का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल

= वक्राकार भाग का क्षेत्रफल + आधार का क्षेत्रफल + शीर्ष का क्षेत्रफल

$$= 2\pi rh + \pi r^2 + \pi r^2$$

$$= 2\pi rh + 2\pi r^2$$

$$= 2\pi r(h+r)$$

बेलन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल	$= 2\pi r (r+h)$
------------------------------------	------------------

Whole surface area of cylinder	$= 2\pi r (r+h)$
--------------------------------	------------------

उदाहरण 5. टिन का बना एक बन्द बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या 7 सेमी. तथा ऊँचाई 15 सेमी. है। उस डिब्बे को बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल: प्रश्नानुसार,

बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या $r = 7$ सेमी.

एवं ऊँचाई $h = 15$ सेमी.

प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल = डिब्बे का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल

= बेलन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल

$$= 2\pi r(h + r)$$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times (15 + 7)$$

$$= 2 \times \frac{22}{\cancel{7}_1} \times \cancel{7}^1 \times 22$$

$$= 968 \text{ सेमी}^2$$

उदाहरण 6. किसी ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेमी. और ऊँचाई 21 सेमी. है। बेलन का वक्र पृष्ठ और सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल: प्रश्नानुसार,

बेलन के आधार की त्रिज्या $(r) = 5$ सेमी.

ऊँचाई $(h) = 21$ सेमी.

बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल $= 2\pi rh$

$$= 2 \times \frac{22}{\cancel{7}_1} \times 5 \times \cancel{21}^3$$

$$= 2 \times 22 \times 5 \times 3$$

$$= 660 \text{ सेमी}^2$$

$$\begin{aligned}
 \text{तथा बेलन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल} &= 2\pi r(h + r) \\
 &= 2 \times \frac{22}{7} \times 5 \times (21 + 5) \\
 &= 2 \times \frac{22}{7} \times 5 \times 26 \\
 &= 817.14 \text{ सेमी}^2
 \end{aligned}$$

उदाहरण 7. एक बेलन का आयतन 36π सेमी³ और आधार का क्षेत्रफल 9π सेमी² है। बेलन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल: माना कि बेलन के आधार की त्रिज्या r सेमी. एवं उसकी ऊँचाई h सेमी. है।

$$\begin{aligned}
 \text{तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल} &= \pi r^2 \\
 9\pi &= \pi r^2 \\
 \frac{9\pi}{\pi} &= r^2 \\
 r &= \sqrt{9} \\
 r &= 3 \text{ सेमी}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{तथा बेलन का आयतन} &= \pi r^2 h \\
 36\pi &= \pi(3)^2 \times h \\
 36 &= 9h \\
 36/9 &= h \\
 h &= 4 \text{ सेमी}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{अतः बेलन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल} &= 2\pi r(r + h) \\
 &= 2 \times \pi \times 3(3 + 4) \\
 &= 6\pi \times 7 \\
 &= 42\pi \text{ सेमी}^2
 \end{aligned}$$

उदाहरण 8. एक बेलनाकार पाइप जिसका व्यास 14 सेमी. तथा ऊँचाई 20 सेमी. है, के वक्रिय पृष्ठ पर 2 रु. प्रति 100 सेमी² की दर से रंगाई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए।

हल : प्रश्नानुसार,

$$\text{पाइप का व्यास} = 14 \text{ सेमी.}$$

$$\text{त्रिज्या } r = \frac{14}{2} = 7 \text{ सेमी.}$$

$$\text{तथा पाइप की ऊँचाई (h)} = 20 \text{ सेमी.}$$

$$\text{पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल} = 2\pi rh$$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 20 = 880 \text{ सेमी}^2$$

दिया है कि प्रति 100 वर्ग सेमी का रंगाई व्यय = 2 रु.

$$\text{पाइप को रंगाने का कुल व्यय} = \frac{880 \cancel{\cancel{0}} \times 2}{10 \cancel{\cancel{0}}} = 17.60 \text{ रु.}$$

उदाहरण 9.

एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेमी है तथा उसकी ऊँचाई 2 मीटर है। उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : प्रश्नानुसार,

आधार की परिधि = 132 सेमी

बेलन की ऊँचाई (h) = 2 मीटर = 200 सेमी.

वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल = ?

$$\begin{aligned} \text{बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल} &= \text{आधार की परिधि} \times \text{ऊँचाई} \\ &= 132 \times 200 \\ &= 26400 \text{ सेमी}^2 \end{aligned}$$

अतः उस बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 26400 सेमी² है।

प्रश्नावली 15.2 (Exercise 15.2)

प्र.1. बेलन का वक्र पृष्ठ एवं सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिये जिनके माप निम्नानुसार हों—

- (i) त्रिज्या = 7 सेमी, ऊँचाई = 24 सेमी
- (ii) व्यास = 20 मीटर, ऊँचाई = 21 मीटर
- (iii) त्रिज्या = 10.5 सेमी, ऊँचाई = 35 सेमी
- (iv) त्रिज्या = 14 सेमी, ऊँचाई = 1 मीटर



- प्र.2. एक बेलनाकार टैंक के आधार की परिधि 176 सेमी तथा ऊँचाई 30 सेमी हो तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- प्र.3. एक बेलन का आयतन 44 घन सेमी तथा त्रिज्या 2 सेमी हैं। उसका सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- प्र.4. 14 मीटर व्यास के 25 मीटर गहरे कुएँ को खोदने पर कितने घन मीटर मिट्टी निकलेगी? इस कुएँ को अन्दर की ओर से प्लास्टर करवाने में 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च आयेगा?
- प्र.5. एक बेलन के आधार की परिधि 6 मीटर है एवं ऊँचाई 44 मीटर है। उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए।
- प्र.6. एक बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 1000π वर्ग सेमी और उसका व्यास 20 सेमी है। उस बेलन की ऊँचाई कितनी होगी?

हमने सीखा (We have learnt)

1. बेलन का आयतन $=$ आधार का क्षेत्रफल $\times$ ऊँचाई
 $= \pi r^2 h$
2. बेलन का वक्र पृष्ठ $=$ आधार की परिधि $\times$ ऊँचाई
 $= 2\pi r h$
3. बेलन का सम्पूर्ण पृष्ठ $= 2 \times$ आधार का क्षेत्रफल $+ \text{वक्र पृष्ठ}$
 $= 2\pi r^2 + 2\pi r h$
 $= 2\pi r(r + h)$
4. क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग इकाई होती है जैसे वर्ग सेमी, वर्ग मीटर आदि तथा आयतन की इकाई घन इकाई होती है जैसे घन सेमी, घन मीटर आदि।
5. एक ठोस बेलन में कुल तीन पृष्ठ होते हैं जिनमें से दो पृष्ठ वृत्ताकार (आधार एवं शीर्ष) एवं एक पृष्ठ वक्राकार होता है।



अध्याय-16

आकृतियाँ (द्विविमीय एवं त्रिविमीय)

FIGURES (TWO & THREE DIMENSIONAL)

हमने बहुत सी आकृतियों के बारे में जाना है और उनके गुणों को समझा है। इनमें से बहुत सी आकृतियों को हमने अपने आस-पास की वस्तुओं में छिपे हुए अथवा स्पष्ट रूप से दिखते हुए पाया है। हमने रेखा, रेखाखण्ड, त्रिभुज, चतुर्भुज व उनके विशेष प्रकार (सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समलम्ब चतुर्भुज आदि) एवं उससे ज्यादा भुजाओं वाली आकृतियों के बारे में अध्ययन किया है।


पूर्व की कक्षाओं में आपने अपने आस-पास पाए जाने वाले विभिन्न आकृतियों की पहचान की थी। क्या आप बता सकते हैं कि आयत की आकृति आपको कहां-कहां दिखती है?

और त्रिभुज कहां-कहां दिखता है?

त्रिभुज, सभी प्रकार के चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त आदि सभी किसी तल या दो आयाम में बनते हैं। अर्थात् इनमें लम्बाई है, चौड़ाई है किन्तु ऊँचाई नहीं है। लेकिन वास्तविक वस्तुओं में तो ऊँचाई होती है फिर कैसे इस ऊँचाई को भी चित्रों में प्रदर्शित करें।


आइए करके देखें (Come do and observe)

आप निम्न आकृतियों से पूर्व परिचित हैं। आप इनकी रचना करना भी जानते हैं—



चित्र-16.1

क्या आप ईंट, डिब्बा, गोला जैसी वस्तुओं को कागज पर बना सकते हैं? कुछ छात्र/छात्राओं ने ईंट की आकृति कुछ इस प्रकार बनाई—



चित्र-16.2

क्या यह सब ठीक दिखते हैं? ये सभी वैसे दिख रही हैं जैसी ईंटें दिखती हैं?


यह सभी आकृतियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं।

क्या आप बता सकते हैं कि यह अलग-अलग क्यों हैं?

क्रियाकलाप 1. (Activity 1)

इस बात को समझने के लिए माचिस का खाली डिब्बी लेकर माचिस को जलाने वाली (बारूद) सतह पर खड़ा करिए। माचिस कैसी दिखती है?

अब इसे इसकी बड़ी सतह पर रखिए।



चित्र-16.3

यह स्पष्ट है कि माचिस अब कुछ अलग तरह की दिख रही है। चित्र 16.3 (iii) को भी देखिए। इसमें छोटी सतह पर डिब्बी को खड़ा किया गया है। तीनों चित्र माचिस के हैं किन्तु अलग-अलग स्थिति के हैं।

ईंट के चित्र भी अलग-अलग स्थिति के हैं। ईंटें लेकर उन्हें विभिन्न चित्रों के आधार पर रख कर देखिए। क्या आप ऊपर के चित्रों के समान ईंटों को रख पाएँ?




क्रियाकलाप 2. (Activity 2)

आपने चॉक का डिब्बा देखा होगा। उसमें चॉक सीधे खड़े रखे जाते हैं। चॉक का एक भरा डिब्बा लीजिए और ठीक ऊपर से देखिए। आपको चॉक का वृत्तीय सिरा तो दिखेगा किन्तु उसकी लम्बाई नहीं।

अगर आप उसका चित्र बनाएँ तो कैसा दिखेगा? अनीता ने उसका चित्र कुछ इस प्रकार बनाया (चित्र 16.4) चॉक के खुले डिब्बे को सामने से बनाएँ तो वह कैसा दिखेगा?

इसमें अब चॉक का ऊपरी हिस्सा नहीं दिखेगा।




चित्र 16.4

अभ्यास 1 (Practice 1)

ऐसी 5 वस्तुएं लेकर उनको विभिन्न स्थितियों से देखकर उन वस्तुओं का चित्र बनाइये।

वस्तु की अलग-अलग स्थितियों का चित्र (Figure of an item with different position)


आइए, इस घनाभ की आकृति 16.5 को ध्यान से देखें—



चित्र 16.5

इस आकृति को विभिन्न दिशाओं से देखने पर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है—

ठीक सामने से देखने पर




चित्र 16.5 (i)

ठीक ऊपर से देखने पर



चित्र 16.5 (iii)

बाँये (बगल) से देखने पर




चित्र 16.5 (ii)

उपरोक्त तीनों आकृतियों को मिलाकर यदि एक आकृति बनाये तो पहले की आकृति बननी चाहिए। जिस प्रकार पहले की आकृति में एक विशेष झुकाव (कोण) के साथ इसकी फलकें आपस में जुड़ी हुई हैं उसी प्रकार इन तीनों आकृतियों को भी उसी विशेष झुकाव (कोण) के साथ जोड़ा जाये

तो पुनः वही आकृति प्राप्त होगी। यहाँ पर घनाभ की तीन ओर की फलकों को आपस में जोड़ा गया है। चित्र 16.5(iv)

अब यदि घनाभ की सभी छह फलकों को लेकर आपस में जोड़ें तो आकृति 16.5 प्राप्त होगी।




चित्र 16.5 (iv)


क्रियाकलाप-3.

घनाभ की आकृति बनाना (Construct a figure of cuboid)

रचना – एक गत्ते का आयताकार टुकड़ा लेते हैं। कागज पर आयताकार गत्ते के टुकड़े को रखकर उसके चारों तरफ पेंसिल चलाते हैं। इसे चित्र में ABCD से दर्शाया गया है। अब गत्ते के टुकड़े के चित्रानुसार बाँयी ओर खिसका कर रखते हैं और पुनः उसके चारों ओर पेंसिल चलाते हैं। चित्र में इसे EFGH से दर्शाया गया है। इस EFGH को छायांकित किया गया है।



चित्र 16.6 (i)



चित्र 16.6 (ii)

आकृति-16.6(ii) के अनुसार क्रमशः AE, BF, CG तथा DH को मिलाया गया है जो अभीष्ट घनाभ की आकृति है।

इसमें 6 आयताकार फलक— ABCD, ABFE, BCFG, CDHG, DAEH, EFGH हैं तथा 12 कोर— AB, BC, CD, DA, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, HE हैं एवं आठ शीर्ष— A, B, C, D, E, F, G, H हैं।


क्रियाकलाप-4.

त्रिभुजीय प्रिज्म की आकृति बनाना – (Make a figure of triangular prism)

रचना एक त्रिभुजाकार गत्ते का टुकड़ा लीजिए और एक कागज पर उसके चारों ओर पेंसिल चलाकर आकृति (i) तथा उससे कुछ दूरी पर इसी प्रकार आकृति (ii) बनाइए।


अब चित्र 16.7 (iii) की भाँति नामांकित कीजिए तथा AB,

A_1B_1 एवं A_2B_2 को मिलाइए और अब आपके सामने जो आकृति बनेगी वह चित्र 16.7 (iv) की भाँति




चित्र 16.7

होगी, जो कि अभीष्ट त्रिभुजीय प्रिज्म है।



चित्र 16.7 (iii)



चित्र 16.7 (iv)

इसमें तीन आयताकार फलक ABB_2A_2 , $A_1A_2B_2B_1$ तथा AA_1B_1B और दो त्रिभुजाकार फलक AA_1A_2 तथा BB_1B_2 हैं। इसमें 9 कोरें AB , A_1B_1 , A_2B_2 , AA_1 , A_1A_2 , A_2A , BB_1 , B_1B_2 तथा B_2B हैं और छह शीर्ष A , A_1 , A_2 , B , B_1 तथा B_2 हैं।

अभ्यास-2

- वर्गाकार गत्ते की सहायता से घन की रचना कीजिए।
- एक त्रिभुजीय गत्ते की सहायता से 4 सेमी लम्बे प्रिज्म की रचना कीजिए।


क्रियाकलाप-5.

बेलन की आकृति बनाना

Construct a cylindrical shape (cylinder)

रचना — एक वृत्ताकार चकती लेकर उसके चारों ओर पेंसिल से परिधि खींचिए एवं केन्द्र बिन्दु भी निर्धारित कीजिए चित्र 16.8 (i) & (ii) अब आपके पास चित्र 16.8 (ii) जैसी वृत्ताकार आकृति है, जो कि चकती को ठीक सामने से देखने पर दिखाई देती है। अब चकती को थोड़ा घुमाकर उसकी तिरछी स्थिति को देखिये और जैसे दिखाई देता है लगभग वैसी आकृति बनाइये। चित्र 16.8 (iii)


इसके बाद थोड़ा ओर घुमाकर चकती के एक किनारे से देखें तो यह चित्र 16.8 (iv) जैसी दिखाई देगी।




चित्र 16.8

अब चित्र 16.8 (iii) की आकृति के समान कुछ दूरी पर दो आकृतियाँ बनाइये। चित्र 16.8 (v) के अनुसार व्यास A_1B_1 और व्यास A_2B_2 को मिलाइये। उसके बाद A_1A_2 और B_1B_2 को मिलाइये। इस प्रकार एक बेलन की आकृति बन जाती है।

इसमें दोनों सिरों पर दो वृत्तीय फलक हैं एवं मध्य भाग वक्रिय है।



चित्र 16.8 (v)




चित्र 16.8 (vi)




क्रियाकलाप 6

शंकु की आकृति बनाना — (Construction of cone)

चित्र 16.8 (iii) के समान एक आकृति बनाइये तथा कुछ दूरी पर लगभग मध्य में एक बिन्दु O_2 ले लें तथा $O_2 A_1$ और $O_2 B_1$ मिला दें तो प्राप्त आकृति शंकु की आकृति होती है। चित्र 16.9 (i & ii) इस आकृति में एक वृत्ताकार फलक तथा एक शीर्ष और वक्रिय पृष्ठीय भाग होता है।



(i)



(ii)

चित्र 16.9

अभ्यास-3

1. 5 सेमी लम्बाई के एक बेलन की रचना कीजिए।
2. 3 सेमी ऊँचाई के एक शंकु की रचना कीजिए।
3. कागज मोड़कर बेलन एवं शंकु के मॉडल बनाइये।




क्रियाकलाप 7.

चतुष्फलक की आकृति बनाना — (Construction of quadrilateral)

रचना


1. चित्र 16.10 (i) के अनुसार एक त्रिभुज बनाइये और छायांकित कीजिए।
2. अब उस त्रिभुज के ऊपर चित्र 16.10 (ii) के अनुसार कुछ दूरी पर एक बिन्दु P लीजिए।
3. अब उस त्रिभुज के शीर्षों A, B, C को क्रमशः बिन्दु P से मिलाइये। प्राप्त आकृति चित्र 16.10 (iii) की भांति होगी। यह अभीष्ट चतुष्फलक है।




चित्र 16.10 (i) B

इसमें चार त्रिभुजीय फलक ABC, BCP, CAP तथा ABP हैं। ये त्रिकोणीय फलक भी कहलाते हैं। इसमें छः कोर AB, BC, CA, AP, BP तथा CP हैं और शीर्ष A, B, C तथा P हैं। इसमें प्रत्येक शीर्ष पर तीन कोरें मिलती हैं।

P.



चित्र 16.10 (ii)



चित्र 16.10 (iii)




क्रियाकलाप 8.


पिरामिड की आकृति बनाना (Construction of pyramid)

रचना


- चित्र 16.11(i) के अनुसार एक वर्ग



चित्र 16.11 (i)



चित्र 16.11 (ii)



चित्र 16.11 (iii)

की आकृति बनाइये और उसे छायांकित कीजिए।


- अब चित्र 16.11 (ii) के अनुसार वर्ग के उपर लगभग बीच में कुछ दूरी पर एक बिन्दु P लीजिए।
- अब बिन्दु P को वर्ग के प्रत्येक शीर्ष से मिलाइये। आपको चित्र 16.11 (iii) की भांति एक आकृति प्राप्त होगी, यह आकृति पिरामिड है।

इसमें एक वर्गाकार फलक $ABCD$ एवं चार त्रिकोणीय फलक ABP, BCP, CDP एवं


DAP हैं। इसकी 8 कोरें AB, BC, CD, DA, AP, BP, CP तथा DP है और पांच शीर्ष A,B, C,D तथा P है।

छिपे पृष्ठों का बिन्दुकित रेखा द्वारा प्रदर्शन
(Exhibit the hidden faces with the help of dotted lines)


नीचे घनाभ की कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। चित्र 16.12 (a) घनाभ की मूल आकृति है तथा अन्य आकृतियां घनाभ को विभिन्न स्थितियों में देखने पर बनती हैं। इन स्थितियों में घनाभ के कुछ भाग (शीर्ष, कोर एवं फलक) दिखाई नहीं देते। इनमें से शीर्ष एवं कोर को बिन्दुकित रेखा द्वारा दर्शाया गया है।




(a)




(b)




(c)



(d)



(e)




(f)

चित्र 16.12


अभ्यास-4

अब आप दिये गये आकृतियों के सामने से देखने पर छिपे हुए कोर एवं शीर्ष को बिन्दुकित रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हुए पुनः चित्र बनाइये। (काई दो स्थिति)


(A) घन



(B) त्रिभुजीय प्रिज्म



(C) बेलन







दी गई आकृतियों के शीर्ष, कोर और फलकों की पहचान एवं गणना करना।



क्रियाकलाप 9.

दिये गये आकृतियों में शीर्षों को नाम देकर शीर्षों, कोरों एवं फलकों को पहचानिए और सारणी में उनकी संख्या लिखिए। यहाँ घनाभ के शीर्ष, कोर एवं फलकों की संख्या को लिखकर एक संबंध बनाया गया है, शेष आकृतियों के संबंधित भागों की संख्या लिखकर उनमें संबंध स्थापित कीजिए।


सारणी 16.1 (Table 16.1)

क्र.	आकृति नाम एवं आकृति	शीर्ष(V)	कोर(E)	फलक(F)	V-E+F
1.	घनाभ 	8	12	6	$8-12+6=2$
2.	घन 				
3.	चतुष्फलक 				
4.	पिरामिड 				
5.	प्रिज्म 				

इस सारणी को पूर्ण करने के पश्चात आप पायेंगे कि प्रत्येक बहुफलक (चार या चार से अधिक फलकों से बनी आकृति) के लिए $V-E+F$ का मान सदैव 2 प्राप्त होता है। इस संबंध को यूलर ने स्थापित किया था। अतः उन्हीं के नाम पर इसे **यूलर संबंध** कहते हैं।

क्रियाकलाप 10.


किसी माप का एक घनाभ बनाइये और उसके ऊपरी फलक पर घनाभ के चौड़ाई के आकार से कम त्रिज्या का शंकु बनाइये। आपका चित्र, चित्र 16.13 के अनुसार है जिसमें एक घनाभ तथा शंकु दिखाई देता है।




चित्र 16.13


क्रियाकलाप 11.


नीचे दिए गये प्रत्येक चित्र में एक से अधिक आकृतियाँ सम्मिलित हैं। प्रत्येक चित्र की आकृतियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए।




(a) बेलन एवं टेबल




(b) -----




(c) -----



(d) -----




(e) -----





(f) -----

मॉडल बनाने हेतु सहायक आकृतियाँ (Secondary figure to make a model)



निम्न आकृतियों के फलकों को अलग करके दिखाया गया है। इनकी सहायता से आप कागज के टुकड़े काटकर उस आकृति का मॉडल बना सकते हैं।



चित्र 16.15





चित्र 16.16



बेलन



चित्र 16.17







चित्र 16.18

शंकु




चित्र 16.19


चतुष्फलक




चित्र 16.20

पिरामिड





चित्र 16.21



टीप – घन को घनाभ के फलकों की भांति तथा घनाभ को घन के फलकों की भांति अलग किया जा सकता है।

प्रश्नावली 16

1. 3 सेमी वर्ग की सहायता से एक घन बनाइये।
2. 5 सेमी लम्बाई के एक बेलन की रचना कीजिए।
3. अपनी कॉपी में 5 सेमी दूरी पर दो त्रिभुज एक त्रिभुजाकार गत्ते के टुकड़े की सहायता से बनाइए और इनकी सहायता से त्रिभुजीय प्रिज्म की रचना कीजिए।
4. अपनी कॉपी में चतुष्फलक की रचना कीजिए।
5. एक बहुफलक में चार फलक तथा चार शीर्ष हों तो क्या आप बता सकते हैं कि उसमें कितनी कोर होंगी?






अध्याय—17

संख्याओं का खेल

PLAYING WITH NUMBERS

हमने संख्याओं के बारे में काफी कुछ सीखा है। हमने बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखना सीखा है, हमने यह भी सीखा कि गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम शून्य जोड़ दें तो पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के सभी गुण मौजूद होते हैं। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं को 0, 1, 2, 3..... से लिखते हैं तथा पूर्ण संख्याओं (Whole Number) के समूह को W संकेत द्वारा बताते हैं। पूर्ण संख्याओं को समूह में इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं – $W = \{0, 1, 2, 3 \dots\}$ पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन इस प्रकार किया जा सकता है।



चित्र 17.1

आईए पूर्ण संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करें –

- प्र.1. क्या आप सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को बता सकते हैं?
- प्र.2. सबसे छोटी पूर्ण वर्ग विषम संख्या कौनसी है?.....
- प्र.3. 2, 5, 7 व 9 अंकों से चार अंकों की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं?

- प्र.4. 2, 4, 6, 8 अंकों का उपयोग करके सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याएँ बनाइए।
- प्र.5. पाँच अंकों की सबसे छोटी व चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अन्तर बताइये।
- प्र.6. 3, 7, 9 को अंकों के रूप में उपयोग करके सबसे बड़ी तीन अंकों की संख्या कौनसी बन सकती है और सबसे छोटी कौनसी।
- (i) लता कहती है कि ऊपर प्राप्त, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को जोड़ दें तो योगफल 11 से भाज्य होगा। क्या आप इससे सहमत हैं? जाँच करके देखिए।
- (ii) फातिमा ने कहा यह तो सिर्फ दो अंकों की संख्या के लिए ही सही है? फातिमा की बात की भी जाँच कीजिए।
- (iii) रमेश ने कहा जोड़ का तो पता नहीं किन्तु कोई भी 3 अंकों की संख्या तथा उसको उलट कर लिखने से प्राप्त संख्या में यदि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दें तो शेषफल 9 से भाज्य होगा और 11 से भी होगा। क्या यह बात सही है?
- (iv) ज्योति ने कहा तीन अंकों वाली संख्या ही नहीं, तुम कुछ अंक सोचो तथा उनसे बनने वाली

सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को घटाओ। यह हमेशा 9 से भाज्य होगी।

आइए एक खेल खेलें –

आप एक संख्या सोच लीजिए और उसके अंकों के योगफल को संख्या में से घटा दीजिए।

क्या यह 9 से विभाजित होगा? ऐसा क्यों होता है? कारण पता लगाइए।

माना कि आपने 7324 सोचा है, तब

$$\begin{aligned}\text{कथनानुसार } 7324 - (7 + 3 + 2 + 4) \\ &= 7324 - 16 \\ &= 7308\end{aligned}$$

जो कि 9 से विभाज्य है (क्योंकि इस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता है)। इसी प्रकार से आप भी अपने दोस्तों के साथ गणितीय खेल, खेल सकते हैं।

पूर्ण संख्याओं का योग (Sum of whole number)

1. आइए, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़कर देखें –

$$18 + 12 = 30 \text{ (पूर्ण संख्या)}$$

$$22 + 19 = 41 \text{ (पूर्ण संख्या)}$$

$$24 + 68 = 92 \text{ (पूर्ण संख्या)}$$

यहाँ 30, 41, 92 भी पूर्ण संख्याएँ हैं।

हम देखते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल भी पूर्ण संख्या है। क्या ऐसा हमेशा होगा?

आप भी कुछ और पूर्ण संख्याओं का जोड़ करके देखिए।

सोचिए, क्या कभी ऐसा होगा कि जोड़ पूर्ण संख्या न हो?

आप देखेंगे कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या होती है।

यदि **a** व **b** दो पूर्ण संख्याएँ हैं तो उनका योग **c** भी एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। अर्थात् $a + b = c$, इस नियम को संवरक नियम कहते हैं।

2. आइए, फिर से दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं

$$25 + 43 = 68 \text{ (पूर्ण संख्या)}$$

अब इन संख्याओं का क्रम बदल कर जोड़िये –

$$43 + 25 = 68 \text{ (पूर्ण संख्या)}$$

क्या दोनों योगफल समान हैं?

एक बार फिर दो संख्याओं को जोड़ें

$$10487 + 368 = 10855 \text{ (पूर्ण संख्या)}$$

अब इनका क्रम बदलकर फिर जोड़ें

$$368 + 10487 = 10855 \text{ (पूर्ण संख्या)}$$

क्या इनके योगफल में अन्तर है?

$$\text{इस प्रकार } 25 + 43 = 43 + 25 = 68$$

एवं $10487 + 368 = 368 + 10487 = 10855$

अतः दो पूर्ण संख्याओं का योग एवं उनका क्रम बदलकर जोड़ने पर योगफल समान होता है।

यदि a व b दो पूर्ण संख्याएँ हो तो उनका योग $(a + b)$ व उनका क्रम बदलकर योग $(b + a)$ करने पर योगफल समान होता है।

अर्थात् $a + b = b + a$ इसे हम योग का **क्रम विनिमेय नियम** कहते हैं।

3. आइये 0 में किसी पूर्ण संख्या को जोड़ें—

क्या संख्या के मान में परिवर्तन आता है? किसी पूर्ण संख्या a में 0 जोड़ने या 0 में कोई पूर्ण संख्या a जोड़ने पर दोनों स्थितियों में मान समान रहता है।

अर्थात् $a + 0 = 0 + a = a$ शून्य के इस विशेष गुण के कारण ही **शून्य को योग का तत्समक** कहते हैं।

4. अब हम तीन पूर्ण संख्याओं का योग करके देखते हैं। जैसे $17 + 29 + 44$ इस योगफल को दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। हम पहली दो संख्याओं 17 व 29 का योग करके उनमें तीसरी संख्या 44 को जोड़ते हैं।

$$(17 + 29) + 44 = 46 + 44 = 90$$

अब हम अन्तिम दो पूर्ण संख्याएँ 29 व 44 का योग करके उसमें पहली संख्या को जोड़ते हैं।

$$17 + (29 + 44) = 17 + 73 = 90$$

दोनों स्थितियों में क्या योग समान है?

अतः $(17 + 29) + 44 = 17 + (29 + 44)$

अतः यदि a, b, c तीन पूर्ण संख्याएँ हैं, तो

$a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)$ यह योग का **साहचर्य नियम** कहलाता है।

यही क्रिया चार या चार से अधिक संख्याएँ लेकर कीजिए और बताइये कि क्या उनका योग भी समान आयेगा?

पूर्ण संख्याओं के घटाने के नियम (Rules for subtracting of whole numbers)

1. दो संख्याओं के घटाने के नियम

$$15 - 8 = 7 \text{ (पूर्ण संख्या)}$$

$$25 - 14 = 11 \text{ (पूर्ण संख्या)}$$

$$18 - 18 = 0 \text{ (पूर्ण संख्या)}$$

$$16 - 23 = \text{ क्या यह पूर्ण संख्या होगी?}$$

क्या दो पूर्ण संख्याओं को घटाने से सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त हुई? यदि नहीं तो क्यों?

हाँ, यदि बड़ी पूर्ण संख्या में से छोटी पूर्ण संख्या को घटाते हैं या दो समान संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है लेकिन छोटी पूर्ण संख्या में से बड़ी पूर्ण संख्या घटाते समय पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है।

यदि a और b दो पूर्ण संख्याएँ हैं और $a > b$ अथवा $a = b$ हो तो $a - b = c$ एक पूर्ण संख्या होगी। और यदि $a < b$ हो, तो $a - b$ एक पूर्ण संख्या नहीं होगी।

2. अब तीन पूर्ण संख्याओं 25, 8, 6 घटाने की क्रिया करके देखते हैं। इसे दो प्रकार से घटाया जा सकता है। आओ घटाकर देखें।

$\begin{aligned}(25 - 8) - 6 \\ = 17 - 6 \\ = 11\end{aligned}$	$\begin{aligned}25 - (8 - 6) \\ = 25 - 2 \\ = 23\end{aligned}$
--	--

क्या दोनों स्थितियों में मान समान है?

ऐसी कुछ और संख्या लेकर हल कीजिए। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यही कि घटाते समय संख्याओं का क्रम कोष्ठक द्वारा नहीं बदला जा सकता है।

3. आइए, एक पूर्ण संख्या में से शून्य को घटाकर देखते हैं।

$$5 - 0 = 5, 18 - 0 = 18$$

आप और पूर्ण संख्याओं में से शून्य को घटाकर देखिए। क्या वही संख्या प्राप्त होती है?

अतः यदि a कोई पूर्ण संख्या है तो $a - 0 = a$

अतः किसी पूर्ण संख्या में से शून्य को घटाने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है।

4. अब $15 - 15 = 0, 23 - 23 = 0$

यही क्रिया अन्य पूर्ण संख्या लेकर कीजिए। क्या कभी 0 के अतिरिक्त कोई संख्या प्राप्त हुई? किसी पूर्ण संख्या में से उसी पूर्ण संख्या को घटाने पर हमें शून्य प्राप्त होता है।

अर्थात्

यदि a कोई पूर्ण संख्या है तो $a - a = 0$

पूर्ण संख्याओं का गुणा (Multiplication of whole numbers)

1. आइए, दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करके देखते हैं।

$$18 \times 8 = 144, \quad 29 \times 12 = 348$$

$$41 \times 7 = 287, \quad 86 \times 4 = 344$$

हम देखते हैं कि यहाँ 144, 348, 287, 344 सभी पूर्ण संख्याएँ हैं। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी पूर्ण संख्या होती है। क्या सदैव ऐसा होता है?

आप भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करके देखिए।

क्या कभी कोई गुणनफल पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हुई?

अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है।

यदि a व b दो पूर्ण संख्याएँ हों तो इनका गुणनफल c भी एक पूर्ण संख्या होगी।

अर्थात् $a \times b = c$ यह गुणा के लिए संवरक नियम है।

2. आओ दो पूर्ण संख्या 5 व 8 लें।

इनके गुणा करने से आपको क्या मान प्राप्त हुआ?

$$5 \times 8 = 40$$

अब इनको क्रम बदल कर गुणा करें।

$$8 \times 5 = 40$$

क्या दोनों गुणनफल में कोई अन्तर है?
 कुछ और पूर्ण संख्याएँ लेकर इनका गुणा कीजिए।
 इनका क्रम बदल कर गुणा कीजिए।
 क्या कहीं ऐसा भी हुआ कि गुणनफल में कोई फर्क आया?

दो पूर्ण संख्याओं का गुणा एवं उनके क्रम बदलकर गुणा करने पर मान हमेशा समान रहता है।

यदि a एवं b दो पूर्ण संख्या हों तो इनका गुणनफल $a \times b$ तथा इनका क्रम बदलकर गुणा $b \times a$ समान होगा। अर्थात् $a \times b = b \times a$ इसे गुणन के लिए क्रमविनिमेय नियम कहते हैं।

3. अब तीन पूर्ण संख्याएँ 4, 5, 6 लेकर इनको गुणा करें।
 इस गुणा को निम्न दो प्रकार से किया जा सकता है।

$4 \times 5 \times 6$	$= (4 \times 5) \times 6$	$= 4 \times (5 \times 6)$
$$	$= 20 \times 6$	$= 4 \times 30$
$$	$= 120$	$= 120$

क्या दोनों स्थितियों में मान समान आया? यदि हाँ तो कुछ और पूर्ण संख्याएँ लेकर इनका गुणा दोनों तरह से कीजिए।

क्या हर स्थिति में मान बराबर आया?

इसी प्रकार 4 संख्याएँ लेकर भी गुणा कीजिए।

तीन या अधिक संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा किया जाए तो गुणनफल का मान सदैव समान रहता है।

अर्थात् a , b और c तीन पूर्ण संख्या हैं तो $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$ यही गुणा के लिए साहचर्य नियम है।

4. अब, एक पूर्ण संख्या को 0 से गुणा करके देखते हैं।

$$8 \times 0 = 0, \quad 19 \times 0 = 0, \quad 0 \times 15 = 0$$

$$29 \times 0 = 0, \quad 45 \times 0 = 0, \quad 48 \times 0 = 0$$

इस प्रकार आप भी किसी पूर्ण संख्या को 0 से गुणा करके देखें क्या सदैव शून्य ही प्राप्त होता है?

अर्थात् किसी भी पूर्ण संख्या को 0 से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होगा।
 यदि a कोई पूर्ण संख्या है, तो $a \times 0 = 0$

5. इसी प्रकार किसी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा करके देखो। गुणनफल क्या प्राप्त हुआ?
 यदि किसी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा किया जाए तो हमें वहीं संख्या प्राप्त होती है।

यदि a कोई पूर्ण संख्या है तो $a \times 1 = a$, इस विशेष गुण के कारण ही एक को गुणन तत्समक कहते हैं।

6. नीचे लिखी संख्याओं का गुणा करके देखिए—
यह गुणा दो प्रकार से कर सकते हैं।

$$\begin{array}{rcl}
 & 5(8 + 4) & \\
 = & 5(8 + 4) & = 5(8 + 4) \\
 = & 5(12) & = 5 \times 8 + 5 \times 4 \\
 = & 60 & = 40 + 20 \\
 & & = 60
 \end{array}$$

क्या दोनों ही स्थितियों में बराबर मान प्राप्त हुआ?
इसी प्रकार :

$$\begin{array}{rcl}
 & 5(8 - 4) & \\
 = & 5 \times (8 - 4) & = 5(8 - 4) \\
 = & 5 \times 4 & = 5 \times 8 - 5 \times 4 \\
 = & 20 & = 40 - 20 \\
 & & = 20
 \end{array}$$

अतः यदि a, b, c पूर्ण संख्याएँ हों तो $a(b \pm c) = a \times b \pm a \times c$ इसे गुणा का योग/अंतर पर वितरण नियम कहते हैं।

ऐसे ही कोई भी तीन संख्याएँ लेकर दोनों प्रकार से हल करके देखिए कि क्या दोनों स्थितियों में बराबर मान प्राप्त होता है।

पूर्ण संख्याओं का विभाजन (Division of whole numbers)

1. हम जानते हैं कि भाग की क्रिया, गुणन क्रिया का प्रतिलोम है। आइए देखें कैसे?

$$40 \div 4 = 10 \Rightarrow 10 \times 4 = 40$$

$$21 \div 3 = 7 \Rightarrow 7 \times 3 = 21$$

आइए, भाग संक्रिया के कुछ और प्रश्नों को हल करके देखें।

$$20 \div 5 = 4 \text{ और शेषफल } 0$$

$$25 \div 4 = 6 \text{ और शेषफल } 1$$

पूर्ण संख्याओं में भाग की क्रिया से प्राप्त मान सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है, अर्थात् सदैव शेष 0 प्राप्त नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या का भाग देने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है।

2. हम जानते हैं कि

$$15 \div 15 = 1$$

$$28 \div 28 = 1$$

$$49 \div 49 = 1$$

अतः किसी भी पूर्ण संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर (शून्य को छोड़कर) भागफल सदैव 1 प्राप्त होता है।

अर्थात्

यदि a कोई पूर्ण संख्या है (शून्य को छोड़कर) तब $a \div a = 1$

$$\text{अब } 15 \div 1 = 15$$

$$28 \div 1 = 28$$

$$40 \div 1 = 40$$


किसी पूर्ण संख्या को एक से विभाजित करने पर भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। अर्थात् यदि a कोई पूर्ण संख्या है तब $a \div 1 = a$

भिन्न संख्या (Fractional number)


आइए, हम 21 में 4 का भाग करके देखते हैं। 21 में 4 के भाग को $\frac{21}{4}$ लिखते हैं और ऐसी संख्या भिन्न कहलाती है।

भिन्न संख्याएँ— वे संख्याएँ हैं जिनमें अंश और हर दोनों होते हैं।

नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जो यह इंगित करते हैं कि एक इकाई में कितने हिस्से किए गए एवं उनमें से कितने हिस्से (रेखांकित) लिए गए हैं।




(i)



(iii)

चित्र 17.2




(ii)

ऊपर दिए गए चित्रों में रेखांकित व रिक्त भाग को भिन्नों के रूप में लिखिए —

	रेखांकित भाग	कुल भाग	भिन्न
(i)	3	5	$\frac{3}{5}$
(ii)	-----	-----	-----
(iii)	-----	-----	-----

ये सभी उचित भिन्न हैं। उचित भिन्न वे भिन्न होती हैं जिनमें अंश का मान हर के मान से छोटा होता है तथा वे भिन्न जिनमें अंश का मान हर के मान से बड़ा होता है। उन्हें अनुचित (विषम) भिन्न कहते हैं। इन भिन्नों में कई पूर्ण इकाइयाँ हो सकती हैं। अनुचित भिन्न में कितनी पूर्ण व कितनी अपूर्ण इकाइयाँ हैं इसको प्रदर्शित करने के लिए मिश्र भिन्न का उपयोग करते हैं। जैसे $\frac{8}{3}$

को चित्रानुसार इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं।



चित्र 17.3

अर्थात् इसमें तीन इकाइयों के तीन समान भाग करके उसमें से दो इकाइयाँ पूरी तथा एक इकाई के तीन में से दो हिस्से लेना है।

मिश्र भिन्न को हम विभाजन के नियम के आधार पर भी लिख सकते हैं जैसे $\frac{78}{37}$ में 78 भाज्य व 37 भाजक है।

$$\begin{array}{r} 37) \ 78 \ (2 \\ \underline{74} \\ 4 \end{array} \text{ शेषफल}$$

तब $\frac{78}{37}$ को मिश्र भिन्न के रूप में $2\frac{4}{37}$ लिख सकते हैं।

जब भिन्नों के अंश समान हो तो हर के बड़ा होने पर भिन्न का मान छोटा होता जाता है।

जैसे : $\frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \frac{1}{4} > \frac{1}{5} > \frac{1}{6} \dots$ एवं जब भिन्नों के हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वह भिन्न बड़ा होगा। जैसे $\frac{1}{8} < \frac{2}{8} < \frac{3}{8} < \frac{4}{8} < \frac{5}{8} < \frac{6}{8} < \frac{7}{8}$

प्रश्नावली 17.1 (Exercise 17.1)

प्र.1. निम्न में से उचित एवं अनुचित भिन्नों को छांटिए –

- (i) $\frac{16}{5}$ (ii) $\frac{12}{13}$ (iii) $\frac{78}{41}$ (iv) $\frac{6}{7}$

प्र.2. निम्न भिन्नों को चित्रों में प्रदर्शित कीजिए –

- (i) $\frac{6}{5}$ (ii) $\frac{3}{8}$ (iii) $\frac{7}{11}$ (iv) $\frac{4}{15}$

प्र.3. बताइए निम्न भिन्नो में कितनी पूर्ण इकाईयाँ हैं? साथ ही इन्हें मिश्र भिन्न के रूप में भी लिखिए।

(i) $\frac{14}{9}$

(ii) $\frac{89}{12}$

(iii) $\frac{119}{18}$

(iv) $\frac{267}{61}$

प्र.4. भिन्नो को बढ़ते क्रम में लिखिए।

(i) $\frac{8}{9}, \frac{6}{9}, \frac{4}{3}, \frac{2}{5}$

(ii) $\frac{1}{9}, \frac{4}{9}, \frac{2}{9}, \frac{8}{9}, \frac{7}{9}$

भिन्नो को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना (Fraction on number line)

हम पूर्ण संख्याओं की भांति भिन्नो को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं।

भिन्नात्मक संख्याओं $\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{8}{9}$ एवं $\frac{13}{9}$ को संख्या रेखा पर नीचे लिखे तरीके से दर्शाया गया है।



चित्र 17.3

ऊपर संख्या रेखा में प्रदर्शित भिन्नो $\frac{4}{3}$ व $\frac{13}{9}$ पास-पास हैं परन्तु इनके बीच भी अनेक

भिन्न संख्याएँ हो सकती हैं जैसे : $\frac{25}{18}, \frac{37}{27}, \frac{51}{36}$ इत्यादि।


पूर्णांक (Integer)

पूर्ण संख्याओं को घटाते समय हमें ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता होती है और यदि पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को मिला दिया जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह मिलता है। पूर्णांकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के साथ शून्य भी होता है। पूर्णांक संख्याओं के समूह को I से व्यक्त करते हैं जैसे –

$$I = \{\dots -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\dots\}$$

पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाना (Whole number on number line)

रेखा पर एक बिन्दु शून्य मान कर उसके दाईं ओर धनात्मक एवं बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएँ लेते हैं और इसमें न तो सबसे बड़ी कोई संख्या होती है और न सबसे छोटी।



चित्र 17.4

परिमेय संख्या—

परिमेय संख्याएँ— वे संख्याएँ होती हैं जिन्हें $\frac{p}{q}$ जहाँ p तथा q पूर्णांक है परन्तु ($q \neq 0$) के रूप में लिखा जा सकता है। ये संख्याएँ धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी।

सभी संख्याएँ $\frac{4}{-5}, \frac{6}{4}, \frac{-13}{4}, \frac{8}{1}, \frac{-9}{-1}, \frac{0}{-7}, \dots$ परिमेय संख्याएँ हैं।

सभी भिन्न परिमेय संख्याएँ हैं तथा सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्याएँ हैं। हम परिमेय संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। साथ ही परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। परिमेय संख्याओं को मानक रूप में परिवर्तन किया जा सकता है जैसे $\frac{16}{20}$ का

मानक रूप $\frac{4}{5}$ होता है।

प्रश्नावली 17.2

प्र.1. निम्न भिन्नात्मक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए।

(i) $\frac{3}{5}$ (ii) $\frac{6}{5}$ (iii) $\frac{7}{8}$

प्र.2. निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को पूर्णांकों के रूप में लिखिए।

(i) $\frac{8}{1}$ (ii) $\frac{-12}{1}$ (iii) $\frac{20}{1}$

(iv) $\frac{-39}{1}$ (v) $\frac{59}{1}$

प्र.3. नीचे दी हुई संख्याओं के युग्म में से बड़ी संख्या बताइए।

(क) $\frac{5}{9}$ और 0 (ख) $\frac{-6}{7}$ और 0

(ग) $\frac{-5}{3}$ और $\frac{17}{-10}$ (घ) $\frac{6}{-5}$ और $\frac{-13}{-8}$

प्र.4. संख्या $\frac{4}{9}$ के अंश में क्या जोड़े कि यह $\frac{2}{3}$ बन जाए।

प्र.5. संख्या $\frac{5}{6}$ के हर में क्या घटाया जाए कि संख्या 1 प्राप्त हो।

प्र.6. किसी भिन्न का अंश उसके हर से 2 अधिक है यदि भिन्न का अंश 5 हो, तो भिन्न क्या होगी।



क्रियाकलाप 1. (Activity 1)

0, 4, 7 अंकों का उपयोग कर तीन अंकों की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं? सारणी में निम्नानुसार लिखिए –

सारणी 1

क्र.सं.	संख्या	स्थानीय मान में प्रसारित रूप	क्या संख्या तीन अंकों की है?
1.	047	$000 + 40 + 7$	नहीं
2.	407	$400 + 00 + 7$	हाँ
3.	-----	-----	-----
4.	-----	-----	-----
5.	-----	-----	-----
6.	-----	-----	-----

अवलोकन 1. तीन अंकों से बनी संख्याएँ कौन-कौन सी हैं?

2. 047 तीन अंकों की संख्या क्यों नहीं है?

किसी भी पूर्णांक संख्या के पूर्व 0 (शून्य) का कोई मान नहीं होता है। अतः $047 = 47$ जो दो अंकों की संख्या है।



क्रियाकलाप 2. (Activity 2)

सारणी को पूर्ण कीजिए –

क्र.सं.	a, b, c के मान	$100 \times a + 10 \times b + c$	संख्या
1.	$a = 9, b = 2, c = 8$	$100 \times 9 + 10 \times 2 + 8$	$900 + 20 + 8 = 928$
2.	$a = 3, b = 0, c = 4$		 = 304
3.	$a = 0, b = 7, c = 5$		
4.	$a = .., b = .., c = ..$		
5.	$a = .., b = .., c = ..$		

अभ्यास 1 (Practice 1)

- कोई भी तीन अंकों को उपयोग कर उनसे तीन अंकों की कितनी संख्याएँ बना सकते हैं? उन्हें बढ़ते क्रम में लिखिए।
- निम्न संख्याओं को $100a + 10b + c$ के रूप में व्यक्त कीजिए –
 (i) 376 (ii) 850 (iii) 69 (iv) 207





कुछ गणितीय खेल –



क्रियाकलाप 3.

जादूई त्रिभुज (Magic Triangle)

दिये गये त्रिभुज में 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक संख्याओं को इस प्रकार भरिए जिससे इसके प्रत्येक भुजा की संख्याओं का योग समान हो –



इन त्रिभुजों में आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या से एक ही त्रिभुज में विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित करने पर योगफल समान प्राप्त होता है।

इसी प्रकार आप भी क्रम से कोई भी छः संख्याओं से अलग-अलग समूह बनाकर समान योगफल प्राप्त कर सकते हैं।



क्रियाकलाप 4.

दिये गये क्रम (श्रेणी) को पूर्ण कीजिए –

- (i) 1, 2, 3, __, __, __, __, 8 (ii) 3, 5, 7, __, __, 13, __
 (iii) 26, 23, 20, __, __, __, 8, __ (iv) 7, 12, 18, __, __, 42, __, __, 75
 (v) 1, 4, 9, __, 25, __, __, 64, __



क्रियाकलाप 5.

निम्न क्रम को जारी रखते हुए रिक्त स्थानों (बॉक्स) की पूर्ति कीजिए –

$$1\frac{1}{2} \times 3 = 1\frac{1}{2} + 3$$

$$1\frac{1}{3} \times 4 = 1\frac{1}{3} + \square$$

$$1\frac{1}{\square} \times 5 = \square + 5$$

$$\square \times \square = 1\frac{1}{5} + \square$$

इन श्रेणियों को पूरा करने के पश्चात् आप स्वयं कोई भी दो श्रेणी बनाइये।

पहेली –

बिना कुछ पूछे संख्या का अनुमान लगाना –

भारती अपनी मित्र जयंती को तीन अंकों की कोई ऐसी संख्या सोचने को कहती है, जिसके प्रथम और अंतिम अंक बराबर न हों। फिर उस संख्या के अंकों के क्रम को उलटकर दूसरी संख्या बनाने को कहती है। उसके बाद प्राप्त संख्याओं में से बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाने को कहती है। इस प्रकार प्राप्त अंतर के अंकों के क्रम को पुनः उल्टे क्रम में रखकर एक अन्य संख्या बनाकर उसे अंतर से जोड़ने को कहती है। इतना सब कहने के बाद भारती अपनी मित्र जयंती को कहती है कि इतना सब करने के बाद तुम्हारे पास अंतिम योगफल 1089 आता है। इससे जयंती आश्चर्य में पड़ गई कि बिना कुछ बताये भारती को यह कैसे पता चला कि अंतिम योगफल 1089 है।

आइये, इस समस्या को हल करके देखते हैं –

माना कि जयंती के द्वारा सोची गई संख्या – 102 है।

तब 102 का उल्टा क्रम = 201

$$\begin{array}{r}
 \text{कथनानुसार} \quad 201 \\
 - 102 \\
 \hline
 099 \quad (\text{अन्तर}) \\
 \text{अब अंतर का उल्टा क्रम} = 990 \\
 \text{उनका योग} \quad 099 \\
 + 990 \\
 \hline
 1089
 \end{array}$$

इस प्रकार आप भी अपने साथियों के साथ ऐसा खेल खेल सकते हैं।



क्रियाकलाप 6.

पहेली को निर्देशानुसार भरिये —

बाँयें से दाँये —

A - छः के वर्ग का पाँच गुना

D - दस के वर्ग से एक कम

E - नौ के वर्ग से दस अधिक

F - आठ सैकड़ा से चार कम

G - नौ का घन

A	B			C
D			E	
		F		
	G			

ऊपर से नीचे —

A - चौदह का वर्ग

B - क्रमशः दो अंक

C - छः का घन

E - तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या

F - सबसे छोटी दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के वर्ग का दुगुना।

पहेली —

कक्षा 8 वीं के सभी छात्र-छात्राएँ अपनी उम्र बता रहे थे उनमें से अंजु एवं राजू ने अपनी उम्र बताने से मना कर दिया। तब कक्षा की छात्रा सुनीता बोली कि ठीक है तुम अपनी उम्र मत बताओ, लेकिन मेरे सवालियों के जवाब दो तो मैं तुम दोनों की उम्र बता सकती हूँ।

इस पर अंजु एवं राजू तैयार हो गए।

अब सुनीता ने अंजु को कुछ ऐसा करने को कहा — अंजु, आप अपनी उम्र को दुगुना करके उसमें पाँच जोड़ दो और प्राप्त संख्या को 50 से गुणा कर दो। इसके बाद प्राप्त संख्या में राजू की आयु जोड़ दो, फिर उसमें एक वर्ष के दिनों की संख्या (365) जोड़ दो। उसके बाद इस योगफल में से 615 घटा दो।

अब बताओं कि तुम्हें कौनसी संख्या प्राप्त हुई।

इतना सब करने के बाद अंजु और राजू ने अपना उत्तर बताया। उसी उत्तर से ही सुनीता ने

अंजु और राजू की उम्र बता दी।

अब अंजु और राजू आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने तो केवल अपने मन ही मन अपनी उम्र का हिसाब किया था फिर भी सुनीता को पता कैसे चला?

अब अंजु—राजू को सुनीता के उस तरीके को जानने की बड़ी उत्सुकता हुई। उनके पूछने पर राहुल और विवेक ने बताया —

माना कि अंजु तुम्हारी आयु 14 वर्ष है

$$\begin{aligned}\text{उसके दुगुने में 5 जोड़ने पर} &= 14 \times 2 + 5 \\ &= 28 + 5 = 33\end{aligned}$$

अब प्राप्त संख्या को 50 से गुणा करने पर $= 33 \times 50 = 1650$

अब इसमें राजू की उम्र (माना कि 13 वर्ष है) तथा वर्ष के दिनों की संख्या इसमें जोड़ने पर $= 1650 + 13 + 365 = 2028$

$$\text{अब इसमें 615 घटाने पर} = \frac{-615}{1413}$$

प्राप्त उत्तर 1413 में अंतिम दो अंक (इकाई व दहाई अंक से बनी संख्या) राजू की आयु तथा शुरु के दो अंक अंजु की आयु हैं।

इस प्रकार का खेल आप अपने दोस्तों के साथ खेल कर देखिए।



क्रियाकलाप 7.

जादुई वर्ग (Magic Square)

दिये गये जादुई वर्ग में 1 से 16 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को इस प्रकार भरिए कि आड़ा, खड़ा, तिरछा सभी तरह से जोड़ने पर योगफल 34 प्राप्त हो।

16			13
	10		
9		7	12
	15		1

34 योगफल

इस प्रकार आप भी क्रमशः 16 संख्याओं को लेकर कोई जादुई वर्ग बनाकर देखिए।

पहेली —

तीन अंकों की कोई भी एक संख्या लीजिए और उसे पुनः उसी क्रम में एक बार और लिखकर उसे छः अंकों की संख्या बना लीजिए। अब प्राप्त संख्या में क्रमशः 7, 11 और 13 से विभाजित कीजिए। क्या आपको उत्तर वही संख्या प्राप्त हुई जो आपने शुरु में ली थी? ऐसा क्यों हुआ कारण खोजिए?

प्रश्नावली — 17.3

- 3,0,5 अंकों के उपयोग से कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है? इनमें से दो अंकों एवं तीन अंकों से बनी संख्याओं को छाँटिए।
- दिये गये प्रश्नों को हल कीजिए —

(A) $37 \times 3 =$ -----	(B) $1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 9 \times 9 =$ -----
$37 \times 6 =$ -----	$1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 9 \times 18 =$ -----
$37 \times 9 =$ -----	$1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 9 \times 27 =$ -----
$37 \times 12 =$ -----	$1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 9 \times 36 =$ -----
-----	-----
-----	-----

- दिये गये क्रम को पूर्ण कीजिए —
 - 2, 5, 10, 17, __, __, 50, __, 82, __
 - 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, __, 21, __, 55, __,
 - 125, 120, 114, 107, __, __, __, 69, __
 - 20, 15, 11, __, __, 5
- दिये गये संबंध पर ध्यान दीजिए —

$$043 = 0^1 + 4^2 + 3^3 = 0 + 16 + 27 = 043$$

$$135 = 1^1 + 3^2 + 5^3 = 1 + 9 + 125 = 135$$

$$2427 = 2^1 + 4^2 + 2^3 + 7^4 = 2 + 16 + 8 + 2401 = 2427$$
 इसी प्रकार निम्न को हल कीजिए —

$$063, 175, 518, 1306$$
- 1 से 9 तक के अंकों को क्रम से लेकर व चिन्हों का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार से 100 प्राप्त होंगे? करके देखिए —
- दिये गये वर्ग में A, B, C, J का मान, योग करते हुए ज्ञात कीजिए —


योग

	57	49	30	A	B
	32	C	30	27	114
	28	D	26	29	E
	13	15	17	F	71
	37	35	G	H	120
योग	I	136	128	130	J

- विजय ने एक संख्या में 5 का गुणा करके उसमें 5 घटा दिया तथा उसके बाद प्राप्त संख्या में 5 का भाग दे दिया। अब आप बताइये विजय को कौनसी संख्या प्राप्त हुई। क्या प्राप्त

- संख्या ली गई संख्या से 1 कम हैं? ऐसा क्यों हुआ?
8. जरीना तीन अंकों की संख्या 258 को लेकर उसे छः अंकों की 258258 बनायी तथा इस संख्या को तीन अभाज्य संख्याओं 7, 11 और 13 से क्रमशः विभाजित किया। बताइये जरीना को भागफल कौनसी संख्या प्राप्त हुई। क्या यह उसके द्वारा ली गई प्रारम्भिक संख्या है? ऐसा क्यों हुआ?
 9. सिमंस का मकान क्रमांक 57 है। उसके दोगुने में 5 जोड़ने के बाद उसे 50 से गुणा करके उसमें अपने दोस्त कैलाश का आयु जोड़ 15 वर्ष जोड़ दिया और फिर उसमें वर्ष के दिनों की संख्या (365) जोड़कर उसमें 615 घटा दिया? इन संक्रियाओं के बाद प्राप्त उत्तर क्या 5715 है? क्या उत्तर में सिमंस का मकान क्रमांक एवं कैलाश की उम्र है? ऐसा क्यों हुआ?
 10. संख्या 2 को पाँच बार लेकर उसमें चिन्हों $+$, $-$, $\times$ व $\div$ में से एक से अधिक चिन्हों का (आवश्यकता होने पर एक से अधिक बार) उचित प्रयोग करके 3 एवं 7 संख्या प्राप्त कीजिए। इसी प्रकार अन्य अंकों को भी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए।
 11. यहाँ 7 अभाज्य संख्याएँ दी गई हैं, इन संख्याओं को दी गयी आकृति में इस प्रकार स्थान दीजिए कि इसकी भुजाओं का योगफल 41 आ जाए।

5, 7, 11, 13, 17, 19, 23



विभाज्यता की जाँच (Verification rule of Divisibility)

कोई एक संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर पता लगाने के लिए हम भाग की क्रिया करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे सरल नियम भी हैं जिनकी मदद से हम बिना भाग की क्रिया किए पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या किसी निश्चित संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं। आइए ऐसे कुछ नियम देखें। (इस पाठ में आगे 'पूरी तरह विभाजित' के स्थान पर हम 'विभाजित' ही लिखेंगे। विभाज्यता का अर्थ भी पूरी तरह विभाजित होने के संदर्भ में लें।)

1. 2 से विभाज्यता — यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ऊपर लिखी बात को दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहा जा सकता है कि —

“यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी।

अर्थात् 612, 298, 520 आदि संख्याएँ 2 से विभाजित होंगी जबकि 231, 369, 5127 आदि संख्याएँ 2 से विभाजित नहीं होंगी।

2. **3 से विभाज्यता** — यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। संख्या 5142 के अंकों का योग $5 + 1 + 4 + 2 = 12$ है। यह योग 12, संख्या 3 से विभाजित होता है इसलिए संख्या 5142, संख्या 3 से विभाजित होगी।
3. **5 से विभाज्यता** — जिन संख्याओं की इकाई के स्थान पर अंक 0 या 5 हो वे 5 से विभाजित होती हैं।
985, 270, 665 सभी 5 से विभाज्य हैं और 827, 453, 509 की इकाई के स्थान पर 0 या 5 नहीं हैं, ये संख्याएँ 5 से विभाजित नहीं होंगी।
4. **7 से विभाज्यता** — किसी संख्या की इकाई के अंक को दोगुना कर शेष अंकों से बनी संख्या से घटाइए तथा अब प्राप्त संख्या पर फिर से यही प्रक्रिया तब तक दोहराए जब तक एक या दो अंकों की संख्या प्राप्त न हो। इस प्रकार प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी।
उदाहरण के लिए 2457 की इकाई का अंक 7 है। 7 का दोगुना = 14
 $245 - 14 = 231$
231 की इकाई का अंक 1 है। 1 का दोगुना = 2
 $23 - 2 = 21$
21 संख्या 7 से विभाज्य है इसलिए 2457 भी 7 से विभाजित होगी।
5. **11 से विभाज्यता** — इकाई से शुरू कर संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग निकालिए। इसी प्रकार संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग निकालिए। यदि इन दोनों योगों का अंतर 0 अथवा 11 गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी।
जैसे — संख्या 934461 के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग $1 + 4 + 3 = 8$
सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग $6 + 4 + 9 = 19$
दोनों योगों का अंतर $19 - 8 = 11$
अतः संख्या 934461, संख्या 11 से विभाज्य है।
6. **4 से विभाज्यता** — यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यदि इकाई, दहाई पर 0 हो तो भी वह संख्या 4 से विभाजित होगी।

जैसे — 3436, 5812, 7096 आदि 4 से विभाज्य है और 3858, 7627 आदि 4 से विभाज्य नहीं हैं।

7. **6 से विभाज्यता** — यदि कोई संख्या 2 से तथा 3 से अलग-अलग विभाजित होती हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी।

जैसे — 456, 2 से विभाज्य है। (इकाई का अंक 6 है।)

456, 3 से विभाज्य है। (अंकों का योग 15 है।)

अतः 456, 6 से भी विभाज्य है।

8. **8 से विभाज्यता** — यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों वाली संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी।

यदि संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों स्थानों पर 0 हो तब भी वह संख्या 8 से विभाज्य होगी।

जैसे — 93816 के इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 816, 8 से विभाजित होती है, इसलिए 93816 भी 8 से विभाज्य है। इसी प्रकार 56713, 8 से विभाज्य नहीं है।

9. **9 से विभाज्यता** — किसी संख्या के 9 से विभाजित होने का नियम 3 से विभाज्यता के नियम जैसा ही है।

यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी।

जैसे — 23436 के अंकों का योग

$$2 + 3 + 4 + 3 + 6 = 18$$

संख्या 18, 9 से विभाजित होती है, इसलिए 23436 भी 9 से विभाज्य है।

10. **10 से विभाज्यता** — किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी।

उदाहरण के लिए 93410 की इकाई के स्थान पर 0 है इसलिए 93410, 10 से विभाज्य है। वहीं 30857 की इकाई के स्थान पर 0 नहीं है, इसलिए 30857, 10 से विभाज्य नहीं है।

प्रश्नावली — 17.4

- जाँच कीजिए कि क्या निम्नलिखित संख्याएँ 2 से विभाजित होती हैं —
(i) 252 (ii) 457 (iii) 436 (iv) 3509 (v) 94241
- 3 से विभाज्यता की जाँच कीजिए —
(i) 324 (ii) 2500 (iii) 20325 (iv) 83812 (v) 24033
- कौन-कौन सी संख्याएँ 5 से विभाजित होती हैं —
(i) 932 (ii) 815 (iii) 6570 (iv) 45864 (v) 77129
- दी गई कौन-कौन सी संख्याएँ 7 से विभाजित होती हैं —
(i) 560 (ii) 791 (iii) 5623 (iv) 7007

हमने सीखा (We have learnt)

- दो पूर्ण संख्याओं का योगफल एक पूर्ण संख्या होती है।
- दो पूर्ण संख्याओं का योग एवं उनका क्रम बदल कर योग करने पर योगफल समान होगा।
- किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ने या शून्य में कोई पूर्ण संख्या जोड़ने पर मान पूर्ण संख्या हो रहेगा।
- यदि a , b और c तीन पूर्ण संख्याएँ हैं तो $(a+b) + c = a + (b+c)$
- दो पूर्ण संख्याओं a और b हो तो $a > b$ तथा $a = b$ स्थिति में घटाने पर एक पूर्ण संख्या होगी।
- यदि a कोई पूर्ण संख्या हो तो $a - 0 = a$
- यदि a कोई पूर्ण संख्या हो तो $a - a = 0$
- दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होगा—
$$a \times b = c$$
- यदि a व b दो पूर्ण संख्या हैं तो उनका गुणनफल c भी एक पूर्ण संख्या होगा।
- दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एवं उनका क्रम बदलकर गुणा करने पर गुणनफल समान रहेगा।
$$a \times b = b \times a$$
- तीन पूर्ण संख्याओं का विभिन्न स्थितियों में गुणनफल समान होता है। $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
- यदि a कोई पूर्ण संख्या हो एवं उसे शून्य से गुणा करें तो गुणनफल शून्य होगा $a \times 0 = 0$
- यदि a कोई पूर्ण संख्या हो एवं उसे 1 से गुणा करें तो गुणनफल $a \times 1 = a$ होगा।





अध्याय—18

परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं

(OPERATIONS ON RATIONAL NUMBERS)

आप जान चुके हैं कि ऐसी सभी संख्याएँ जो $\frac{p}{q}$ के रूप में लिखी जा सकती हैं, परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं जिसमें p और q पूर्णांक हैं एवं $q \neq 0$ है। छठवीं कक्षा में भिन्न पढ़ते समय आपने धनात्मक भिन्न संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना एवं भाग करना सीखा है। आइए इन्हीं संक्रियाओं को और विस्तार से समझें।

परिमेय संख्याओं का योग (ADDITION OF RATIONAL NUMBERS)



चित्र – 18.1

एक तरबूज बेचने वाले ने एक तरबूज के 10 समान भाग किए। सुजीत ने उसमें से 2 भाग लिए, उमा ने 3 भाग लिए तथा आकांक्षा ने 3 भाग लिए तो तरबूज वाले के कुल कितने भाग बिक गए।

$$\text{यहाँ कुल 10 भागों में से सुजीत ने लिए 2 भाग} = \frac{2}{10}$$

$$\text{कुल 10 भागों में से उमा ने लिए 3 भाग} = \frac{3}{10}$$

$$\text{आकांक्षा ने लिए 3 भाग} = \frac{3}{10}$$

$$\begin{aligned} \text{अतः सुजीत, उमा एवं आकांक्षा द्वारा लिए गए कुल भाग} &= \frac{2}{10} + \frac{3}{10} + \frac{3}{10} \\ &= \frac{2+3+3}{10} = \frac{8}{10} \end{aligned}$$

X	X	X
X	X	X
X	X	X
0	0	0
0	0	

चित्र – 18.2

$\frac{8}{10}$ तरबूज बेचने वाले के कुल 10 भागों में से 8 भाग या $\frac{8}{10}$ भाग तरबूज बिक गया।

आइए, दो परिमेय व्यंजकों के योग को एक चित्र की सहायता से समझें।

उदाहरण 1. $\frac{3}{5}$ में $\frac{1}{3}$ जोड़िए।

एक आयत लेकर उसके $\frac{3}{5}$ भाग दर्शाने के लिए चार

आड़ी रेखाएँ खींचकर आयत को पाँच समान भागों में विभाजित किया और इन समान पाँच भागों में तीन भागों को X के चिन्ह से चिह्नित किया। पुनः $\frac{1}{3}$ के लिए आयत में दो खड़ी रेखाएँ खींचकर आयत को तीन समान भागों में बाँटा। इन तीन समान भागों में से एक भाग को 0 के चिन्ह से चिह्नित किया। अब आयत कुल 15 भागों में बँट चुका है। इसमें X लगे भागों के साथ 0 लगे भागों को जोड़िए।

$$\text{कुल X लगे भाग} + \text{कुल 0 लगे भाग} = 9 + 5 = 14$$

$$15 \text{ भागों में } 14 \text{ भाग} = \frac{14}{15}$$

$$\text{तथा } \frac{3}{5} + \frac{1}{3} = \frac{9+5}{15} = \frac{14}{15}$$

उसी प्रकार $\frac{3}{5} - \frac{1}{3}$ के लिए X लगे भागों की संख्या में से 0 लगे भागों की संख्या घटाइए या $9-5=4$ भाग तथा कुल भागों की संख्या 15 हैं—

$$\text{अतः } \frac{3}{5} - \frac{1}{3} = \frac{9-5}{15} = \frac{4}{15}$$

इसी प्रकार चित्र बनाकर निम्नलिखित जोड़ एवं घटाना के प्रश्नों को हल कीजिए तथा सरलतम रूप में लिखिए—

$$(i) \quad \frac{3}{7} + \frac{1}{4} \quad (ii) \quad \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \quad (iii) \quad \frac{3}{7} - \frac{1}{4} \quad (iv) \quad \frac{2}{5} - \frac{1}{3}$$

$$(v) \quad \frac{5}{6} + \frac{2}{3} \quad (vi) \quad \frac{1}{4} - \frac{2}{3}$$

आइए, आपके द्वारा हल किए गए प्रश्नों के उत्तरों पर विचार करें

उत्तर (i) - इस प्रश्न को हल करते समय आपने आयत में छः आड़ी रेखाएँ खींचकर सात समान भागों में बाँटा है तथा उन सात भागों में से तीन भागों को × के चिन्ह से चिह्नित किया है। पुनः आयत में तीन खड़ी रेखा खींचकर चार समान भागों में बाँटा है तथा चार भागों में से 1 भाग को ✓ के चिन्ह से चिह्नित किया है। इस प्रकार आयत कुल 28 समान भागों में बँट गया और 28 भागों में × के चिन्ह लगे हुए 12 खाने हैं। तथा ✓ के निशान लगे 7 खाने हैं।

$$\text{अतः } \frac{3}{7} \text{ एवं } \frac{1}{4} \text{ का योगफल के लिए } 28 \text{ खानों में से } 12 + 7 = 19 \text{ खाने होंगे या}$$

$$\frac{3}{7} + \frac{1}{4} = \frac{12}{28} + \frac{7}{28} = \frac{19}{28} \text{ होगा।}$$

उसी प्रकार $\frac{3}{7} - \frac{1}{4}$ के लिए $\frac{12}{28} - \frac{7}{28}$ भाग या $\frac{5}{28}$ भाग होगा।

उत्तर (v) इस प्रश्न को हल करने के लिए आपने आयत को आड़ी या खड़ी रेखा खींचकर 6 भागों में बांटा एवं 6 भागों में से 5 भागों को आपने $\times$ से चिन्हित किया अब पुनः आयत को पूर्वानुसार तीन समान भागों में बांटा और इन तीन भागों से 2 भाग को $\checkmark$ के चिन्ह से चिन्हित किया। अब आयत कुल 18 भागों में बंट गया। इसमें $\times$ लगाए हुए 15 खाने एवं $\checkmark$ लगे हुए 12 खाने हैं। इस

प्रकार कुल $\times$ एवं $\checkmark$ लगे खानों की संख्या = $15 + 12 = 27$ अतः $\frac{5}{6} + \frac{2}{3} = \frac{15}{28} + \frac{12}{28} = \frac{27}{28}$

इसका सरलतम रूप $\frac{3}{2}$ होगा।

इन प्रश्नों को हल करते हुए फातिमा ने राजू से कहा कि पिछले साल हम भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए उन्हें समहर बनाते थे। योगफल का हर दोनों भिन्न संख्याओं के हरों के गुणनफल के बराबर होता था। इस विधि में भी योगफल का हर दोनों परिमेय संख्याओं के हरों के गुणनफल के समान होता है। राजू ने कहा कि पिछले पाठ में हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्याओं को $\frac{p}{q}$ या $\frac{r}{s}$ के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ p, q, r एवं s पूर्णांक है तथा $q \neq 0$ एवं $s \neq 0$

क्या इन संख्याओं को जोड़ने या घटाने के लिए समहर विधि का उपयोग किया जा सकता है? फातिमा ने कहा, 'चलो हल करके देखते हैं'

$\frac{p}{q} + \frac{r}{s}$ समहर बनाने के लिए $\frac{p}{q}$ के अंश एवं हर को s से गुणा करेंगे तथा $\frac{r}{s}$ के अंश एवं हर को q से गुणा करेंगे।

$$\frac{p}{q} \times \frac{s}{s} + \frac{r}{s} \times \frac{q}{q} = \frac{ps}{qs} + \frac{rq}{sq} = \frac{ps + rq}{qs}$$

समतुल्य भिन्न बनाकर भी छोटे हर वाली भिन्नों को हम जोड़ सकते हैं। जैसे : $\frac{5}{6} + \frac{3}{8}$

$\frac{5}{6}$ की समतुल्य भिन्न $\Rightarrow \frac{5}{6}, \frac{10}{12}, \frac{15}{18}, \frac{20}{24}, \frac{25}{30}$ आदि

$\frac{3}{8}$ की समतुल्य भिन्न $\Rightarrow \frac{3}{8}, \frac{6}{16}, \frac{9}{24}, \frac{12}{32}$ आदि

अतः दी गई भिन्नों की समान हर वाली समतुल्य भिन्न –

$$\frac{5}{6} \text{ का } \frac{20}{24} \text{ एवं } \frac{3}{8} \text{ का } \frac{9}{24} \quad \text{अतः } \frac{5}{6} + \frac{3}{8} = \frac{20}{24} + \frac{9}{24}$$

$$= \frac{20+9}{24} = \frac{29}{24}$$

आप भी इसी प्रकार निम्न परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।

$$(1) \quad \frac{m}{n} + \frac{r}{\ell} \quad (2) \quad \frac{a}{b} + \frac{q}{n} \quad (3) \quad \frac{s}{t} + \frac{c}{d}$$

समहर बनाकर $\frac{3}{5} + \frac{-4}{7}$ परिमेय संख्याओं को जोड़िए।

यहाँ हर 5 एवं 7 है, अतः समहर बनाने के लिए पहली परिमेय संख्या के अंश एवं हर में 7 का तथा दूसरी परिमेय संख्या के अंश एवं हर में 5 का गुणा करेंगे—

$$\text{अतः } \frac{3}{5} = \frac{3 \times 7}{5 \times 7} = \frac{21}{35} \quad \text{एवं} \quad \frac{-4}{7} = \frac{-4 \times 5}{7 \times 5} = \frac{-20}{35}$$

$$\therefore \frac{3}{5} + \frac{-4}{7} = \frac{21}{35} + \frac{-20}{35} = \frac{21-20}{35} = \frac{1}{35}$$

कभी—कभी समहर बनाकर प्रश्न को हल करते समय हर में उभयनिष्ठ गुणनखण्ड आ जाते हैं।

क्या आप $\frac{5}{6} + \frac{3}{8}$ का मान प्राप्त कर सकते हैं?

$$\text{राधा प्रश्न को हल करने लगी —} \quad \frac{5}{6} \times \frac{8}{8} + \frac{3}{8} \times \frac{6}{6}$$

परन्तु राधा का यह तरीका फातिमा को पसन्द नहीं आया। उसने कहा चूंकि दोनों संख्याओं के हर में 2 एक गुणनखण्ड के रूप में है इसलिए समहर बनाने के लिए अंश और हर को 2 से गुणा करने की जरूरत नहीं है अर्थात् $\frac{5}{6}$ के अंश एवं हर को $\frac{4}{4}$ से गुणा कर तथा $\frac{3}{8}$ के अंश एवं हर को $\frac{3}{3}$ से गुणा करेंगे।

$$\frac{5}{6} \times \frac{4}{4} + \frac{3}{8} \times \frac{3}{3}$$

$$\frac{20}{24} + \frac{9}{24} = \frac{20+9}{24} = \frac{29}{24}$$

इस प्रकार से भी दो परिमेय संख्याओं के सम हर बनाये जा सकते हैं।

राधा ने कहा इसका मतलब $\frac{3}{2 \times 5} + \frac{5}{2 \times 7}$ को सम हर करने पर हर $2 \times 5 \times 7$ होगा और

यही हरों का ल.स. भी है।

क्रियाकलाप 1. (Activity 1)

हरों का ल.स. निकालकर परिमेय संख्याओं को जोड़ने एवं घटाने की प्रक्रिया को नीचे क्रियाकलाप में दिए गए निर्देश के अनुसार हल कीजिए:-

सारणी - 1

सं. क्र.	प्रथम परिमेय संख्या	द्वितीय परिमेय संख्या	हरों का ल.स.व.	$\frac{\text{प्रथम परिमेय संख्या का अंश} \times \text{ल.स.व.}}{\text{प्रथम परिमेय संख्या का हर}} + \frac{\text{द्वितीय परिमेय संख्या का अंश} \times \text{ल.स.व.}}{\text{द्वितीय परिमेय संख्या का हर}}$ हरों का ल.स.व.	परिणाम
1.	$\frac{4}{15}$	$\frac{7}{12}$	60	$\frac{4 \times \frac{60}{15} + 7 \times \frac{60}{12}}{60} = \frac{4 \times 4 + 7 \times 5}{60} = \frac{16 + 35}{60}$	$\frac{51}{60}$ या $\frac{17}{20}$
2.	$\frac{7}{10}$	$\frac{3}{10}$	—	—	—
3.	$\frac{-7}{3}$	$\frac{11}{12}$	—	—	—
4.	$\frac{-15}{8}$	$\frac{13}{12}$	—	—	—
5.	$\frac{6}{7}$	$\frac{5}{21}$	—	—	—

योग संक्रिया के गुणधर्म

दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने से प्राप्त योगफल कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हैं। आइए, इसे निम्न उदाहरणों से देखते हैं। उदाहरणों में रिक्त स्थानों को स्वयं भरकर जांच कीजिए-

क्रियाकलाप 2 (Activity 2)

1. संवरक गुण (Closure Property)

सारणी - 2

क्र.सं.	परिमेय संख्याएँ	योग	योग के चरण	योगफल	परिमेय संख्या है या नहीं
1	$\frac{5}{7}$ एवं $\frac{4}{7}$	$\frac{5}{7} + \frac{4}{7}$	$\frac{5+4}{7}$	$\frac{9}{7}$	हां
2	3 एवं $-\frac{6}{5}$	$\frac{3}{1} + \frac{-6}{5}$	$\frac{3 \times 5 + (-6) \times 1}{5}$	$\frac{9}{5}$	हां
3	$-\frac{5}{13}$ एवं $\frac{5}{13}$	—	—	—	—
4	$\frac{1}{8}$ एवं $\frac{7}{8}$	—	—	—	—

तालिका से स्पष्ट है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। इसे योग का संवरक नियम कहते हैं। आप ऐसी ही कोई दो परिमेय संख्या लेकर उन्हें जोड़कर देखें कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं।

2. क्रम विनिमेय नियम (Commutative law)

माना दो परिमेय संख्याएँ $-\frac{5}{6}$ एवं $\frac{3}{4}$ हैं तब

$$-\frac{5}{6} + \frac{3}{4} = \frac{-5 \times 2 + 3 \times 3}{12} = \frac{-10 + 9}{12} = -\frac{1}{12}$$

$$\text{तथा } \frac{3}{4} + \left(-\frac{5}{6}\right) = \frac{3}{4} + \frac{(-5)}{6} = \frac{3 \times 3 + (-5) \times 2}{12} = \frac{9 + (-10)}{12} = -\frac{1}{12}$$

$$\text{अतः } -\frac{5}{6} + \frac{3}{4} = \frac{3}{4} + \left(-\frac{5}{6}\right)$$

निम्न तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए—

सारणी — 3

क्र.	परिमेय संख्याएँ	परिमेय संख्याओं का योगफल	क्रम बदलने पर परिमेय संख्याओं का योगफल	क्या दोनों स्थितियों में मान समान आता है
1	$\frac{1}{8}$ एवं $\frac{7}{8}$	$\frac{1}{8} + \frac{7}{8} = \frac{1+7}{8} = \frac{8}{8}$	$\frac{7}{8} + \frac{1}{8} = \frac{7+1}{8} = \frac{8}{8}$	हां
2	$-\frac{3}{8}$ एवं $\frac{5}{16}$	$-\frac{3}{8} + \frac{5}{16} = \text{-----}$	$\frac{5}{16} + \left(-\frac{3}{8}\right) = \text{-----}$	-----
3	$-\frac{7}{15}$ एवं $-\frac{8}{25}$	$-\frac{7}{15} + \frac{-8}{25} = \text{-----}$	$\frac{-8}{25} + \frac{-7}{15} = \text{-----}$	-----
4	$\frac{p}{q}$ एवं $\frac{r}{s}$	$\frac{p}{q} + \frac{r}{s} = \text{-----}$	$\frac{r}{s} + \frac{p}{q} = \text{-----}$	-----

उपरोक्त तालिका में हम पाते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने से तथा उनके क्रम को बदल कर जोड़ने से दोनों ही स्थितियों में प्राप्त योगफल का मान बराबर रहता है।

क्रम बदल कर परिमेय संख्याओं को जोड़ने से भी उनका योगफल समान आता है इसे परिमेय संख्याओं के योग का क्रम विनिमेय नियम कहते हैं।

$$\text{अतः } \frac{p}{q} \text{ एवं } \frac{r}{s} \text{ दो परिमेय संख्याएँ हों तो } \frac{p}{q} + \frac{r}{s} = \frac{r}{s} + \frac{p}{q} \text{ होगा।}$$

$$\text{यदि } \frac{3}{4} + \frac{-5}{8} = x + \frac{3}{4} \text{ हो तो } x \text{ का मान बताइए?}$$

3. साहचर्य नियम (Associative law)

माना तीन परिमेय संख्याएँ $\frac{4}{5}$, $\frac{2}{7}$ एवं $-\frac{3}{8}$ है। इनका योगफल दो प्रकार से किया जा सकता है।

$$\begin{aligned} \text{प्रथम तरीका : } \frac{4}{5} + \left(\frac{2}{7} + \frac{-3}{8}\right) &= \frac{4}{5} + \left(\frac{2 \times 8 - 3 \times 7}{56}\right) \\ &= \frac{4}{5} + \left(\frac{16 - 21}{56}\right) = \frac{4}{5} - \frac{5}{56} \end{aligned}$$

$$= \frac{4 \times 56 - 5 \times 5}{280} = \frac{224 - 25}{280} = \frac{199}{280}$$

द्वितीय तरीका : $\left(\frac{4}{5} + \frac{2}{7}\right) + \frac{-3}{8} = \left(\frac{4 \times 7 + 2 \times 5}{35}\right) + \left(\frac{-3}{8}\right) = \left(\frac{28 + 10}{35}\right) - \left(\frac{3}{8}\right)$

$$= \frac{38}{35} - \frac{3}{8}$$

$$= \frac{38 \times 8 - 3 \times 35}{280} = \frac{304 - 105}{280}$$

$$= \frac{199}{280}$$

यहाँ $\frac{4}{5} + \left(\frac{2}{7} + \frac{-3}{8}\right) = \left(\frac{4}{5} + \frac{2}{7}\right) + \frac{-3}{8}$

इस प्रकार तीन परिमेय संख्याओं का योग करते समय पहले प्रथम दो संख्याओं के योग में तीसरी संख्या को जोड़ें तब वही मान प्राप्त होगा जो द्वितीय एवं तृतीय परिमेय संख्या के योग में प्रथम संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसे **परिमेय संख्याओं के योग का साहचर्य नियम** कहते हैं।



क्रियाकलाप 3

निम्न का मान ज्ञात कीजिए—

- (1) $\frac{1}{11} + \left(\frac{5}{6} + \frac{7}{12}\right)$ तथा $\left(\frac{1}{11} + \frac{5}{6}\right) + \frac{7}{12}$ (3) $\frac{-2}{3} + \left(\frac{1}{5} + \frac{3}{4}\right)$ तथा $\left(\frac{-2}{3} + \frac{1}{5}\right) + \frac{3}{4}$
- (2) $\frac{3}{4} + \left(\frac{-5}{3} + \frac{4}{5}\right)$ तथा $\left(\frac{3}{4} + \frac{-5}{3}\right) + \frac{4}{5}$

क्या दोनों स्थितियों में मान समान आते हैं?

उपरोक्त क्रियाकलाप में हम पाते हैं कि दोनों स्थितियों में योगफल समान आता है अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग संक्रिया पर साहचर्य नियम का पालन करती है।

4. परिमेय संख्याओं के साथ शून्य का योग (Sum of Zero with other rational numbers)

आप जानते हैं कि पूर्णांक में शून्य को जोड़ने पर संख्या का मान नहीं बदलता। आइए परिमेय संख्याओं में शून्य जोड़कर देखें—

जैसे $\frac{3}{5} + 0 = \frac{3}{5} + \frac{0}{5} = \frac{3+0}{5} = \frac{3}{5}$

$$\text{इसी प्रकार } 0 + \frac{-4}{9} = \frac{-4}{9}$$

क्या शून्य के अलावा कोई ऐसी परिमेय संख्या बता सकते हैं जिसको किसी परिमेय संख्या में जोड़ने पर उस संख्या का मान न बदले?

इस प्रकार आप जानते हैं कि शून्य के अलावा कोई भी परिमेय संख्या ऐसी नहीं है जिसे किसी अन्य परिमेय संख्या में जोड़ने पर मान नहीं बदलता। शून्य के इसी गुण के कारण ही इसे **योगात्मक तत्समक** कहते हैं।

$$\text{यदि } \frac{p}{q} \text{ कोई परिमेय संख्या हो, तो } \frac{p}{q} + 0 = \frac{p}{q}$$

5. योज्य प्रतिलोम (Additive Inverse)

$$\frac{11}{15} \text{ और } \frac{-11}{15} \text{ दो परिमेय संख्याएँ हैं—}$$

$$\text{इनका योगफल } \frac{11}{15} + \left(\frac{-11}{15}\right) = \frac{11-11}{15} = 0$$

नीचे दी गई दो समान परिमेय संख्यायें जिनमें से एक धनात्मक है तथा दूसरी ऋणात्मक है, उन परिमेय संख्याओं का योगफल बताइये।

$$(i) \quad \frac{-13}{36} + \frac{13}{36} = \text{-----}$$

$$(ii) \quad \frac{+289}{295} + \frac{-289}{295} = \text{-----}$$

प्रत्येक परिमेय संख्या के लिए एक परिमेय संख्या अवश्य होती है जिसे दी गई परिमेय संख्याओं में जोड़ने से योगफल शून्य (योगात्मक तत्समक) प्राप्त होता है। वह दी गई परिमेय संख्या का **योज्य प्रतिलोम** कहलाती है।

$$\text{जैसे, } \frac{3}{5} \text{ का योज्य प्रतिलोम } \frac{-3}{5} \text{ है।}$$

$$\frac{-17}{19} \text{ का योज्य प्रतिलोम } + \frac{17}{19} \text{ है।}$$

इस प्रकार, किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए दी गई संख्या में कोई ऐसी

संख्या जोड़ी जावे जिससे योगफल शून्य या योगात्मक तत्समक प्राप्त हो। जैसे यदि $-\frac{5}{7} + x = 0$ तो $x = \frac{5}{7}$, अतः $-\frac{5}{7}$ का योज्य प्रतिलोम $\frac{5}{7}$ है।

प्रश्नावली 18.1 (Exercise 18.1)

1. निम्नांकित परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।

(i) $\frac{3}{2}, \frac{13}{17}$ (ii) $\frac{-7}{9}, \frac{-3}{4}$ (iii) $\frac{3}{4}, \frac{-2}{5}$

2. क्रम विनिमेय नियम से रिक्त स्थानों को भरिए :-

(i) $\frac{-5}{9} + \frac{4}{7} = \frac{4}{7} + \dots\dots\dots$ (ii) $\frac{-11}{29} + \frac{6}{31} = \dots\dots + \dots\dots$

(iii) $\frac{-15}{7} + \dots\dots = \frac{13}{9} + \dots\dots$ (iv) $\frac{5}{6} + \left(\frac{-7}{9}\right) = \frac{-7}{9} + \dots\dots$

3. दिखाइए कि $\left(\frac{-2}{5} + \frac{4}{9}\right) + \frac{-3}{4} = \frac{-2}{5} + \left(\frac{4}{9} + \frac{-3}{4}\right)$

इसमें किस नियम का प्रयोग किया गया है।

4. सरल कीजिए -

(i) $\frac{3}{7} + \frac{4}{9} + \frac{-6}{11}$ (ii) $\frac{-1}{6} + \frac{-2}{3} + \frac{-1}{3}$

(iii) $\frac{5}{14} + \frac{2}{-7} + \frac{-3}{2}$

5. $\frac{-7}{12}$ में क्या जोड़े कि योगफल 0 प्राप्त होता है?

6. रिक्त स्थानों को भरिए :-

(i) $\frac{-5}{7}$ का योज्य प्रतिलोम = -----

(ii) $\frac{4}{17} + \frac{-4}{17} = \dots\dots$

(iii) $0 + \frac{39}{51} = \dots\dots$

(iv) $\frac{42}{17}$ का योज्य प्रतिलोम = -----

7. निम्नलिखित प्रत्येक सवाल किसी न किसी नियम से सम्बन्धित है उस नियम को दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए—

(i) $\frac{13}{15} + \frac{4}{8} = \frac{4}{8} + \frac{13}{15}$ (.....)

(ii) $\frac{2}{19} + \left(\frac{-3}{17} + \frac{4}{13}\right) = \left(\frac{2}{19} + \frac{-3}{17}\right) + \frac{4}{13}$ (.....)

(iii) $\frac{P}{q} + 0 = \frac{P}{q}$ (.....)

(iv) $\frac{-r}{S} + \frac{r}{S} = 0$ (.....)

8. आप कुछ परिमेय संख्याएं सोचिए, उन संख्याओं पर योग हेतु क्रम विनिमेय नियम एवं साहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए।

परिमेय संख्याओं को घटाना (Subtraction of Rational Numbers)

कक्षा छठवीं में एक भिन्न संख्या से दूसरी भिन्न संख्या को घटाने के लिए आपने हरों को समान बनाकर हल प्राप्त किया था। वास्तव में घटाने की क्रिया जोड़ने की विपरीत क्रिया है। किसी संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने का अर्थ है, पहली संख्या में दूसरी संख्या के योज्य प्रतिलोम को जोड़ना। आइए, इसे निम्न उदाहरणों द्वारा समझे —

उदाहरण 2. $\frac{3}{8}$ में से $\frac{1}{4}$ को घटाइए।

अतः $\frac{3}{8} - \frac{1}{4} = \frac{3 \times 1 - 1 \times 2}{8} = \frac{3 - 2}{8} = \frac{1}{8}$ (4 व 8 का ल.स. 8 है)

दी गई संख्या में $\frac{1}{4}$ के योज्य प्रतिलोम $-\frac{1}{4}$ को जोड़ने पर हमें निम्नानुसार प्राप्त होता है।

अतः $\frac{3}{8} + \left(\frac{-1}{4}\right) = \frac{3}{8} + \frac{(-1)}{4} = \frac{3 \times 1 + (-1) \times 2}{8}$
 $= \frac{3 - 2}{8} = \frac{1}{8}$

इस प्रकार, दोनों मान बराबर प्राप्त होते हैं।

अब आप $\frac{7}{19}$ में से $\frac{11}{13}$ को घटाइए तथा $\frac{7}{19}$ में से $\frac{11}{13}$ के योज्य प्रतिलोम को जोड़कर अपने उत्तर की जांच कीजिए।

संख्या रेखा द्वारा भी परिमेय संख्याओं को घटाया जा सकता है, आइए देखें—


उदाहरण 3. $\frac{5}{6}$ में से $\frac{7}{12}$ को घटाइए।

हल : यहाँ पर दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान नहीं है अतः हल करने से पूर्व उन्हें समान हर में बदलना होगा।

$$\frac{5}{6} = \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{10}{12} \quad (\because 6 \text{ व } 12 \text{ का ल.स.} = 12)$$

$$\frac{7}{12} = \frac{7 \times 1}{12 \times 1} = \frac{7}{12}$$

संख्या रेखा में एक इकाई के 12 भागों में बांटते हैं। पहले $\frac{10}{12}$ को दर्शाने के लिए शून्य के दायीं ओर 10 खाने चलते हैं। चूंकि $\frac{7}{12}$ को घटाना है, अतः 10 वें खाने में बायीं ओर वापस 7 खाने लौटते हैं।



और $\frac{3}{12}$ पर पहुँचते हैं। इस प्रकार $\frac{5}{6}$ में से $\frac{7}{12}$ घटाने पर $\frac{3}{12}$ प्राप्त होगा।


$$\begin{aligned} \frac{5}{6} - \frac{7}{12} &= \frac{10}{12} - \frac{7}{12} \\ &= \frac{10-7}{12} \\ &= \frac{3}{12} \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

उदाहरण 4. $\frac{4}{9}$ में से $\frac{-3}{9}$ को घटाइए।

हल: चूंकि किसी परिमेय संख्या को घटाने का तात्पर्य उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ना है, अतः $\frac{-3}{9}$ को घटाने का अर्थ है कि $\frac{-3}{9}$ के योज्य प्रतिलोम $\frac{3}{9}$ को जोड़ना।

$$\frac{4}{9} - \left(\frac{-3}{9} \right) = \frac{4}{9} + \frac{3}{9} = \frac{4+3}{9} = \frac{7}{9}$$

संख्या रेखा में 0 से 1 के बीच के भाग को 9 बराबर भागों में बांटते हैं। संख्या रेखा पर दर्शाने हेतु पहले शून्य के दायीं ओर 4 खाने चलते हैं तथा पुनः 3 खाने उसी दिशा में आगे



चित्र 18.4

चलते हैं। इस प्रकार 7 वें खाने में पहुँचते हैं जो $\frac{7}{9}$ के बराबर है।

$$\text{अतः } \frac{4}{9} - \left(\frac{-3}{9} \right) = \frac{7}{9}$$

उदाहरण 5. $\frac{5}{9}$ में क्या जोड़े कि योगफल $\frac{2}{3}$ हो।

हल : माना $\frac{5}{9}$ में $\frac{p}{q}$ जोड़ने पर योगफल $\frac{2}{3}$ प्राप्त होता है।

$$\frac{5}{9} + \frac{p}{q} = \frac{2}{3}$$

दोनों ओर $\frac{5}{9}$ का योज्य प्रतिलोम $-\frac{5}{9}$ जोड़ने पर

$$\frac{5}{9} + \frac{p}{q} + \left(\frac{-5}{9} \right) = \frac{2}{3} + \left(\frac{-5}{9} \right)$$

$$\text{या } \frac{p}{q} = \frac{2}{3} + \left(\frac{-5}{9} \right)$$

$$\text{या } \frac{p}{q} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} + \left(\frac{-5 \times 1}{9 \times 1} \right) \quad (3 \text{ एवं } 9 \text{ का ल.स. } 9 \text{ है।})$$

$$\text{या } \frac{p}{q} = \frac{6}{9} + \left(\frac{-5}{9} \right)$$

$$\text{या } \frac{p}{q} = \frac{6-5}{9}$$

$$\text{या } \frac{p}{q} = \frac{1}{9}$$

अतः $\frac{5}{9}$ में $\frac{1}{9}$ जोड़ने से $\frac{2}{3}$ प्राप्त होगा।

उदाहरण 6. $\frac{11}{13}$ में क्या घटाएं कि हमें $\frac{5}{26}$ प्राप्त हो।

हल : माना $\frac{11}{13}$ में से $\frac{p}{q}$ घटाने पर हमें $\frac{5}{26}$ प्राप्त होती है।

$$\frac{11}{13} - \frac{p}{q} = \frac{5}{26}$$

दोनों ओर $\frac{11}{13}$ का योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर

$$\text{या } \frac{11}{13} - \frac{p}{q} + \left(-\frac{11}{13}\right) = \frac{5}{26} + \left(-\frac{11}{13}\right)$$

$$\text{या } -\frac{p}{q} = \frac{5}{26} + \left(-\frac{11}{13}\right)$$

$$\text{या } -\frac{p}{q} = \frac{5 \times 1}{26} + \left(\frac{-11 \times 2}{13 \times 2}\right) \quad (13 \text{ एवं } 26 \text{ का ल.स. } 26 \text{ है})$$

$$\text{या } -\frac{p}{q} = \frac{5}{26} + \left(\frac{-22}{26}\right)$$

$$\text{या } -\frac{p}{q} = \frac{5-22}{26}$$

$$\text{या } -\frac{p}{q} = \frac{-17}{26}$$

$$\text{या } \frac{p}{q} = \frac{17}{26} \quad (\text{दोनों ओर } -1 \text{ से गुणा करने पर})$$

$$\text{या } \frac{11}{13} \text{ में से } \frac{17}{26} \text{ घटाने पर } \frac{5}{26} \text{ प्राप्त होता है।}$$

उदाहरण 7. $\frac{1}{4} + \frac{-5}{9} - \left(\frac{-7}{12}\right)$ को सरल कीजिए।

हल : यहाँ पर हमें तीन परिमेय संख्याएँ दी गई हैं जिसमें जोड़ना एवं घटाना क्रिया एक साथ दी गई है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सभी परिमेय संख्याओं को समान हर वाली परिमेय संख्याओं में बदलते हैं।

$$\frac{1}{4} = \frac{1 \times 9}{4 \times 9} = \frac{9}{36} \quad (\text{यहाँ } 4, 9 \text{ एवं } 12 \text{ का ल.स. } 36 \text{ है।})$$

$$\frac{-5}{9} = \frac{-5 \times 4}{9 \times 4} = \frac{-20}{36}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{-7}{12} &= \frac{-7 \times 3}{12 \times 3} = \frac{-21}{36} \\
 \frac{1}{4} + \left(\frac{-5}{9} \right) - \left(\frac{-7}{12} \right) &= \frac{9}{36} + \frac{-20}{36} - \left(\frac{-21}{36} \right) \\
 &= \frac{9 - 20 + 21}{36} \\
 &= \frac{30 - 20}{36} \\
 &= \frac{10}{36} = \frac{5}{18}
 \end{aligned}$$

परिमेय संख्याओं में घटाना संक्रिया के गुण (Properties of subtraction in Rational Number)

1. **संवरक का नियम** : परिमेय संख्याओं के योग क्रिया के गुणों को हम जान चुके हैं। परिमेय संख्याओं के लिए घटाना संक्रिया में कुछ गुण लागू होते हैं। आइए, निम्न उदाहरण को देखें

$$\frac{11}{21} \text{ में से } \frac{25}{36} \text{ को घटाइए।}$$

$$\begin{aligned}
 \text{यहाँ } \frac{11}{21} - \frac{25}{36} &= \frac{11 \times 12 - 25 \times 7}{252} = \frac{132 - 175}{252} \text{ (यहाँ 21 एवं 36 का ल स व 252 है)} \\
 &= \frac{-43}{252} \text{ जो कि एक परिमेय संख्या है।}
 \end{aligned}$$

यहाँ $\frac{11}{21}$, $\frac{25}{36}$ एवं $\frac{-43}{252}$ तीनों परिमेय संख्या हैं। अतः घटाना संक्रिया के लिए परिमेय संख्याएँ संवरक नियम का पालन करती हैं। आप कुछ परिमेय संख्याएँ लेकर इस नियम की जांच कीजिए।

2. **परिमेय संख्याओं में से शून्य को घटाना** : यदि किसी परिमेय संख्या में से शून्य को घटाएँ तो परिमेय संख्या का मान नहीं बदलता है।

$$\text{जैसे } \frac{-21}{45} - 0 = \frac{-21}{45} \text{ और } \frac{5}{17} - 0 = \frac{5}{17}$$

$$\frac{P}{Q} - 0 = \frac{P}{Q}$$

3. **क्रम विनिमेय नियम** :

अब आप निम्न का मान बताइए –

$$(i) \frac{5}{12} - \frac{6}{13} \text{ तथा } (ii) \frac{6}{13} - \frac{5}{12}$$

$$\begin{aligned}
 \text{यहाँ } \frac{5}{12} - \frac{6}{13} &= \frac{5 \times 13}{12 \times 13} - \frac{6 \times 12}{13 \times 12} \\
 &= \frac{65}{156} - \frac{72}{156} \quad (\text{यहाँ 12 एवं 13 का ल.स. 156 है।}) \\
 &= \frac{65 - 72}{156} \\
 &= \frac{-7}{156}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{तथा } \frac{6}{13} - \frac{5}{12} &= \frac{6 \times 12}{13 \times 12} - \frac{5 \times 13}{12 \times 13} \\
 &= \frac{72}{156} - \frac{65}{156} \\
 &= \frac{72 - 65}{156} \\
 &= \frac{7}{156}
 \end{aligned}$$

क्या $\frac{-7}{156}$, $\frac{7}{156}$ के बराबर हैं, नहीं बराबर नहीं है।

$$\text{अतः } \frac{5}{12} - \frac{6}{13} \neq \frac{6}{13} - \frac{5}{12}$$

अतः घटाना संक्रिया में क्रम विनिमेय नियम लागू नहीं होता है।

प्रश्नावली 18.2

प्रश्न 1. दी गई पहली परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाइए।

(i) $\frac{3}{4}$ में से $\frac{4}{5}$

(ii) $\frac{1}{4}$ में से $\frac{-1}{8}$

(iii) $\frac{-5}{12}$ में से $\frac{13}{24}$

(iv) $\frac{-8}{13}$ में से $\frac{-7}{13}$

प्रश्न 2 हल कीजिए

(i) $\frac{2}{9} + \frac{1}{3} - \frac{5}{9}$

(ii) $\frac{1}{5} - \frac{3}{7} + \frac{1}{2}$

(iii) $-\frac{1}{12} + \frac{3}{5} - 6$

प्रश्न 3 $\frac{3}{8}$ में क्या जोड़े कि योगफल $\frac{11}{12}$ हो जाये।

प्रश्न 4 $\frac{13}{25}$ में क्या घटाए कि हमें $\frac{19}{25}$ प्राप्त हो जावे।

प्रश्न 5 सत्य/असत्य लिखिए तथा असत्य कथनों को सही करके लिखिए।

(i) $-\frac{3}{5}$ का योज्य प्रतिलोम $\frac{5}{3}$ है।

(ii) $\frac{4}{5} - \frac{7}{9} = \frac{7}{9} - \frac{4}{5}$

(iii) 0 को किसी संख्या में से घटाने पर मान अपरिवर्तित रहता है।

(iv) किसी परिमेय संख्या को घटाने का अर्थ है उस परिमेय संख्या के योज्य प्रतिलोम को जोड़ना।

परिमेय संख्याओं का गुणा (Multiplication of Rational Numbers)

दो भिन्न संख्याओं का गुणा करते समय आपने यह देखा कि अंश का अंश के साथ तथा हर का हर के साथ गुणा होता है। परिमेय संख्याएँ भी चूँकि अंश एवं हर से मिल कर बनी होती है इसलिए परिमेय संख्याओं का गुणा भी उसी प्रकार से होता है। आइए परिमेय संख्याओं का गुणा कुछ उदाहरणों के द्वारा समझें—

उदाहरण 8. $\frac{3}{4}$ एवं $\frac{7}{16}$ का आपस में गुणा कर मान लिखिए।

हल : $\frac{3}{4} \times \frac{7}{16} = \frac{3 \times 7}{4 \times 16} = \frac{21}{64}$



उदाहरण 9. $-\frac{5}{7}$ एवं $\frac{13}{17}$ का आपस में गुणा कर मान लिखिए।

हल : $-\frac{5}{7} \times \frac{13}{17} = \frac{-5 \times 13}{7 \times 17} = \frac{-65}{119}$

उदाहरण 10. $-\frac{9}{11}$ एवं $\frac{22}{27}$ का आपस में गुणा कर मान लिखिए।

हल : $-\frac{9}{11} \times \frac{22}{27} = \frac{9 \times 22}{11 \times 27}$
 $= \frac{-1 \times 2}{1 \times 3} = \frac{-2}{3}$

ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि दो परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करने के लिए उनके अंश को अंश से एवं हर को हर से गुणा करते हैं तथा प्राप्त गुणनफल सरलतम रूप में लिखते हैं।

यदि $\frac{p}{q}$ एवं $\frac{r}{s}$ दो परिमेय संख्याएँ हो तो $\frac{p}{q} \times \frac{r}{s} = \frac{p \times r}{q \times s}$

उदाहरण 11. निम्न परिमेय संख्याओं का परस्पर गुणा कीजिए $\frac{2}{3}, -\frac{6}{7}, \frac{8}{15}$

हल: $\frac{2}{3} \times \frac{-6}{7} \times \frac{8}{15} = \frac{2 \times -6 \times 8}{3 \times 7 \times 15} = \frac{-32}{105}$

दो से अधिक परिमेय संख्याओं के गुणनफल ज्ञात करने के लिए भी सभी परिमेय संख्याओं के अंशों का अंशों के साथ और हरों का हरों के साथ गुणा किया गया है।

यदि $\frac{p}{q}, \frac{r}{s}, \frac{u}{v}$ तथा $\frac{w}{z}$ आदि परिमेय संख्याओं का गुणा किया जाए तो

$$\frac{p}{q} \times \frac{r}{s} \times \frac{u}{v} \times \frac{w}{z} = \frac{p \times r \times u \times w}{q \times s \times v \times z}$$

परिमेय संख्याओं में गुणा के कुछ गुण (Some properties of multiplication in rational numbers)



क्रियाकलाप 4.

नीचे दी गई तालिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार खाली स्थानों में भरिए—

सारणी 4

क्र.सं.	परिमेय संख्याएँ	परिमेय संख्याओं का गुणा	गुणनफल	क्रम बदल कर गुणा करने पर	गुणनफल	प्राप्त संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है।
1.	$\frac{11}{15}, \frac{1}{4}$	$\frac{11}{15} \times \frac{1}{4}$	$\frac{11}{60}$	$\frac{1}{4} \times \frac{11}{15}$	$\frac{11}{60}$	हाँ
2.	$-\frac{5}{8}, -\frac{7}{4}$	$-\frac{5}{8} \times -\frac{7}{4}$				
3.	$-\frac{19}{12}, \frac{5}{13}$	$-\frac{19}{12} \times \frac{5}{13}$				
4.	$\frac{4}{9}, -\frac{18}{5}$					
5.	$\frac{31}{-6}, \frac{24}{7}$					

उपरोक्त क्रियाकलाप से आप पाते हैं कि परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करने के बाद प्राप्त संख्या भी परिमेय संख्या होती है। अतः **गुणा की संक्रिया के लिए परिमेय संख्या संवरक नियम का पालन करती है।**

तालिका से हम पाते हैं कि क्रम बदलने से गुणनफल अप्रभावित है। अतः परिमेय संख्याओं का गुण क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है।

$$\text{अतः यदि दो परिमेय संख्या } \frac{p}{q} \text{ एवं } \frac{r}{s} \text{ हो तो } \frac{p}{q} \times \frac{r}{s} = \frac{r}{s} \times \frac{p}{q}$$

आप कोई भी दो परिमेय संख्याएँ सोचिए और जाँच कीजिए कि वे गुणा के लिए क्रम विनिमेय नियम का पालन करते हैं अथवा नहीं।

वितरण नियम (Distributive Property)

पूर्णांक संख्याएँ वितरण नियम का पालन करती हैं। क्या परिमेय संख्याओं पर भी यह नियम लागू होता है? आइए कुछ उदाहरणों से देखें :-

उदाहरण 12. $\frac{2}{5} \times \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{7} \right)$ सरल कीजिए।

$$\begin{aligned} \text{हल: प्रथम तरीका} : \frac{2}{5} \times \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{7} \right) &= \frac{2}{5} \left(\frac{3 \times 7 + 1 \times 4}{28} \right) \\ &= \frac{2}{5} \left(\frac{21 + 4}{28} \right) \\ &= \frac{2}{5} \left(\frac{25}{28} \right) = \frac{5}{14} \end{aligned}$$

इसे निम्न तरीके से भी हल कर सकते हैं—

$$\begin{aligned} \text{दूसरा तरीका} : \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{1}{7} &= \frac{2 \times 3}{5 \times 4} + \frac{2 \times 1}{5 \times 7} \\ &= \frac{6}{20} + \frac{2}{35} \\ &= \frac{6 \times 7 + 2 \times 4}{140} = \frac{42 + 8}{140} = \frac{50}{140} = \frac{5}{14} \end{aligned}$$

$$\text{तरीका 1 एवं 2 के हल से स्पष्ट है कि } \frac{2}{5} \times \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{7} \right) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{1}{7}$$

ऐसी ही कोई तीन परिमेय संख्याएँ सोचें और जाँच करें कि क्या उन पर वितरण का नियम लागू होता है।

अतः यदि $\frac{p}{q}, \frac{r}{s}$ एवं $\frac{u}{v}$ तीन परिमेय संख्याएँ हों, तो

$$\frac{p}{q} \left(\frac{r}{s} + \frac{u}{v} \right) = \frac{p}{q} \times \frac{r}{s} + \frac{p}{q} \times \frac{u}{v}$$

यह परिमेय संख्याओं के लिए वितरण नियम है।

उदाहरण 13. यदि परिमेय संख्याएँ x, y एवं z हो तो सत्यापित कीजिए।

$$x \times (y + z) = x \times y + x \times z$$

जहाँ $x = \frac{-5}{8}, y = \frac{7}{9}, z = \frac{11}{12}$

बायाँ पक्ष $= x \times (y + z)$

$$= \frac{-5}{8} \times \left(\frac{7}{9} + \frac{11}{12} \right) \quad \{x, y, z \text{ का मान रखने पर}\}$$

$$= \frac{-5}{8} \times \left(\frac{7 \times 4 + 11 \times 3}{36} \right)$$

$$= \frac{-5}{8} \times \left(\frac{28 + 33}{36} \right) = \frac{-5}{8} \times \left(\frac{61}{36} \right) = \frac{-305}{288}$$

दायाँ पक्ष $= x \times y + x \times z$

$$= \frac{-5}{8} \times \frac{7}{9} + \left(\frac{-5}{8} \right) \times \frac{11}{12}$$

$$= \frac{-35}{72} + \frac{55}{96}$$

दायाँ पक्ष $= \frac{-35 \times 4 - 55 \times 3}{288} = \frac{-140 - 165}{288} = \frac{-305}{288}$

स्पष्ट है कि —

बायाँ पक्ष $=$ दायाँ पक्ष

परिमेय संख्या में शून्य का गुणा (Multiplication of Rational Numbers with zero)

शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे आप कई प्रकार से लिख सकते हैं जैसे $\frac{0}{1}, \frac{0}{-27}, \frac{0}{q}$ जहाँ q कोई पूर्णांक है परन्तु $q \neq 0$, आइए, शून्य का किसी परिमेय संख्या के साथ गुणा करें—

$$\frac{-27}{84} \times 0 = \frac{-27}{84} \times \frac{0}{q} = \frac{0}{84q} = 0$$

इस प्रकार किसी परिमेय संख्या को शून्य के साथ गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है।

गुणन तत्समक (Multiplicative Identity)

क्या कोई ऐसी परिमेय संख्या आप सोच सकते हैं जिसे किसी परिमेय संख्या $\frac{p}{q}$ में गुणा करने पर गुणनफल $\frac{p}{q}$ के बराबर होता है?

राधा ने फातिमा से कहा “यह तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा किया जाए तो उस संख्या का मान नहीं बदलता और चूंकि संख्या 1 परिमेय संख्या भी है जिसे $\frac{1}{1}, \frac{-2}{-2}$, या $\frac{57}{57}$ इत्यादि के रूपों में भी लिखा जा सकता है। अतः 1 ही वह परिमेय संख्या होगी जिसका गुणा $\frac{p}{q}$ (जहाँ $q \neq 0$) के साथ करने पर गुणनफल भी $\frac{p}{q}$ होगी।

यहाँ 1 को गुणन तत्समक कहते हैं।

गुणन प्रतिलोम (Multiplicative Inverse)

$\frac{1}{3} \times \square = 1$, में खाली बाक्स में कौनसी परिमेय संख्या रखी जाये जिसका $\frac{1}{3}$ के साथ गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो। आपका उत्तर $\frac{3}{1}$ होगा।



क्रियाकलाप 5.

नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उनमें खाली बाक्सों में उचित संख्या भरिए —

(i) $\frac{1}{7} \times \square = 1$

(ii) $\square \times \frac{1}{7} = 1$

(iii) $\frac{1}{13} \times \square = 1$

(iv) $\square \times \frac{1}{13} = 1$

(v) $\frac{7}{13} \times \square = 1$

(vi) $\frac{13}{7} \times \square = 1$

ऊपर आप देख रहे हैं कि दो ऐसे परिमेय संख्याओं का गुणा किया जा रहा है जिनके गुणनफल 1 (गुणन तत्समक) के बराबर है। आप भी कुछ ऐसे ही परिमेय संख्याओं का जोड़ा नीचे बॉक्सों में लिखिए जिसका गुणनफल 1 (गुणन तत्समक) के बराबर हो।

$$\begin{array}{ll} (1) \boxed{\text{-----}} \times \boxed{\text{-----}} = 1 & (2) \boxed{\text{-----}} \times \boxed{\text{-----}} = 1 \\ (3) \boxed{\text{-----}} \times \boxed{\text{-----}} = 1 & (4) \boxed{\text{-----}} \times \boxed{\text{-----}} = 1 \end{array}$$

ऊपर खाली बाक्सों में परिमेय संख्याओं को लिखते हुए राजू सोच रहा था कि योगात्मक तत्समक प्राप्त करने के लिए हमें किसी संख्या में उसी संख्या के योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ना पड़ता था तो क्या उसी प्रकार गुणन तत्समक किसी संख्या को उसी संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने से प्राप्त होता है? यदि ऐसा है तो ऊपर दी गई सभी गुणज संख्याएँ एक दूसरे की गुणन प्रतिलोम होगी।

“अतः जब दो संख्याओं का गुणनफल इकाई के बराबर हो तो दोनों संख्याएँ एक दूसरे की गुणन प्रतिलोम (Multiplicative Inverse) कहलाती हैं।”

आइए देखे कि गुणन प्रतिलोम कैसे निकालते हैं?

उदाहरण 14. $\frac{p}{q}$ का गुणन प्रतिलोम क्या होगा?

हल : माना कि $\frac{p}{q}$ का गुणन प्रतिलोम x है

$$\begin{aligned} \frac{p}{q} \times x &= 1 \quad \text{या} \quad px = q \\ \text{या} \quad x &= \frac{q}{p} \end{aligned}$$

इस प्रकार $\frac{p}{q}$ का गुणन प्रतिलोम $\frac{q}{p}$ हैं। अर्थात् किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या के अंश को हर और हर को अंश से बदलकर प्राप्त कर सकते हैं। आइए उदाहरण देखे—

$$\begin{array}{ll} (1) \quad \frac{4}{3} \times \frac{3}{4} = 1 & (2) \quad \frac{-27}{53} \times \frac{53}{-27} = 1 \\ (3) \quad \frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = 1 \quad \text{या} \quad \frac{b}{a} \times \frac{a}{b} = 1 \end{array}$$

अतः $\frac{b}{a}$ को $\frac{a}{b}$ का गुणन प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं तथा $\frac{a}{b}$ को $\frac{b}{a}$ का गुणन प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं।

निम्नांकित का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम लिखिए –

$$\frac{-4}{9}, \frac{2}{-7}, \frac{8}{15}, \frac{c}{d}, 4, -5$$

क्या प्रत्येक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम होता है?

शून्य (0) का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? सोचिए।

शून्य (0) का गुणन प्रतिलोम नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या का शून्य के साथ गुणा करने पर एक नहीं प्राप्त होता। अतः शून्य का कोई गुणन प्रतिलोम नहीं है।

प्रश्नावली 18.3

प्र.1 नीचे दिए मानों को लेकर $\frac{p}{q} \times \frac{r}{s} = \frac{r}{s} \times \frac{p}{q}$ की सत्यता की जांच कीजिए।

$$(i) \quad \frac{p}{q} = \frac{-3}{7}, \frac{r}{s} = \frac{11}{15} \quad (ii) \quad \frac{p}{q} = 2, \frac{r}{s} = \frac{13}{17}$$

$$(iii) \quad \frac{p}{q} = \frac{-105}{13}, \frac{r}{s} = \frac{-5}{8} \quad (iv) \quad \frac{p}{q} = \frac{-16}{3}, \frac{r}{s} = 0$$

प्र.2 नीचे दिए गए मानों को लेकर $x \times (y + z) = x \times y + x \times z$ की सत्यता की जांच कीजिए।

$$(i) \quad x = -\frac{1}{2}, y = \frac{5}{7}, z = \frac{-7}{4} \quad (ii) \quad x = \frac{3}{2}, y = \frac{-8}{5}, z = \frac{17}{6}$$

$$(iii) \quad x = 1, y = \frac{9}{5}, z = 0$$

प्र.3 क्रम विनिमय नियम द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

$$(i) \quad \frac{2}{3} \times 4 = 4 \times \dots \quad (ii) \quad \frac{11}{19} \times \dots = \frac{1}{2} \times \dots$$

$$(iii) \quad \dots \times \frac{7}{9} = \dots \times \frac{-3}{17}$$

प्र.4 रिक्त स्थान की पूर्ति साहचर्य नियम से कीजिए—

$$(i) \quad \frac{1}{2} \times \left(\frac{17}{6} \times \frac{2}{9} \right) = \left(\frac{1}{2} \times \frac{17}{6} \right) \times \dots \quad (ii) \quad -\frac{1}{8} \times \left(\frac{-2}{5} \times \frac{1}{4} \right) = (\dots \times \dots) \times \frac{1}{4}$$

$$(iii) \quad \frac{4}{7} \times \left(\frac{-25}{3} \times \frac{1}{5} \right) = (\dots \times \dots) \times \dots$$

प्र.5 नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो किसी न किसी नियम से सम्बन्धित है। उन नियम को उनके आगे रिक्त स्थान में भरिए –

नियम

$$(i) \frac{7}{12} \times \left(\frac{1}{9} + \frac{5}{3} \right) = \frac{7}{12} \times \frac{1}{9} + \frac{7}{12} \times \frac{5}{3} \quad \text{-----}$$

$$(ii) \frac{5}{7} \times \left(\frac{25}{3} + \frac{4}{3} \right) = \frac{5}{7} \times \frac{25}{3} + \frac{5}{7} \times \frac{4}{3} \quad \text{-----}$$

$$(iii) \frac{8}{11} \times \frac{3}{7} = \frac{3}{7} \times \frac{8}{11} \quad \text{-----}$$

$$(iv) \frac{5}{3} \times \frac{3}{5} = 1 \quad \text{-----}$$

$$(v) \frac{-3}{12} \times 1 = 1 \times \left(\frac{-3}{12} \right) = \frac{-3}{12} \quad \text{-----}$$

प्र.6 निम्न के व्युत्क्रम लिखिए –

$$(i) 4 \quad (ii) \frac{-17}{5} \quad (iii) \frac{-6}{29} \quad (iv) \frac{p}{q}$$

प्र.7 सत्य/असत्य लिखिए–

(i) किसी परिमेय संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का गुणनफल एक होता है

(ii) यदि x का व्युत्क्रम y है तो y का व्युत्क्रम $1/x$ होगा।

(iii) एक घनात्मक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है।

(iv) शून्य किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम नहीं है।

परिमेय संख्याओं का भाग (Division of Rational Numbers)

राधा और फातिमा गुणन प्रतिलोम निकालने का खेल खेल रहे थे। दोनों एक दूसरे को किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम लिखने के लिए दे रहे थे। तभी राधा को इन गुणात्मक प्रतिलोम के प्रश्नों में कुछ नई बात नजर आई। उसने फातिमा से कहा “देखो इन सभी उदाहरणों में एक नई बात नजर आ रही है कि किसी संख्या का उसके गुणन प्रतिलोम से गुणा वास्तव में उस संख्या का उसी संख्या में भाग देने के समान है।

$$\text{जैसे, } 4 \times \frac{1}{4} = \frac{4}{4} = 4 \div 4$$

$$2 \times \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 2 \div 2$$



फातिमा ने कहा इसका मतलब यह हुआ कि किसी संख्या का भाग देना उस संख्या के गुणन प्रतिलोम से गुणा करने के समान है। जैसे–

$$3 \div 4 = 3 \times (4 \text{ का गुणन प्रतिलोम})$$

$$= 3 \times \frac{1}{4}$$



क्रियाकलाप 6.

गुणन प्रतिलोम से भाग की प्रक्रिया को गुणा की प्रक्रिया के रूप में लिखना।

$$(i) \quad \frac{2}{3} \div \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{1}$$

$$(ii) \quad \frac{4}{3} \div \frac{3}{4} =$$

$$(iii) \quad \frac{7}{9} \div \frac{8}{7} =$$

$$(iv) \quad \frac{a}{x} \div \frac{b}{y} =$$

$$(v) \quad \frac{p}{q} \div \frac{r}{s} =$$

उपरोक्त के आधार पर आप कह सकते हैं कि यदि $\frac{x}{y}$ में $\frac{a}{b}$ से भाग देना है तो इसे

$\frac{x}{y} \times (\frac{a}{b} \text{ का गुणन प्रतिलोम})$ के रूप में लिखकर हल किया जा सकता है।

$$\frac{x}{y} \div \frac{a}{b} = \frac{x}{y} \times (\frac{a}{b} \text{ का गुणात्मक प्रतिलोम})$$

$$= \frac{x}{y} \times \frac{b}{a}$$

उदाहरण 15. निम्न को हल कीजिए।

$$(i) \quad 2 \div \frac{-2}{3}$$

$$(ii) \quad \frac{-5}{4} \div \frac{15}{14}$$

$$(iii) \quad \frac{23}{12} \div \frac{46}{36}$$

हल (i) $2 \div \frac{-2}{3} = 2 \times \left(\frac{-2}{3} \text{ का गुणन प्रतिलोम} \right)$

$$= 2 \times \frac{3}{-2} = -3$$

$$(ii) \quad \frac{-5}{4} \div \frac{15}{14}$$

$$= \frac{-5}{4} \times \frac{14}{15} = \frac{-7}{6}$$

$$(iii) \quad \frac{23}{12} \div \frac{46}{36} = \frac{23}{12} \times \frac{36}{46} = \frac{3}{2}$$

उदाहरण 16. दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -21 है यदि इनमें से एक संख्या $\frac{3}{10}$ हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

हल: माना दूसरी परिमेय संख्या $\frac{p}{q}$ है

प्रश्नानुसार, $\frac{3}{10} \times \frac{p}{q} = -21$

$\frac{3}{10}$ का गुणन प्रतिलोम अर्थात् $\frac{10}{3}$ से दोनों पक्षों को गुणा करने पर -

$$\frac{3}{10} \times \frac{p}{q} \times \frac{10}{3} = -21 \times \frac{10}{3}$$

$$\text{या } \frac{p}{q} = \frac{-210}{3}$$

$$\text{या } \frac{p}{q} = -70$$

अतः दूसरी संख्या -70 होगी।

प्रश्नावली 18.4

प्र.1 भाग दीजिए -

(i) $\frac{1}{6}$ को $\frac{3}{4}$ से

(ii) $\frac{-8}{11}$ को $\frac{5}{9}$ से

(iii) -9 को $\frac{4}{7}$ से

(iv) $\frac{-102}{38}$ को $\frac{-17}{19}$ से

(v) $\frac{6}{15}$ को $\frac{8}{-35}$ से

(vi) $\frac{-60}{9}$ को -10 से

प्र.2 सरल कीजिए

(i) $\frac{4}{5} \div (-1)$

(ii) $\frac{95}{16} \div \frac{8}{19}$

(iii) $\left(\frac{-7}{8}\right) \div \left(\frac{-2}{15}\right)$

(iv) $\frac{21}{5} \div \frac{7}{-5}$

(v) $\frac{-6}{7} \div (-15)$

(vi) $-7 \div (-5)$

प्र.3 दो संख्याओं का गुणनफल 12 है। यदि इनमें से एक संख्या $\frac{3}{5}$ हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

प्र.4 $\frac{-9}{5}$ को किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -11 प्राप्त हो।

प्र.5 $\frac{-28}{39}$ को किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि गुणनफल $\frac{3}{7}$ का गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो।

प्र.6 एक पाठशाला के कुल विद्यार्थियों में से $\frac{5}{9}$ बालक हैं। यदि वहां कुल विद्यार्थी 540 हों तो बालिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

कितनी सारी संख्याएँ ?

परिमेय संख्याओं के क्रम सम्बन्धी प्रश्नों को हल करते हुए फातिमा ने कार्तिक से कहा कि जिस तरह दो पूर्णाकों जैसे -15 और -8 के बीच हम $-14, -13, -12, -11, -10, -9$ लिख सकते हैं, उसी प्रकार क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच भी परिमेय संख्याएँ लिखी जा सकती है।

कार्तिक ने कहा कि जरूर लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा लिख सकते हैं।

फातिमा ने कहा— हाँ, $\frac{-15}{1}$ और $\frac{-8}{1}$ के बीच सारी पूर्णाक संख्याएँ तो है ही परन्तु $\frac{-15}{1}$ और $\frac{-14}{1}$ के ठीक बीच $\frac{-29}{2}$ भी है। कार्तिक ने कहा अभी तो और भी बहुत है। फातिमा बोली हाँ, गिननी मुश्किल होगी, इतनी हैं।

क्या आप फातिमा और कार्तिक की बात से सहमत हैं? क्या फातिमा का कहना कि इतनी अधिक है कि गिनी नहीं जा सकती, सही है? राधा बोली ऐसा कैसे हो सकता है? $\frac{2}{5}$ और $\frac{3}{5}$ के बीच तो कोई भिन्न नहीं है?

क्या आप सोच सकते हैं कि $\frac{2}{5}$ और $\frac{3}{5}$ के बीच कौन-कौन सी भिन्न हैं?

कार्तिक ने कहा, आइए देखें —

$$\frac{2}{5} = \frac{2}{5} \times \frac{2}{2} = \frac{4}{10}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{3}{5} \times \frac{2}{2} = \frac{6}{10}$$

दोनों के बीच $\frac{5}{10}$ है।

रमेश और मीना एक साथ बोले कि

$$\frac{2}{5} = \frac{2}{5} \times \frac{3}{3} = \frac{6}{15}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{3}{5} \times \frac{3}{3} = \frac{9}{15}$$

अब तो $\frac{7}{15}, \frac{8}{15}$ दोनों इनके बीच है। इस प्रकार सभी भिन्न संख्या परिमेय संख्या हैं अतः

दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएँ हो सकती हैं।

अब आप इन दोनों $\frac{2}{5}, \frac{3}{5}$ के बीच कम से कम 20 परिमेय संख्याएँ ढूँढिए।

आखिर कितनी संख्याएँ हैं $\frac{5}{7}$ और $\frac{6}{7}$ के बीच

अनु ने एक विशेषता देखी कि दो परिमेय संख्याएँ जिनके हर समान हो तथा अंश क्रमागत पूर्णांक हो जैसे : $\frac{5}{7}$ और $\frac{6}{7}$ को $\frac{2}{2}$ से गुणा करने पर $\frac{10}{14}$ और $\frac{12}{14}$ के बीच $\frac{11}{14}$ मिली।

इन्हें $\frac{3}{3}$ से गुणा करने पर $\frac{15}{21}$ और $\frac{18}{21}$ के बीच $\frac{16}{21}, \frac{17}{21}$ दो संख्याएँ और मिली।

दोनों को $\frac{5}{5}$ से गुणा करने पर $\frac{25}{35}$ और $\frac{30}{35}$ के बीच 4 नई संख्याएँ और पता चलीं।

अनु बोली— अगर मैं $\frac{17}{17}$ से गुणा करूँगी तो दोनों के बीच 16 नई संख्याएँ पता चलेंगी।

क्या आप अनु की बात से सहमत हैं?

ऊपर दिए गए उदाहरणों को देखें तो $\frac{5}{7}$ और $\frac{6}{7}$ के बीच बहुत सी संख्याएँ हम ढूँढ पाए हैं।

क्या आप सोच सकते हैं कि इन दोनों के बीच कितनी संख्याएँ हो सकती हैं?



क्रियाकलाप-7

1. $\frac{1}{3}$ और $\frac{2}{3}$ के बीच 25 संख्याएँ बताइए।
2. क्या आप ऐसी दो अलग-अलग संख्याएँ ढूँढ सकते हैं जिनके बीच कोई संख्या न हो?

इन्हें भी देखें—

mnkgj . k 17. $\frac{-4}{3}$ व $\frac{3}{4}$ के बीच दस परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

हल दी गई परिमेय संख्याओं के हर समान नहीं है।

$$\text{इनके हर बराबर करते हैं } \frac{-4}{3} = \frac{-4}{3} \times \frac{4}{4} = \frac{-16}{12}$$

$$\text{और } \frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$$

अब $\frac{-16}{12}$ एवं $\frac{9}{12}$ सम हर वाली परिमेय संख्याएँ हैं। इनके अंश -16 व 9 के बीच का अंतर

25 है अतः उनके मध्य 24 परिमेय संख्याएँ होंगी—

$$\frac{-15}{12}, \frac{-14}{12}, \frac{-13}{12}, \dots, \frac{-2}{12}, \frac{-1}{12}, \frac{0}{12}, \frac{1}{12}, \frac{2}{12}, \dots, \frac{7}{12}, \frac{8}{12}$$


उपरोक्त में से कोई भी दस परिमेय संख्याएँ लिख सकते हैं।

यदि आपको $-\frac{4}{3}$ व $\frac{4}{3}$ के बीच 25 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करनी हो तो आप क्या करेंगे ?

एक और तरीका -

उदाहरण 18. $\frac{1}{8}$ एवं $\frac{1}{2}$ के मध्य पाँच परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

हल दोनों में से $\frac{1}{2}$ बड़ी है और $\frac{1}{8}$ छोटी है। अब दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दें तो जो संख्या मिलेगी इन दोनों के बीच की होगी।

$$\begin{aligned} \frac{1}{8} \text{ व } \frac{1}{2} \text{ के मध्य पहली परिमेय संख्या} &= \frac{\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{2}\right)}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1 \times 1}{8 \times 1} + \frac{1 \times 4}{2 \times 4}\right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1+4}{8}\right) = \frac{5}{16} \end{aligned}$$



चित्र-18.5

जैसे चित्र में दिखाया गया है, यह ठीक $\frac{1}{8}$ और $\frac{1}{2}$ के बीचों-बीच है।

अब शेष परिमेय संख्याएँ ज्ञात करने के लिए क्रमशः $\frac{1}{8}$ व $\frac{5}{16}$ के तथा $\frac{5}{16}$ व $\frac{1}{2}$ के मध्य दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात करते हैं।


$$\begin{aligned} \frac{1}{8} \text{ व } \frac{5}{16} \text{ के मध्य परिमेय संख्या} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{8} + \frac{5}{16}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1 \times 2}{8 \times 2} + \frac{5 \times 1}{16 \times 1}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{2+5}{16}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{7}{16}\right) = \frac{7}{32} \end{aligned}$$

$$\text{तथा } \frac{5}{16} \text{ व } \frac{1}{2} \text{ के मध्य परिमेय संख्या} = \frac{1}{2} \left(\frac{5}{16} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{5 \times 1}{16} + \frac{1 \times 8}{2 \times 8}\right)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \left(\frac{5+8}{16}\right) = \frac{13}{32} \end{aligned}$$


चित्र-18.6

$$\text{अब } \frac{1}{8} \text{ व } \frac{7}{32} \text{ के मध्य परिमेय संख्या} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{8} + \frac{7}{32}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1 \times 4}{8 \times 4} + \frac{7 \times 1}{32 \times 1}\right)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \left(\frac{4+7}{32}\right) = \frac{11}{64} \end{aligned}$$


चित्र-18.7

$$\text{तथा } \frac{13}{32} \text{ व } \frac{1}{2} \text{ के मध्य परिमेय संख्या} = \frac{1}{2} \left(\frac{13}{32} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{13 \times 1}{32 \times 1} + \frac{1 \times 16}{2 \times 16}\right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{13}{32} + \frac{16}{32}\right) = \frac{29}{64}$$

अतः $\frac{1}{8}$ व $\frac{1}{2}$ के मध्य पाँच परिमेय संख्याएँ निम्नलिखित हैं:-

$$\frac{11}{64}, \frac{7}{32}, \frac{5}{16}, \frac{13}{32}, \frac{29}{64}$$

रजनी ने कहा- इसका तो यह अर्थ हुआ कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम एक और परिमेय संख्या ढूँढ़ सकते हैं। राहुल ने कहा - यही नहीं, ऐसे ही करते जाएं तो जितनी चाहो उतनी संख्याएँ बीच में ढूँढ़ लो।

आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ? आपस में चर्चा करके निष्कर्ष निकालिए।

उदाहरण 19. $\frac{-7}{3}$ एवं $\frac{5}{8}$ के मध्य तीन परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

हल $\frac{-7}{3}$ व $\frac{5}{8}$ के मध्य परिमेय संख्या

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{-7}{3} + \frac{5}{8} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{-7 \times 8}{3 \times 8} + \frac{5 \times 3}{8 \times 3} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{-56 + 15}{24} \right) = \frac{-41}{48}$$

$\frac{-7}{3}$ व $\frac{-41}{48}$ के मध्य परिमेय संख्या

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{-7}{3} + \frac{-41}{48} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{-7 \times 16}{3 \times 16} + \frac{-41 \times 1}{48 \times 1} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{-112 + (-41)}{48} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{-153}{48} \right) = \frac{-153}{96}$$

तथा $\frac{-41}{48}$ व $\frac{5}{8}$ के मध्य परिमेय संख्या


$$= \frac{1}{2} \left(\frac{-41}{48} + \frac{5}{8} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{-41 \times 1}{48 \times 1} + \frac{5 \times 6}{8 \times 6} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{-41 + 30}{48} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{-11}{48} \right) = \frac{-11}{96}$$

अतः $\frac{-7}{3}$ व $\frac{5}{8}$ के मध्य $\frac{-153}{96}, \frac{-41}{48}, \frac{-11}{96}$ तीन परिमेय संख्याएँ हैं।

प्रश्नावली 18.5

1. नीचे दिए गए चित्र में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए ।



2. किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएँ लिखी जा सकती हैं? समझा कर लिखिए ।

3. संख्याओं $\frac{1}{3}$ एवं $\frac{1}{2}$ के बीच पांच और परिमेय संख्या लिखिए ।

4. संख्याओं $\frac{1}{3}$ एवं $\frac{-2}{7}$ के मध्य चार परिमेय संख्याएँ लिखिए ।

5. संख्याओं $\frac{-1}{6}$ एवं $\frac{3}{4}$ के मध्य छः परिमेय संख्याएँ लिखिए ।

6. सत्य या असत्य लिखिए –

i) संख्या $\frac{1}{10}$ संख्याओं $\frac{-1}{2}$ एवं $\frac{3}{5}$ के मध्य में स्थित है ।

ii) संख्याएँ $\frac{4}{5}$ एवं $\frac{6}{5}$ के मध्य कोई परिमेय संख्याएँ नहीं होगी ।

iii) संख्याएँ 3 एवं 7 के मध्य केवल तीन परिमेय संख्याएँ होंगी ।

7. कुछ और सवाल बनाइए जिनमें परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याएँ ढूँढ़नी हों । यह सवाल साथियों को करने दीजिए ।

8. इस अध्याय में आपने परिमेय संख्याओं के बारे में क्या सीखा, अपने शब्दों में लिखें ।

हमने सीखा (We have learnt)

- यदि x और y परिमेय संख्याएँ हैं तो (i) $x + y$ भी एक परिमेय संख्या होगी।
(ii) $x \times y$ भी एक परिमेय संख्या होगी। (iii) $x - y$ भी एक परिमेय संख्या होगी।
(iv) $x \div y$ भी एक परिमेय संख्या होगी। (यदि y शून्य के बराबर न हो।)
- यदि x और y दो परिमेय संख्याएँ हों तो

$$x + y = y + x$$

$$x \times y = y \times x$$

$$x - y \neq y - x \quad (x = y \text{ को छोड़कर})$$

$$x \div y \neq y \div x \quad (x = y \text{ को छोड़कर तथा } x \neq 0, y \neq 0)$$
- यदि x, y और z तीन परिमेय संख्याएँ हों तो

$$(x + y) + z = x + (y + z)$$

$$(x \times y) \times z = x \times (y \times z)$$
- यदि x, y और z तीन परिमेय संख्याएँ हों तो

$$x \times (y + z) = x \times y + x \times z$$

$$x \times (y - z) = x \times y - x \times z$$
- एक परिमेय संख्या x के लिए निम्न कथन सत्य हैं –
 (i) $x + 0 = 0 + x = x$ (ii) $x - 0 = x$
 (iii) $x \times 0 = 0 \times x = 0$ (iv) $x \times 1 = 1 \times x = x$
 (v) $x \div 1 = x$
- यदि $x = \frac{p}{q}$ एक शून्येत्तर परिमेय संख्या है तो x का गुणन प्रतिलोम $\frac{1}{x} = \frac{q}{p}$ भी एक परिमेय संख्या होगी।
- दो परिमेय संख्याओं का योग करने के लिए उन्हें समान हर वाली संख्याओं में बदलकर जोड़ते हैं।
- किसी परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का भाग वास्तव में पहली परिमेय संख्या से दूसरे परिमेय संख्या के गुणन प्रतिलोम के गुणनफल के बराबर होता है।

$$\frac{x}{y} \div \frac{a}{b} = \frac{x}{y} \times \left(\frac{a}{b} \text{ का गुणात्मक प्रतिलोम}\right) = \frac{x}{y} \times \frac{b}{a}$$

या

भाज्य $\div$ भाजक = भाज्य $\times$ (भाजक का गुणात्मक प्रतिलोम)
- दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएँ होती हैं।
- दो समान हर वाली परिमेय संख्याओं के बीच में उनके अंशों के अंतर की संख्या से 1 कम परिमेय संख्या आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

अध्याय-19

क्षेत्रमिति-2

MENSURATION-2



भूमिका (Introduction)

शाला के सामने रेत पड़ी हुई थी। बच्चे उस पर खेल रहे थे। आशु भी अपने मित्रों के साथ रेत के पास पहुँची और उसने अपने मित्रों से कहा, “चलो हम सब एक-एक घमेला रेत लेकर कुछ बनाते हैं।” रहीम ने कहा, “ठीक है, परन्तु ये घर वगैरह मुझे बनाना नहीं आता, चलो हम सभी रेत से एक-एक चौकोर चबूतरा बनाएँ।”

सभी ने एक-एक घमेला रेत लिया और चबूतरा बनाने लग गए। थोड़ी देर में ही सबके चबूतरे बन गए। परन्तु सभी के चबूतरे अलग-अलग माप के थे। अनु ने पूछा, ऐसा क्यों? हमने तो रेत समान माप की ली थी तो फिर चबूतरे अलग-अलग माप के क्यों बने? रहीम ने ध्यान से सभी चबूतरों को देखा और फिर बोला, एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि जो चबूतरे ज़मीन में ज्यादा जगह घेर रहे हैं उनकी ऊँचाई



चित्र 19.1

कम है तथा प्रत्येक चबूतरे की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई का रेत के माप से कोई ना कोई सम्बन्ध है। तभी आशु ने कहा, “हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि आयतन = लम्बाई $\times$ चौड़ाई $\times$ ऊँचाई होती है अतः हमने जो रेत ली थी उस रेत का आयतन तो बराबर है परन्तु उस रेत द्वारा बनाए गए चबूतरों की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई बदल रही है। चलो, हम अपने-अपने चबूतरे की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई मापकर देखें।”

सभी ने अपने चबूतरे की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई का माप लिया और लम्बाई $\times$ चौड़ाई $\times$ ऊँचाई के सूत्र से आयतन निकाल कर देखा तथा पाया कि सभी चबूतरों का आयतन समान है।

इसके बाद तीनों ने अपने-अपने रेत को नया आकार दे दिया। क्या उनके द्वारा बनाए गए नए आकारों का आयतन भी वही है जो चबूतरों का था? यदि आयतन वही है तो क्यों? अपनी कॉपी में लिखिए।

क्या धारिता ही आयतन है? (Is Capacity also the Volume?)

ऊपर बच्चों ने घमेला में भरे हुए रेत का आयतन उसी रेत का चबूतरा बनाकर ज्ञात कर लिया। घमेला में जितनी रेत समा सकती है, वह घमेला की धारिता है। उसी प्रकार किसी बाल्टी में जितना पानी या किसी कमरे में जितनी हवा समा सकती है, वह क्रमशः उस बाल्टी और कमरे की धारिता है। इस प्रकार किसी खाली स्थान में जितने आयतन का पदार्थ समा सकता है वह उस खाली स्थान की धारिता कहलाती है। आप जिस गिलास से पानी पीते हैं तथा जिस बाल्टी में पानी भरकर नहाते हैं, क्या उसकी धारिता बता सकते हैं? नहीं बता सकते क्योंकि धारिता बताने के लिए आपको यह जानना होगा कि उस गिलास या बाल्टी में कितनी आयतन का पानी समा सकता है।

धारिता क्या है इसे तो आप समझ ही चुके हैं, परन्तु किसी वस्तु का आयतन क्या है, इसे अपने अनुभव के आधार पर आप कैसे समझाएंगे? सोचकर अपनी कॉपी में लिखिए तथा अपने साथियों के उत्तरों की जाँचकर यह पता लगाइए कि आपकी सोच और उनकी सोच में क्या समानता या अंतर है।

क्षेत्रफल के बारे में आपने कक्षा छठवीं में पढ़ा है कि यह किसी आकृति द्वारा किसी तल पर घेरी गई जगह की माप है। उसी प्रकार आयतन भी किसी वस्तु द्वारा घेरे गये स्थान की माप है। आइए सोचें कि किसी वस्तु का आयतन या इसके द्वारा घेरे गये स्थान की माप कैसे प्राप्त करते हैं।

घनाभ (Cuboid)

आयतन ज्ञात करने के लिए उस वस्तु के आकार को जानना जरूरी है। आइए सबसे पहले उस आकार की विशेषताओं को जानें जिसका आयतन ज्ञात करना है। अपने आसपास की कुछ वस्तुओं को देखें जैसे कॉपी, किताब, माचिस का डिब्बा, चॉक का डिब्बा, ईंट। इन सभी वस्तुओं के आकार में आप क्या विशेषता देखते हैं?

इन सभी आकारों में विशेषता यह है कि इनकी प्रत्येक सतह आयताकार है तथा प्रत्येक सतह और उसके ठीक सामने वाली सतह का क्षेत्रफल समान है। इस तरह के आकार वाली वस्तु को घनाभ कहते हैं।



चित्र-19.2

क्रियाकलाप-1 (Activity 1)


आप अपने आसपास पाए जाने वाली कोई पाँच घनाभ के आकार वाली वस्तुओं की सूची बनाइए व यह जाँच कीजिये कि इन वस्तुओं के आमने-सामने की सतहों का क्षेत्रफल समान है अथवा नहीं तथा यह भी जाँच कीजिए कि किसी घनाभ की प्रत्येक संलग्न कोरें एक-दूसरे के साथ 90° का कोण बनाती हैं अथवा नहीं?

चूँकि घनाभ की प्रत्येक संलग्न कोरें 90° का कोण बनाती हैं, अतः इसकी प्रत्येक सतह आयताकार होगी इसलिए घनाभ को आयताकार ठोस भी कहते हैं।

अपनी किसी कॉपी या पुस्तक को लीजिए जो निम्न चित्रानुसार दिखती है:-



चित्र -19.3



चित्र-19.4

आपके हाथ की वस्तु घनाभाकार है। इस वस्तु के कई बिन्दुओं पर तीन-तीन कोरें मिल रही हैं। उनकी संख्या लिखिए।

ऊपर चित्र में जैसा आप देख रहे हैं कि A, B, C, D, E, F, G, H घनाभ पर 8 बिन्दु हैं इन बिन्दुओं को घनाभ का शीर्ष

कहते हैं। प्रत्येक बिन्दु पर तीन कोरें मिल रही हैं।

आपके पास उपलब्ध घनाभाकार वस्तु की कुल सतहों को गिनिए तथा लिखिए।


आपने अनुभव किया होगा कि घनाभ की कुल 6 सतहें हैं। जैसे ABCD तथा इसके सामने वाली सतह EFGH, इसी प्रकार सतह AEFB व उसके सामने की सतह DCGH तथा इसी प्रकार AEHD तथा इसके सामने की सतह BFGC। इस प्रकार किसी घनाभ की कुल छः सतहें होती हैं और इन सतहों को घनाभ की फलक कहते हैं।

इसी प्रकार AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, DH, AE, BF, CG कुल 12 कोर (किनारे) हैं।

क्रियाकलाप-2 (Activity 2)

आपकी गणित की किताब की सभी कोरों को मापिए उनके मापों को लिखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए:-

1. क्या सभी कोरें अलग-अलग माप की हैं?
2. कितनी कोरें एक ही माप की हैं?
3. कितने तरह की माप की कोरें प्राप्त हुई हैं?



चित्र -19.5


चित्र 19.5 में आप देख रहे हैं कि $DC = AB = FG = EH$ तथा $AD = FE = GH = BC$ उसी प्रकार $AF = BG = ED = HC$ इत्यादि। प्रत्येक घनाभ की चार-चार कोरें आपस में समान होती हैं तथा इनमें से किसी एक कोर को लम्बाई, दूसरे को चौड़ाई तथा तीसरे को ऊँचाई मान सकते हैं।

घनाभ की लम्बाई AB, चौड़ाई AD और ऊँचाई AF है। इनकी माप अलग-अलग है परन्तु घनाभ की लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई बराबर हो तो वह ठोस कैसा होगा? क्या आपने कभी इस आकार का ठोस देखा है?

घन (Cube)

चित्र 19.6 को ध्यान से देखिए। इसकी लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई को मापिए।

इनकी लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई में क्या समानता है? इस प्रकार की आकृति को क्या कहेंगे।



चित्र-19.6

“वह आयताकार ठोस जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई बराबर हो, घन कहलाती है।”

जिन घनाभों की लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई ज्ञात हो, उनका आयतन ज्ञात किया जा सकता है।

यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊँचाई ज्ञात हो तो

घनाभ का आयतन = लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई


या $V = \ell \times b \times h$ [चित्र 20.7 में]

V – घनाभ का आयतन (Volume)

ℓ – घनाभ की लंबाई (Length)

b – घनाभ की चौड़ाई (Breadth)

h – घनाभ की ऊँचाई है (Height)



चित्र -19.7

हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि

आयत का क्षेत्रफल = लम्बाई × चौड़ाई होता है और

घनाभ का आयतन = लम्बाई × चौड़ाई × ऊँचाई होता है,

तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं—

घनाभ का आयतन = आधार का क्षेत्रफल × ऊँचाई

घन में लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई आपस में बराबर होती है, अतः $\ell=b=h$

घन का आयतन = भुजा × भुजा × भुजा = $(\text{भुजा})^3 = S^3$

$$V = S^3$$


(S = Side)

आयतन का मात्रक (Unit of volume)

जिस प्रकार लम्बाई का मानक मात्रक मीटर है, क्षेत्रफल का मानक मात्रक वर्ग मीटर या मीटर² है, उसी प्रकार आयतन के लिए भी एक मानक मात्रक की आवश्यकता होगी। क्योंकि यदि प्रत्येक व्यक्ति धारिता या आयतन को मापने के लिए अलग-अलग मात्रकों का प्रयोग करेंगे तो उसका मान भिन्न-भिन्न आयेगा। जैसे कोई टंकी छोटी बाल्टी से 50 बार में भर जाती है तो छोटी बाल्टी को मात्रक मानने पर टंकी का आयतन 50 मात्रक या 50 बाल्टी होगा। किंतु यदि वही टंकी बड़ी बाल्टी से 10 बार में भर जाती है तो बड़ी बाल्टी को मात्रक मानने पर टंकी का आयतन 10 मात्रक या 10 बाल्टी होगा।

अतः आयतन के लिए ऐसे मानक मात्रक की आवश्यकता है जिसका मान सभी स्थानों पर एक समान हो।

आयतन का मात्रक 1 घन सेमी है, जो 1 सेमी लम्बे, 1 सेमी चौड़े और 1 सेमी ऊँचे घन के आयतन के बराबर होता है। उसे 1 सेमी³ भी लिखते हैं।



चित्र 19.8

इसी प्रकार आयतन का मात्रक घनमीटर भी है जो 1 मीटर लम्बे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर ऊँचे घन के आयतन के बराबर होता है। इसे 1मीटर³ भी लिखते हैं। यही आयतन का मानक मात्रक है।


मीटर³ एवं सेमी³ में सम्बंध (Relation between m³ and cm³)

$$\begin{aligned} 1 \text{ मीटर}^3 &= 1 \text{ मीटर} \times 1 \text{ मीटर} \times 1 \text{ मीटर} \\ &= 100 \text{ सेमी} \times 100 \text{ सेमी} \times 100 \text{ सेमी} \\ &= 100 \times 100 \times 100 \text{ सेमी}^3 \\ &= 1000000 \text{ सेमी}^3 \\ &= 10^6 \text{ सेमी}^3 \end{aligned}$$





क्रियाकलाप-3

नीचे दिए गए घनाभ की कोरों को माप कर आयतन ज्ञात कीजिए।




चित्र-19.9



उदाहरण 1. एक घनाभ की लम्बाई 4 सेमी, चौड़ाई 3 सेमी एवं ऊँचाई 2 सेमी है तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए।

हल दिया गया है— घनाभ की लम्बाई (ℓ) = 4 सेमी, चौड़ाई (b) = 3 सेमी, ऊँचाई (h) = 2 सेमी



यहां 1 सेमी³ आयतन वाले घनों की दो परतें हैं। प्रत्येक परत में 12 घन हैं। इस प्रकार कुल घनों की संख्या 24 है। इसलिए घनाभ का आयतन = 24 सेमी³ है।

चित्र-19.10

$$\begin{aligned} \therefore \text{घनाभ का आयतन } V &= \ell \times b \times h \\ &= 4 \times 3 \times 2 \text{ सेमी}^3 = 24 \text{ सेमी}^3 \text{ या घन सेमी} \end{aligned}$$

उदाहरण 2. घन की एक भुजा 5 सेमी है। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए।

हल दिया है — घन की एक भुजा की लंबाई (S) = 5 सेमी

$$\begin{aligned} \therefore \text{घन का आयतन } V &= S^3 \\ &= (5)^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125 \text{ सेमी}^3 \end{aligned}$$

उदाहरण 3. किसी घन की एक भुजा 6 सेमी है। उसमें 2 सेमी लंबाई के कितने घन काटे जा सकते हैं?

हल दिया है घन की एक भुजा $S = 6$ सेमी

$$\begin{aligned}\text{तो घन का आयतन} &= (\text{भुजा})^3 \\ &= (6)^3 = 6 \times 6 \times 6 = 216 \text{ सेमी}^3\end{aligned}$$

$$\text{काटे जाने वाले घन की एक भुजा} = 2 \text{ सेमी}$$

$$\therefore \text{घन का आयतन} = (\text{भुजा})^3 = (2)^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8 \text{ सेमी}^3$$

$$\begin{aligned}\text{अतः काटे जाने वाले घनों की संख्या} &= \frac{\text{बड़े घन का आयतन}}{\text{काटे जाने वाले घन का आयतन}} \\ &= \frac{216 \text{ सेमी}^3}{8 \text{ सेमी}^3} \\ &= 27\end{aligned}$$

अर्थात् वांछित घनों की संख्या 27 है।

उदाहरण 4. एक घनाभ आकार के लकड़ी के टुकड़े का आयतन 36 सेमी^3 है। यदि उसकी लम्बाई 4 सेमी एवं चौड़ाई 3 सेमी हो, तो उसकी ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

हल दिया है, घनाभ आकार के टुकड़े का आयतन $= 36 \text{ सेमी}^3$

$$\text{लम्बाई} = 4 \text{ सेमी}$$

$$\text{चौड़ाई} = 3 \text{ सेमी}$$

$$\text{घनाभाकार टुकड़े का आयतन} = \text{लम्बाई} \times \text{चौड़ाई} \times \text{ऊँचाई}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{ऊँचाई} &= \frac{\text{घनाभाकार टुकड़े का आयतन}}{\text{लम्बाई} \times \text{चौड़ाई}} \\ &= \frac{36}{4 \times 3} = 3 \text{ सेमी.}\end{aligned}$$

अतः उसकी ऊँचाई 3 सेमी है।

घनाभाकार वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई ज्ञात करने के लिए निम्नांकित सूत्र का प्रयोग करते हैं।

1. लम्बाई $= \frac{\text{आयतन}}{\text{चौड़ाई} \times \text{ऊँचाई}}$	चूँकि $v = l \times b \times h$
2. चौड़ाई $= \frac{\text{आयतन}}{\text{लम्बाई} \times \text{ऊँचाई}}$	$l = \frac{v}{b \times h}$
3. ऊँचाई $= \frac{\text{आयतन}}{\text{चौड़ाई} \times \text{लम्बाई}}$	$b = \frac{v}{l \times h}$
	$h = \frac{v}{l \times b}$

उदाहरण 5. एक घनाभ की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 50 सेमी और ऊँचाई 20 सेमी है। उसका आयतन ज्ञात कीजिए।

हल यहां लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई के अलग-अलग मात्रक हैं। प्रश्न हल करने के पूर्व इनके मात्रकों को समान करना आवश्यक है।

दिया है घनाभ की लंबाई = 1 मीटर = 100 सेमी

चौड़ाई = 50 सेमी

ऊँचाई = 20 सेमी

$$\begin{aligned}\therefore \text{घनाभ का आयतन} &= \text{लम्बाई} \times \text{चौड़ाई} \times \text{ऊँचाई} \\ &= 100 \times 50 \times 20 = 100000 \text{ सेमी}^3 = 10^5 \text{ सेमी}^3\end{aligned}$$

उदाहरण 6. यदि घन के प्रत्येक कोर को चौगुना कर दिया जाय तो घन का आयतन कितना गुना हो जायेगा?

हल माना कि पहले घन की कोर = S

तो पहले घन का आयतन = S^3

कोर चार गुनी करने पर, दूसरे घन की कोर = $4 \times S = 4S$

$$\begin{aligned}\text{तो दूसरे घन का आयतन} &= (\text{भुजा})^3 \\ &= (4S)^3 \\ &= 4S \times 4S \times 4S \\ &= 64 S^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \frac{\text{दूसरे घन का आयतन}}{\text{पहले घन का आयतन}} &= \frac{64S^3}{S^3} \\ &= \frac{64}{1} \\ &= 64\end{aligned}$$

अतः दूसरे घन का आयतन पहले घन से 64 गुना हो जायेगा।

प्रश्नावली 19.1 (Exercise 19.1)



1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :-

(i) किसी घनाभ में कुलफलक होती हैं।

(ii) घनाभ की लंबाई = $\frac{\text{घनाभ का आयतन}}{\text{चौड़ाई} \times \dots\dots}$

(iii) 1 घन मीटर = घन सेमी

2. पानी की एक टंकी 3 मी. लम्बी, 2 मी. चौड़ी और 1 मीटर गहरी है। उसमें कितना लीटर पानी आयेगा? यदि 1 घन मीटर = 1000 लीटर।

3. चाय के एक डिब्बे की लम्बाई 10 सेमी, चौड़ाई 7 सेमी और ऊँचाई 4 सेमी हो तो डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए।


4. चॉक की एक छोटी पेटी की लम्बाई 15 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी और ऊँचाई 8 सेमी हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए।

5. घनाभाकार आकृति के निम्नलिखित माप से आयतन ज्ञात कीजिए :-

क्र.सं.	लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई
(i)	10 सेमी	5 सेमी	3 सेमी
(ii)	15 सेमी	6 सेमी	4 सेमी
(iii)	8 मी	4 मीटर	2 मीटर
(iv)	5 मीटर	3 मीटर	1.5 मीटर
(v)	40 मिमी	35 मिमी	25 मिमी
(vi)	50 मिमी	40 मिमी	20 मिमी
(vii)	60 मिमी	5 सेमी	4 सेमी
(viii)	12 सेमी	70 मिमी	20 मिमी
(ix)	1 मीटर	25 सेमी	150 मिमी
(x)	3 सेमी	15 मिमी	25 मिमी

6. एक घनाभाकार लकड़ी का आयतन 480 घन सेमी. है। यदि उसकी लम्बाई 10 सेमी चौड़ाई 6 सेमी हो तो ऊँचाई ज्ञात कीजिए।
7. एक घनाकार टुकड़े की एक भुजा 25 सेमी है। उसमें 5 सेमी लम्बाई के कितने घनाकार टुकड़े काटे जा सकते हैं।
8. एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रमशः 5 मी., 4.5 मी. एवं 3 मीटर है। इसमें भरी हुई हवा का आयतन ज्ञात कीजिए।
9. डीजल की एक आयताकार टंकी 2 मी. लम्बी, 2 मीटर चौड़ी और 40 सेमी गहरी है। इसमें कितने लीटर डीजल आ सकता है
10. तैरने का एक तालाब 25 मी. लम्बा, 13 मी. चौड़ा है। इसमें 325 घन मीटर पानी छोड़ा गया। इसमें पानी कितना ऊँचा चढ़ जायेगा।
11. किसी आयताकार कमरे की लम्बाई 20 फीट चौड़ाई 18 फीट एवं ऊँचाई 12 फीट है तो उसमें भरी हवा का आयतन कितना होगा?
12. एक घनाकार पासे का किनारा 1.2 सेमी है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिये।
13. एक बावड़ी 8 मी. लम्बी, 6 मी. चौड़ी और 9 मीटर गहरी है। उसमें 6 मीटर ऊँचाई तक पानी भरा है तो बावड़ी की धारिता और उसमें भरे पानी का आयतन ज्ञात कीजिये।
14. एक हौज 5 मीटर लम्बा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है तो हौज की धारिता ज्ञात कीजिए। यदि उस हौज में पानी भरा हो तो पानी का आयतन कितना होगा।
15. एक ईंट की लम्बाई 20 सेमी, चौड़ाई 10 सेमी तथा ऊँचाई 6 सेमी है तो 60 मीटर लम्बा, 0.25 मीटर चौड़ी और 2 मीटर ऊँची दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी।

घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल (Surface Area of a Cuboid)



चित्र-19.11

पूर्व में हमने देखा है कि घनाभ में 6 आयताकार फलक होते हैं। इन छः फलकों में सम्मुख फलकों के तीन जोड़े बनते हैं। सम्मुख फलकों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इन्हीं गुणों का प्रयोग करते हैं।

यदि घनाभ की लम्बाई ℓ , चौड़ाई b , और ऊँचाई h है, तो

1. ऊपर और नीचे के आधार के फलकों

$$\begin{aligned} (\text{ABCD एवं EFGH}) \text{ का क्षेत्रफल} &= \ell \times b + \ell \times b \\ &= \ell b + \ell b = 2\ell b \end{aligned}$$


2. दायीं ओर एवं बायीं ओर के फलकों = $b \times h + b \times h$
(BCHG एवं AFED) का क्षेत्रफल = $bh + bh = 2bh$

3. सामने एवं पीछे वाले फलकों = $h \times \ell + h \times \ell$
(CDEH व ABGF) का क्षेत्रफल = $h\ell + h\ell = 2h\ell$

$$\begin{aligned} \text{अतः घनाभ का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल} &= \text{घनाभ की सभी 6 फलकों के क्षेत्रफलों का योग} \\ &= 2\ell b + 2bh + 2h\ell \\ &= 2(\ell b + bh + h\ell) \end{aligned}$$

घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल (Surface Area of a Cube)

घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल = $2(\ell b + bh + h\ell)$ किन्तु हम जानते हैं कि घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है जिसमें लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई बराबर होती है अर्थात् $\ell=b=h$



चित्र-19.12

$$\begin{aligned} \text{अतः घन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल} &= 2(S.S + S.S + S.S) \\ &= 2.3S^2 \\ &= 6S^2 \end{aligned}$$

उदाहरण 7. उस घनाभ का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लम्बाई 9 सेमी., चौड़ाई 6 सेमी और ऊँचाई 2 सेमी है।

हल: दिया गया है कि घनाभ की लंबाई (ℓ) = 9 सेमी
चौड़ाई (b) = 6 सेमी
ऊँचाई (h) = 2 सेमी

$$\begin{aligned}\therefore \text{घनाभ का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल} &= 2(\ell b + bh + h\ell) \\ &= 2(9 \times 6 + 6 \times 2 + 2 \times 9) \\ &= 2(54 + 12 + 18) = 2(84) = 168 \text{ सेमी}^2\end{aligned}$$

उदाहरण 8. एक घन की कोर की लम्बाई 5.5 सेमी है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल: दिया गया है कि घन की कोर (S) = 5.5 सेमी

$$\begin{aligned}\therefore \text{घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल} &= 6.S^2 = 6(5.5)^2 = 6(5.5 \times 5.5) \\ &= 6(30.25) = 181.50 \text{ सेमी}^2\end{aligned}$$

उदाहरण 9. एक चॉक के डिब्बे की लम्बाई 10 सेमी., चौड़ाई 7 सेमी एवं ऊँचाई 6 सेमी है। गत्ते की सीट की मोटाई पर ध्यान न देते हुये चॉक के डिब्बे बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल: चूंकि चॉक का डिब्बा घनाभाकार होता है इसलिए डिब्बा बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा।

हल दिया गया है कि डिब्बे की घनाभ की लंबाई (ℓ) = 10 सेमी
चौड़ाई (b) = 7 सेमी
ऊँचाई (h) = 6 सेमी

$$\begin{aligned}\therefore \text{प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल} &= \text{घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल} \\ &= 2(\ell b + bh + h\ell) \\ &= 2(10 \times 7 + 7 \times 6 + 6 \times 10) \\ &= 2(70 + 42 + 60) = 2(172) = 344 \text{ सेमी}^2\end{aligned}$$

प्रश्नावली 19.2

- रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :-
(i) 3 सेमी. लम्बी भुजा वाले घन का सम्पूर्ण पृष्ठ = सेमी²
(ii) घनाभ के सम्मुख फलकों का क्षेत्रफल होते हैं।
(iii) घनाभ जिसकी लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई समान हो, वह कहलाता है।
- उस घनाभ का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊँचाई क्रमशः 6.5 सेमी., 4.5 सेमी एवं 2 सेमी है।
- एक घनाभ की लंबाई 15 फुट, चौड़ाई 12 फुट एवं ऊँचाई 9 फुट है। उसका सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लम्बाई 0.5 मीटर, चौड़ाई 25 सेमी और ऊँचाई 15 सेमी है।
- 3.4 सेमी लम्बी कोर वाले घन का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
- उस घन के कोर की लम्बाई ज्ञात कीजिए जिसका सम्पूर्ण पृष्ठ 216 सेमी² है।

7. एक कमरे के दीवारों, फर्श एवं छत पर सीमेंट का पलस्तर कराया जाना है। यदि कमरे की लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई क्रमशः 4.5 मीटर, 3 मीटर एवं 3.5 मीटर हो तो पलस्तर किये जाने वाले स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
8. एक तेल का घनाभकार डिब्बा 30 सेमी, 40 सेमी, 50 सेमी माप का है। टिन की चादर का मूल्य यदि 10 रु. प्रति वर्ग मीटर है तो ऐसे 20 डिब्बों को बनाने में लगी टिन का मूल्य ज्ञात कीजिए।
9. दो घनों की कोरें क्रमशः 8 सेमी व 4 सेमी हैं। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।



हमने सीखा (We have learnt)

1. आयताकार ठोस जिसमें लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई (तीन विमायें) होती हैं, घनाभ कहलाता है।
2. घनाभ में 6 आयताकार फलक, 12 कोरें और 8 शीर्ष होते हैं।
3. जिस घनाभ की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई बराबर हो उसे घन कहते हैं।
4. घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिये उसकी लम्बाई ℓ , चौड़ाई b एवं ऊँचाई h का आपस में गुणा करते हैं, अर्थात् $V = \ell b h$
5. घन का आयतन $V = S^3$ (जहाँ S घन का कोर या भुजा है)
6. आयतन का मात्रक घन इकाई है जो 1 इकाई लम्बे, 1 इकाई चौड़े और 1 इकाई ऊँचे घन के आयतन के बराबर होता है।
7. घनाभ के सभी आयताकार फलकों के क्षेत्रफल के योगफल का उसका सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं तथा घनाभ का $\text{संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र} = 2(\ell b + b h + h \ell)$
8. $\text{घन का सम्पूर्ण पृष्ठ} = 6S^2$
9. $1 \text{ मीटर}^3 = 10^6 \text{ सेमी}^3$

उत्तरमाला ANSWER SHEET

उत्तरमाला 1.1

1. (i) पूर्ण वर्ग नहीं है (ii) पूर्ण वर्ग है (iii) पूर्ण वर्ग है (iv) पूर्ण वर्ग है (v) पूर्ण वर्ग नहीं है ।
 3. (i) सम (ii) विषम (iii) विषम (iv) विषम (v) सम (vi) सम (vii) सम (viii) सम (ix) विषम ।

उत्तरमाला 1.2

1. (i) पूर्ण घन है (ii) पूर्ण घन नहीं है (iii) पूर्ण घन है (iv) पूर्ण घन है (v) पूर्ण घन नहीं है
 (vi) पूर्ण घन नहीं है
 2. 2 3. 13 4. 11 5. (ii) 10, (v) 484, (vi) 169

उत्तरमाला 1.3

1. (i) 19 (ii) 20 (iii) 28 (iv) 32 (v) 48 (vi) 84
 2. 16

उत्तरमाला 1.4

1. (i) 23 (ii) 37 (iii) 32 (vi) 76 (v) 30 (vi) 89 (vii) 225 (viii) 603
 2. 43 पंक्ति या स्तम्भ
 3. 38 मीटर लम्बाई या चौड़ाई

उत्तरमाला 1.5

1. (i) 2.7 (ii) 4.1 (iii) 3.05
 2. (i) 95 (ii) 2.24 (iii) 2.64

उत्तरमाला 1.6

- (i) 5 (ii) 7 (iii) 11 (vi) 13 (v) 21 (vi) 55 (vii) 17 (viii) 35

उत्तरमाला 2.1

1. (a) -125 (b) -1024 (c) 64 (d) 729
 2. (a) 5^6 (b) $-(15)^{26}$ (c) $-(12)^2$ (d) $-(p)^7$

उत्तरमाला 2.2

1. (a) $\frac{1}{343}$ (b) $\frac{16}{25}$ (c) -3125 (d) $\frac{16}{9}$
 2. (a) $-\left(\frac{5}{7}\right)^2$ (b) $\left(\frac{3}{5}\right)^3$ (c) $\left(\frac{3}{2}\right)^6$
 4. (a) सत्य (b) सत्य (c) असत्य (d) असत्य

उत्तरमाला 3.2

1. AF = 2 सेमी 2. 2.5 सेमी 3. 1.2 सेमी

उत्तरमाला 4.1

1. (i) $6x^2 + 25x + 14$ (ii) $6x^2 + 17x - 45$ (iii) $105x^2 - 104x + 12$
 (iv) $\frac{3}{2}x^2 + \frac{72}{5}xy - 6y^2$ (v) $7x^2 + 34xy - 5y^2$
2. (i) $9x^2 + 10xy + 3y^2$ (ii) $3x^2 - \frac{5}{4}x + \frac{1}{8}$ (iii) $3x^3 - 5x^2y + 3xy^2 - 5y^3$
 (iv) $a^2 + 2ab + b^2$

उत्तरमाला 4.2

1. (i) $-3xy$ (ii) $3xy$ (iii) $+xy^2$ (iv) $-4a^3b$
 (v) $-4a^2b^2c^2$
2. (i) $x^2 - 3x + 2$ (ii) $-a^2b + 2a + 3$ (iii) $-3a^3 + 4a$ (iv) $\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$
 (v) $a + b + c$

उत्तरमाला 4.3

1. (i) $8x^4 - 4x^3 + 15x^2 - 3x - 15$ (ii) $12m^5 - 9m^3 - 6m^2 + 8m + 16$
 (iii) $9m^4 - m^3 - 16m^2 - 4m + 16$ (iv) $12y^4 - 8y^3 - 6y^2 + 4$
2. (i) से (v) तक शेषफल शून्य प्राप्त होता है। अतः भाजक, भाज्य का एक गुणनखण्ड है।
3. (i) भागफल = $x^2 + 3x + 6$, शेष = 10
 (ii) भागफल = $x^2 - 2x + 6$, शेष = -42
 (iii) भागफल = $2x^3 - 4x^2 + x + 5$, शेष = -21
 (iv) भागफल = $2x^2 - 2x + 3$, शेष = 12
4. (i) भागफल = $m - 1$, शेष = 5
 (ii) भागफल = $a^2 - 4a + 9$, शेष = -16
 (iii) भागफल = $3x^2 + 4x - 3$, शेष = +6
 (iv) भागफल = $2x + 3$, शेष = $-x + 3$

उत्तरमाला 5.1

1. (i) दीर्घ चाप (ii) लघु चाप (iii) $\angle ADB, \angle ACB$ (iv) लघु चाप $\widehat{AB}$
 (v) चाप CDA (vi) लघु चाप $\widehat{CD}$ (vii) $\angle ADB, \angle ADC, \angle BDC$

उत्तरमाला 5.2

- (i) $\angle A = 45^\circ$ (ii) $x = y = 33^\circ$ (iii) $p = 40^\circ$ (iv) $m = 72^\circ, n = 57^\circ$
 (v) $u = 93^\circ, v = 87^\circ$

उत्तरमाला 5.3

1. न्यूनकोण 2. अधिककोण 3. 180°

उत्तरमाला 5.4

1. $\angle PRQ = 90^\circ, \angle QPR = 50^\circ$ 2. $\angle PYQ = \angle PXQ = 80^\circ$
 3. $\angle P = 90^\circ, \angle Q = \angle R = 45^\circ$ 4. $\angle BDC = 50^\circ$
 5. $\angle PTR = \angle PSR = 50^\circ$

उत्तरमाला 5.5

1. (a) $x = 130^\circ$ (b) $x = 124^\circ$ (c) $x = y = 37^\circ$
 2. (i) $x = y = 52^\circ$ (ii) $x = 150^\circ, y = 75^\circ$
 3. $\angle COD = 70^\circ$
 4. $PQ = 3.2$ सेमी
 5. (i) $x = 90^\circ, y = 115^\circ$ (ii) $x = 115^\circ, y = 65^\circ$

उत्तरमाला 5.6

1. $BM = 3.5$ सेमी, $AB = 7$ सेमी,
 2. $x = 90^\circ, y = 50^\circ$ 3. $PM = MQ = 4$ सेमी,
 4. (i) समद्विभाजित (ii) लम्ब

उत्तरमाला 6.1

1. 72 2. 60 3. 8 4. 30 कि.ग्रा.
 5. 67 6. 5 7. 3 8. 5
 9. $x = 8$

उत्तरमाला 6.3

1. $\frac{1}{4}$ 2. $\frac{1}{4}$ 3. $\frac{1}{5}$ 4. $\frac{1}{3}$
 5. $\frac{1}{2}$ 6. $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$

उत्तरमाला 7.1

- 1 (i) अनुक्रमानुपात विचरण है $\frac{1}{3}$ (ii) अनुक्रमानुपात विचरण है $\frac{1}{1}$
 (iii) अनुक्रमानुपात विचरण नहीं है। (iv) अनुक्रमानुपात विचरण नहीं है।
 2. 100, 3, 250, 6 (3) $\frac{1}{7}$ (4) 1000 किमी.

5.	x	4	24	(28)	(36)	44	52
	y	10	60	70	90	(110)	(130)

6.	समय (मिनटों में)	3	4	(7)	25	(155)
	तय की गई दूरी (किमी. में)	(36)	48	84	(300)	1860

7. (i), (ii), (iii), (iv), (v)

8. 60 टिकट 9. 180 किमी. 10. 216 रुपये 11. 50 मिनट 12. 5 घण्टे

13. 2000 रु. 14. 29 दिन 15. 252 मीटर 16. 7.30 रुपये

17. 1.925 सेमी. 18. $4\frac{4}{15}$ मिनट या 256 सेकेण्ड 19. 18 शब्द प्रति मिनट

20. 34 मजदूर 21. 15.75 किंवटल

22. (i) (b) (ii) (a) (iii) (d) (iv) (c)

उत्तरमाला 7.2

1.	x	8	6	4	(72)	36
	y	9	12	(18)	10	(2)

2.	चाल (किमी/घण्टा में)	4	8	(16)	(32)	64
	चाल (मिनटों में)	(80)	40	20	10	(5)

3. 10 दिन 4. 81 दिन 5. 45 किमी/घण्टा 6. 10 घोड़े

7. 45 दिन 8. 175 सैनिक 9. 10 दिन 10. 15 दिन

11. (iii), (iv), (v) 12. 80 ग्राम 13. 800 लीटर

उत्तरमाला 8.1

- (i) 1, 5, t, 5t, t^2 , $5t^2$ (ii) 1, 7, x, y, 7x, 7y, 7xy

(iii) 1, 2, 7, 14, ℓ , ℓ^2 , m, 2ℓ , $2\ell^2$, 2m, 7ℓ , $7\ell^2$, 7m, 14ℓ , $14\ell^2$, 14m, ℓm , $2\ell m$, $7\ell m$, $14\ell m$, $\ell^2 m$, $2\ell^2 m$, $7\ell^2 m$, $14\ell^2 m$

(iv) 1, 3, 13, 39, ℓ , 3ℓ , 13ℓ , 39ℓ , m, 3m, 13m, 39m, n, 3n, 13n, 39n, ℓm , $3\ell m$, $13\ell m$, $39\ell m$, ℓn , $3\ell n$, $13\ell n$, $39\ell n$, mn, 3mn, 13mn, 39mn, ℓmn , $3\ell mn$, $13\ell mn$, $39\ell mn$
- (i) म.स. = S (ii) म.स. = 3 (iii) म.स. = 2a (iv) म.स. = m
- (i) $6m\ell$ (ii) $4bc$ (iii) xy (iv) 7x

(v) $11pq^2r$ (vi) x (vii) 1

उत्तरमाला 8.2

1. (a) x^2 (b) $5a^2$ (c) $2c$ (d) $16x, 9z$
(e) $6b^2, 4bc, 5a$.
2. (a) $2a(2x + 3ay)$ (b) $a(a^4y + b^3)$ (c) $q^2(pr - 2t)$
(d) $-5\ell m(m + 2\ell n)$ (e) $5(m + n)(m - n)$
3. (a) $2(x + 3y)(xy + 2)$ (b) $(m - 2n)(5mn + 12)$
(c) $(3x + 4)(2x^2 + 3y)$ (d) $(5x^2 + 4y)(3x^2 + 2y^2)$
(e) $(x + 3)(x + 8)$ (f) $(x - 4)(3x - 5)$
(g) $(\ell - m)(2m + 3)$
4. (a) $x - 3y^2x$ (b) $-51x^3 + 153x^2$
(c) $6a^3 - 8a^4$ (d) $9m^2 - 9mn$
(e) $9t^3 - 63t^5$

उत्तरमाला 9.1

- (1) (i) $4a^2 + 12a + 9$ (ii) $\frac{4}{25}m^2 + \frac{3}{5}m + \frac{9}{16}$
- (2) (i) $x^2 - 10x + 25$ (ii) $\frac{9}{4}x^2 - \frac{12}{5}xy + \frac{16}{25}y^2$
(iii) $4a^2 - 2a + \frac{1}{4}$ (iv) $x^4 - 2x^2y^2 + y^4$
- (3) (i) $16x^2 - 25$ (ii) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9}$
(iii) $b^4 - a^4$ (iv) $x^6 - y^6$
- (4) (i) $4a^2 + 20a + 25$ (ii) $\frac{4}{9}m^4 + \frac{10}{9}m^2n^2 + \frac{25}{36}n^4$
(iii) $64x^6 - 80x^3y^3 + 25y^6$
- (5) (i) 1681 (ii) 4761 (iii) 9801 (iv) 6561
- (6) (i) 9975 (ii) 8096 (iii) 249991
- (7) (i) 50 (ii) 31 (iii) -13 (iv) 13
- (8) $9x^2 - 30xy + 25y^2$
- (9) $\frac{x^2}{9} + \frac{xy}{6} + \frac{y^2}{16}$

उत्तरमाला-9.2

1. (a) $(2x + 5)(2x + 5)$ (b) $(5a + 7b)(5a + 7b)$
(c) $(3x + 1)(3x + 1)$ (d) $(1 + 9a)(1 + 9a)$
(e) $(p + \frac{1}{2})(p + \frac{1}{2})$ (f) $(6a + 11b)(6a + 11b)$
2. (a) $(a - 5b)(a - 5b)$ (b) $(4x - 13)(4x - 13)$
(c) $(11x - 4y)(11x - 4y)$ (d) $(x - 15)(x - 15)$
(e) $(6a - 1)(6a - 1)$
3. (a) $(5a + 7b)(5a - 7b)$ (b) $(3x + 11y)(3x - 11y)$
(c) $(8a + 1)(8a - 1)$ (d) $(1 + 4b)(1 - 4b)$
(e) $(\frac{4}{5}m + \frac{2}{3}n)(\frac{4}{5}m - \frac{2}{3}n)$
4. (a) $(x + 4y + 7)(x + 4y - 7)$ (b) $(10 + 2a + 3b)(10 - 2a - 3b)$
(c) $(2x + 5y + 6)(2x + 5y - 6)$ (d) $(7x - 5y)(5y - x)$
(e) $(xy + 4)(xy - 4)$
5. (a) $(x - 5y)$ (b) $3, x$ (c) $7, 7$ (d) $(a + b - 2)$
6. $x^2 - 10x + 25$ वर्गमीटर 7. 5 मूर्तियाँ
8. $(x-5)$ मीटर 9. 2 फीट, 3 फीट

उत्तरमाला-10

1. (अ) आयत (ब) आयत (स) 60° (द) 28 सेमी
2. (i) वर्ग (ii) समलम्ब (iii) 6 (iv) $(n-2)$
4. 1080°
5. $120^\circ, 60^\circ, 60^\circ$ 6. $80^\circ, 80^\circ, 100^\circ, 100^\circ$
7. 18 सेमी, 24 सेमी

उत्तरमाला-10.1

1. 50° 2. 95° 3. $72^\circ, 108^\circ, 72^\circ, 108^\circ$
4. $60^\circ, 90^\circ, 120^\circ$ 5. $36^\circ, 72^\circ, 108^\circ, 144^\circ$ 6. $80^\circ, 100^\circ, 80^\circ, 100^\circ$

उत्तरमाला 12.1

- (1) $x = 3$ (2) $x = 1$ (3) $m = 2$ (4) $x = \frac{3}{2}$

- (5) $y = 4$ (6) $y = 2$ (7) $k = -2$ (8) $x = 3$
 (9) $x = -0.5$

उत्तरमाला 12.2

- (1) 14, 28 (2) 10, 30 (3) 5 सेमी, 2 सेमी (4) 62
 (5) 34 (6) $\frac{5}{7}$ (7) 14 वर्ष, 10 वर्ष (8) 36 वर्ष, 12 वर्ष

उत्तरमाला 13.1

1. (i) 410 रु. (ii) 1986 रु. (iii) 1040 रु.
 2. (i) 8427 रु. (ii) 2916 रु. (iii) 6480 रु.
 3. 5948.80 रु.
 4. 9261 रु.

उत्तरमाला 13.2

1. 81 रु. 2. 27783 रु. 3. 12 रु. 4. 405 रु.

उत्तरमाला 13.3

1. (i) 7986 रु., 1986 रु. (ii) 1764 रु., 164 रु. (iii) 11241.25, 2741.25 रु.
 (iv) 23152.50 रु., 3152.50 रु.
 2. 729 रु. 3. 5000 रु. 4. 15% 5. 10% 6. 46.08 रु.

उत्तरमाला 13.4

1. 1820 रु. 2. 1200 रु. 3. 1444 रु. 4. 340 रु.
 5. 12000 रु. 6. 937.50 रु. 7. 5400 रु. 8. 13200 रु.

उत्तरमाला 14.1

1. (i) 150 वर्ग सेमी. (ii) 720 वर्ग सेमी. (iii) 1800 वर्ग सेमी.
 2. 185.5 वर्ग सेमी., 3. 15 सेमी., 4. 20 मी.

उत्तरमाला 14.2

- (1) 42 cm² (2) 18.75 cm² (3) 8 cm (4) 4500 dm²

उत्तरमाला 14.3

- (1) 120 वर्ग सेमी (2) 30 वर्ग सेमी (3) 168 वर्ग सेमी (4) 40.8 वर्ग सेमी
 (5) 12 सेमी, 18 सेमी

उत्तरमाला 14.4

- (1) 156 वर्ग सेमी (2) 149 वर्ग मी. (3) 530 वर्ग मी., 2782.50 रु.

उत्तरमाला 14.5

- (1) 198 वर्ग सेमी (2) 188.57 वर्ग सेमी (3) 2794 वर्ग सेमी

उत्तरमाला 15.1

1. (i) वृत्ताकार (ii) $\pi r^2 h$ (iii) 1078 सेमी³
 2. 20790 घन सेमी.
 3. (i) 6336 सेमी³ (ii) 123.20 सेमी³ (iii) 6600 मीटर³
 4. 4 : 1 5. 86.24 मीटर³ 6. 138.6 सेमी³

उत्तरमाला 15.2

1. (i) वक्रपृष्ठ = 1056 सेमी², सम्पूर्ण पृष्ठ = 1364 सेमी²
 (ii) वक्रपृष्ठ = 1320 मीटर², सम्पूर्ण पृष्ठ = 1948.57 मीटर²
 (iii) वक्रपृष्ठ = 2310 सेमी², सम्पूर्ण पृष्ठ = 3003 सेमी²
 (iv) वक्रपृष्ठ = 8800 सेमी², सम्पूर्ण पृष्ठ = 10032 सेमी²
 2. 5280 सेमी² 3. 69.14 सेमी² 4. 3850 घन मीटर, 3300 रुपये
 5. 264 वर्ग मीटर 6. 50 सेमी

उत्तरमाला 16

(5) 6

उत्तरमाला 17.1


1. (ii) $\frac{12}{13}$, (iv) $\frac{6}{7}$
 3. (i) $1, 1\frac{5}{9}$ (ii) $7, 7\frac{5}{12}$ (iii) $6, 6\frac{11}{18}$ (iv) $4, 4\frac{23}{61}$
 4. (i) $\frac{2}{5}, \frac{6}{9}, \frac{8}{9}, \frac{4}{3}$ (ii) $\frac{1}{9}, \frac{2}{9}, \frac{4}{9}, \frac{7}{9}, \frac{8}{9}$

उत्तरमाला 17.2

2. (i) 8 (ii) -12 (iii) 20 (iv) -39 (v) 59
 3. (i) $\frac{5}{9}$ (ii) 0 (iii) $-\frac{5}{3}$ (iv) $-\frac{13}{-8}$
 4. 2 5. 1 6. $\frac{5}{3}$

उत्तरमाला 17.3

1. 10, दो अंकीय संख्या 30, 50, 35, 53, तीन अंकीय संख्या 305, 350, 503, 530
2. (A) 111, 222, 333,, इत्यादि
(B) 111111111, 222222222, इत्यादि
3. (a) 26, 37, 65, 101 (b) 13, 34, 89 (c) 99, 90, 80, 57 (d) 8, 6
4. $0^1 + 6^2 + 3^3 = 0 + 36 + 27 = 63$ इत्यादि।
5. $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 \times 9 = 100$
6. A = 25, B = 161, C = 25, D = 12, E = 95, F = 26
G = 25, H = 23, I = 167, J = 561
10. (i) $2 + 2 - 2 + 2/2 = 3$ (ii) $22 \div 2 - 2 - 2 = 7$



उत्तरमाला 17.4

1. (i) हाँ (ii) नहीं (iii) हाँ (iv) नहीं (v) नहीं
2. (i) विभाज्य है (ii) विभाज्य नहीं है (iii) विभाज्य है
(iv) विभाज्य नहीं है (v) विभाज्य है
3. 1. (i) 932 (iii) 6570
4. (i) 560 (ii) 791 (iv) 7007

उत्तरमाला 18.1

1. (i) $2\frac{9}{34}$ (ii) $1\frac{19}{36}$ (iii) $\frac{7}{20}$
2. (i) $\frac{-5}{9}$ (ii) $\frac{6}{31} + \frac{-11}{29}$ (iii) $\frac{13}{9}, \frac{-15}{7}$
3. साहचर्य नियम
4. (i) $\frac{227}{693}$ (ii) $-1\frac{1}{6}$ (iii) $-2\frac{1}{7}$
5. $\frac{23}{12}$ 6. 1
7. (i) $\frac{5}{7}$ (ii) 0 (iii) $\frac{39}{51}$ (iv) $\frac{-42}{17}$
8. (1) क्रम विनिमय नियम (ii) साहचर्य नियम (iii) योज्य तत्समक (iv) योज्य प्रतिलोम

उत्तरमाला 18.2

1. (i) $-\frac{1}{20}$ (ii) $\frac{3}{8}$ (iii) $-\frac{23}{24}$ (4) $-\frac{1}{13}$
 2. (i) 0 (ii) $\frac{19}{70}$ (iii) $-5\frac{29}{60}$
 3. $\frac{13}{24}$ 4. $-\frac{6}{25}$ 5. (i) असत्य (ii) असत्य (iii) सत्य (iv) सत्य

उत्तरमाला 18.3

3. (i) $\frac{2}{3}$ (ii) $\frac{1}{2}, \frac{11}{19}$ (iii) $-\frac{3}{17}, \frac{7}{9}$
 4. (i) $\frac{2}{9}$ (ii) $-\frac{1}{8} \times -\frac{2}{5}$ (iii) $\left(\frac{4}{7} \times -\frac{25}{3}\right) \times \frac{1}{5}$
 5. (i) वितरण नियम (ii) वितरण नियम (iii) क्रम विनिमेय (iv) गुणात्मक प्रतिलोम
 (v) गुणन तत्समक
 6. (i) $\frac{1}{4}$ (ii) $-\frac{5}{17}$ (iii) $-\frac{29}{6}$ (4) $\frac{q}{p}$
 7. (i) सत्य (ii) असत्य (iii) असत्य (iv) सत्य

उत्तरमाला 18.4

1. (i) $\frac{2}{9}$ (ii) $-\frac{72}{55}$ (iii) $-\frac{63}{4}$ (iv) 3 (v) $-\frac{7}{4}$ (vi) $+\frac{2}{3}$
 2. (i) $-\frac{4}{5}$ (ii) $\frac{1805}{128}$ (iii) $\frac{105}{16}$ (iv) -3 (v) $\frac{2}{35}$ (iv) $\frac{7}{5}$
 3. 20 4. $\frac{55}{9}$ 5. $-\frac{13}{4}$

उत्तरमाला 18.5

1. (i) $\frac{3}{2}$ (ii) $\frac{3}{7}$ (iii) $-\frac{2}{9}, -\frac{2}{9}, \frac{2}{3}$
 3. $\frac{17}{48}, \frac{3}{8}, \frac{5}{12}, \frac{11}{24}, \frac{23}{48}$
 4. $-\frac{35}{168}, -\frac{11}{84}, \frac{1}{42}, \frac{5}{28}, \frac{19}{56}$
 5. $-\frac{5}{96}, \frac{1}{16}, \frac{7}{24}, \frac{25}{48}, \frac{61}{96}$
 6. (i) सत्य (ii) असत्य (iii) असत्य

उत्तरमाला 19.1

1. (i) 6 (ii) ऊँचाई (iii) 10^6
2. 6000 लीटर 3. 280 घन सेमी 4. 1200 घन सेमी
5. (i) 150 घन सेमी (ii) 360 घन सेमी (iii) 64 घन मीटर (iv) 22.5 घन मीटर
(v) 35 घन सेमी (vi) 40 घन सेमी (vii) 120 घन सेमी (viii) 168 घन सेमी
(ix) 37500 घन सेमी (x) 11.25 घन सेमी
6. 8 सेमी 7. 125 टुकड़े 8. 67.5 मीटर^3 9. 1600 लीटर
10. 1 मीटर 11. 4320 घन फीट 12. 1.728 घन सेमी
13. 432 घन मीटर (धारिता) 288 घन मीटर (पानी का आयतन)
14. 60 घन मी., 60000 लीटर 15. 25000 ईंटें

उत्तरमाला 19.2

1. (i) 54 (ii) बराबर (iii) घन
2. 102.5 सेमी^2 3. 846 फुट^2 4. 4750 सेमी^2 5. 69.36 सेमी^2
6. 6 सेमी 7. 79.50 सेमी^2 8. 188 रु. 9. 4:1